

بررسی بعضی از ریسک فاکتورها برای بروز پره‌اکلامپسی

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات فشارخون در طی حاملگی یکی از عوارض مهمی است که مطالعه بیشتر در مورد ریسک فاکتورهای آن در جنبه‌های مختلف ممکن است به درک بهتر علت آن کمک کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی بعضی از موارد خطر برای بروز پره‌اکلامپسی بود.

روش بررسی: این مطالعه به صورت مورد شاهدهی گذشته‌نگر صورت گرفته است. ۳۱۸ زن باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی، به عنوان گروه مورد و ۳۱۸ زن باردار که در زمان زایمان فشار خون نرمال داشتند، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. عوامل مورد بررسی شامل سن، سن حاملگی، نولی پاریتته، شغل، سطح تحصیلات مادر، BMI (Body mass index) مادر، هموگلوبین مادر، گروه خون مادر، سابقه خانوادگی پره‌اکلامپسی، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی، نسبت فامیلی با همسر، UTI (urinary tract infection)، فصل وقوع پره‌اکلامپسی، جنس نوزاد و روش جلوگیری از باردار بودند که در دو گروه، مورد مقایسه قرار گرفتند. از آزمون‌های آماری مجذور کای و من‌ویتنی برای مقایسه نتایج استفاده گردید.

یافته‌ها: سابقه عفونت ادراری ($P=0/027$, $\phi=0/031$)، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبل ($P=0/000$, $\phi=0/144$)، نولی پاریتته ($P=0/008$, $\phi=0/108$)، گروه خونی A^+ ($P=0/000$, $\phi=0/129$)، سطح تحصیلات پایین مادر ($P=0/009$, $\phi=0/007$) و میزان Hb بالاتر مادر ($P=0/014$, $\phi=0/042$)، در گروه مورد بطور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود. میزان سزارین در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود (۷۷٪ یا ۲۴۵ مورد در مقابل ۲۶٪ یا ۸۵ مورد) ($P=0/000$). نمره آپگار نوزادان کمتر از ۸ در دقیقه ۱، در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود (۲۸٪ در مقابل ۴۷٪ و $P=0/000$). سن حاملگی در زمان ختم بارداری در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (۳۶/۴۸±۳/۴ هفته در مقابل ۳۷/۱۲±۲/۳ هفته، $P=0/000$).

نتیجه‌گیری: سابقه عفونت ادراری، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبل، نولی پاریتته، گروه خونی A^+ ، سطح تحصیلات پایین مادر و میزان Hb بالاتر مادر، ممکن است از موارد خطر پره‌اکلامپسی در طی حاملگی باشند.

کلیدواژه‌ها: ۱- پره‌اکلامپسی ۲- ریسک فاکتور ۳- زنان باردار

*دکتر مریم کاشانیان I

دکتر راضیه علی‌محمدی II

دکتر حمیدرضا برادران III

مقدمه

عوامل خطر آن صورت گرفته است و عواملی مانند نولی پاریتته، سن بالا، نژاد، مسائل ژنتیک، فاکتورهای محیطی مثل زندگی در ارتفاعات بالا، چاقی، فقر، فشاخون مزمن و چندقلوئی، در مورد آن دخیل شناخته شده‌اند.^(۱-۹) در بعضی مطالعات دیگر عواملی مانند شاغل بودن مادر^(۱۰، ۱۱)، داشتن خواهر با سابقه پره‌اکلامپسی^(۱۱)، عفونت سیستم ادراری در طی حاملگی، تحصیلات پایین مادر، در معرض دی‌اتیل‌استیل بسترول بودن در رحم^(۱۲)، فاصله طولانی با حاملگی قبلی، سابقه زایمان زودرس و IUGR، ناکافی بودن

اختلالات فشارخون در طی حاملگی یکی از عوارض مهمی است که توأم با خونریزی و عفونت، تریاد مرگ‌آوری را تشکیل می‌دهند که قسمت اعظم موربیدیتی و مرگ و میر مرتبط با حاملگی را سبب می‌شوند^(۱، ۲) و در حدود ۳/۷-۵٪ حاملگی‌ها اتفاق می‌افتد.^(۱، ۳) اتیولوژی پره‌اکلامپسی به درستی معلوم نیست^(۴، ۵) و به نظر می‌رسد فاکتورهای ایمنولوژیک، زمینه ساز مشکل در جفت باشند؛ در حالی که مسائل ژنتیک، استعداد مادر برای بیماری را معلوم می‌کند.^(۶) به دلیل اهمیت زیاد بیماری، مطالعات زیادی در مورد

این مقاله، خلاصه پایان نامه خانم دکتر راضیه علی‌محمدی در مقطع تحصیلی پزشکی عمومی به راهنمایی خانم دکتر مریم کاشانیان می‌باشد.

I) دانشیار و متخصص زنان و زایمان، بیمارستان شهید اکبرآبادی، چهارراه مولوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران (*مؤلف مسؤول).
II) پزشک عمومی.

III) استادیار و متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران.

شامل دیابت و فشارخون مزمن، هر گونه مصرف دارو به علت بیماری، چندقلوئی، مصرف سیگار، اریتروبلاستوزیس فتالیس و نژاد غیر ایرانی.

سپس بیماران دو گروه از نظر سابقه عفونت ادراری در حاملگی، سابقه خانوادگی پره‌اکلامپسی، BMI (Body mass index)، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی، نولی پاریده بودن، گروه خونی، سطح تحصیلات مادر، میزان هموگلوبین مادر، فصل وقوع پره‌اکلامپسی، جنس نوزاد، شغل مادر، روش پیشگیری از بارداری قبلی و نسبت فامیلی با همسر با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.

داده‌ها توسط نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل، از آزمون chi-square و Mann-Whitney استفاده شده است.

یافته‌ها

از نظر سن، BMI، شاغل بودن مادر، سابقه خانوادگی پره‌اکلامپسی، نوع روش جلوگیری از بارداری، نسبت فامیلی با همسر، جنس نوزاد و فصل وقوع پره‌اکلامپسی، اختلاف بین دو گروه معنی‌دار نبود (جدول شماره ۱).

مراقبت‌های پره‌ناتال^(۱۳)، فصل و گروه خونی^(۱۴)، وزن کم مادر در موقع تولد^(۱۵) و مصرف سیگار^(۱۶) نیز به عنوان عوامل خطر شناخته شده‌اند.

در حال حاضر زنان در معرض خطر، براساس عوامل خطر اپیدمیولوژیک و کلینیکی تشخیص داده می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عواملی چون هموگلوبین مادر، گروه خون مادر، سابقه عفونت ادراری در حاملگی فعلی، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبل، سطح تحصیلات مادر، شغل مادر و روش جلوگیری از بارداری در موارد پره‌اکلامپسی است.

روش بررسی

این مطالعه به صورت مورد شاهدهی گذشته‌نگر در بیمارستان اکبرآبادی تهران در فاصله زمانی ۸۵-۱۳۸۴ صورت گرفت. ۳۱۸ نفر از زنانی که مبتلا به پره‌اکلامپسی شده بودند، به عنوان گروه مورد و ۳۱۸ نفر از زنان که در زمان زایمان فشار خون نرمال داشتند، به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.

عوامل خروج از مطالعه عبارت بودند از: سن بالای ۳۵ سال و کمتر از ۱۸ سال، سابقه هر گونه بیماری در مادر

جدول شماره ۱- مشخصات بیماران دو گروه

P value	گروه شاهد	گروه مورد	مشخصات
n.s	۶/۵ ۲۷/۳۶	۶/۶ ۲۷/۷۴	سن مادر (سال) m±SD
n.s	۴/۲۵ ۲۶/۷۱	۴/۳۵ ۲۹/۷۱	BMI m±SD
n.s	۲(۰/۱۸)	۳(۰/۰۹)	شاغل بودن مادر (درصد) تعداد
n.s	۱(۰/۰۳)	۵(۱/۱۶)	سابقه خانوادگی پره‌اکلامپسی (درصد) تعداد
n.s	۲۳۴(۷۳/۶)	۲۵۲(۷۹/۲)	NO
n.s	۵۲(۱۶/۴)	۴۳(۱۳/۶)	روش جلوگیری WD+ Barrier
n.s	۲۲(۶/۹)	۱۱(۳/۵)	OCP (درصد) تعداد
n.s	۱۰(۳/۱)	۱۲(۳/۸)	IUD
n.s	۳۰(۱۲/۶)	۴۱(۱۲/۹)	داشتن نسبت فامیلی با همسر
n.s	۱۴۶(۴۵/۹)	۱۲۰(۳۷/۷)	پسر
n.s	۱۷۲(۵۴/۱)	۱۹۵(۶۱/۳)	جنس نوزاد دختر
n.s	۱۰۰(۳۱/۴)	۸۷(۲۷/۴)	بهار
n.s	۸۴(۲۶/۴)	۸۰(۲۵/۲)	تابستان فصل وقوع
n.s	۹۰(۲۸/۳)	۶۸(۲۱/۴)	پاییز پره‌اکلامپسی
n.s	۴۴(۱۳/۸)	۸۳(۲۶/۱)	زمستان

کم‌سواد بودن مادر از عوامل خطر در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی بودند و همچنین Hb افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی بیش‌تر از افراد شاهد بوده است. در مطالعات گوناگون فاکتورهای متفاوتی به عنوان ریسک فاکتور در مورد پره‌اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در مطالعه‌ای که توسط Trogstad^(۱۷) و همکاران صورت گرفته است، میزان عود پره‌اکلامپسی در حاملگی دوم برای کسانی که حاملگی اول آنها دوقلو بوده، کمتر از مواردی بود که حاملگی آنها یک‌قلو بوده است و چنین نتیجه‌گیری می‌شود.

شایع‌ترین گروه خونی در گروه مورد، گروه خونی A⁺ (۱۱۷ نفر=۳۶/۸٪) و در گروه شاهد، O⁺ (۱۳۰ نفر=۳۰/۹٪) بود که اختلاف از نظر گروه خونی بین دو گروه معنی‌دار بود بطوری که گروه خونی A⁺ به عنوان یک عامل خطر ساز محسوب می‌شود (P=۰/۰۰۰، phi=۰/۱۲۹). سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبل، سابقه UTI در حاملگی فعلی، نولی‌پاریتی و بی‌سواد یا کم‌سواد بودن مادر در گروه مورد بیش‌تر از گروه شاهد بود (جدول شماره ۲). Hb مادر در گروه مورد بیش‌تر از گروه شاهد بود.

جدول شماره ۲- مشخصات بیماران دو گروه

Phi	P value	گروه شاهد	گروه مورد	مشخصات
۰/۱۴۴	P=۰/۰۰۰	۲(٪۰/۶)	۱۸(٪۵/۷)	سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی n(٪)
۰/۰۳۱	P=۰/۰۲۷	۳(٪۰/۹)	۱۱(٪۳/۵)	سابقه UTI در حاملگی فعلی n(٪)
۰/۱۰۸	۰/۰۰۸	۱۱۶(٪۳۶/۵)	۱۵۰(٪۴۷/۲)	نولی‌پاریتی n(٪)
۰/۰۰۷	۰/۰۰۹	۱۵۱(٪۴۷/۴)	۱۸۵(٪۵۸/۲)	بی‌سواد یا کم‌سواد بودن مادر (درصد) تعداد
۰/۰۴۲	۰/۰۱۴	۱۱/۹±۱/۴۶	۱۲/۲۳±۱/۴۱	Hb مادر در زمان زایمان m±SD

که ژنتیک بصورت یک مدل پلی ژنیک در مورد پره‌اکلامپسی مؤثر است و نیز ریسک پره‌اکلامپسی در کسی که خواهرش مبتلا به پره‌اکلامپسی بوده است، بیش‌تر است^(۱۱)، که موید فاکتورهای ژنتیک یا رفتاری است. در مطالعه حاضر نیز نولی‌پاریتی و در عین حال سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی از عوامل خطر بوده است که می‌تواند بیانگر زمینه ژنتیک یا رفتاری در فرد باشد.

در یک مطالعه^(۷) سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی (مشابه مطالعه حاضر)، سابقه خانوادگی پره‌اکلامپسی و BMI بالا، از عوامل خطر برای پره‌اکلامپسی بوده‌اند و در مطالعه دیگری^(۱۰) فعالیت فیزیکی زیادتر، ریسک پره‌اکلامپسی را افزایش داده است.

وجود UTI در طی حاملگی، نولی‌پاریتی، تحصیلات پایین، BMI بالاتر از ۳۰، مصرف سیگار و در معرض دی‌اتیل‌استیل‌بسترول بودن در رحم در مطالعه‌ای دیگر^(۱۲) از عوامل خطر

سن حاملگی در زمان ختم بارداری در گروه مورد، ۳۶/۴۸±۳/۴ هفته و در گروه شاهد، ۳۷/۱۲±۳/۳ هفته بود که اختلاف، معنی‌دار بود (P=۰/۰۰۶). ۲۸/۶٪ نوزادان در گروه مورد و ۱۶/۴٪ نوزادان گروه شاهد، آپگار کمتر از ۸ داشتند که اختلاف معنی‌دار بود (P=۰/۰۰۰). میزان سزارین در گروه مورد، ۷۷٪ (۲۴۵ نفر) و در گروه شاهد، ۲۶/۷٪ (۸۵ نفر) بود که اختلاف معنی‌دار بود (P=۰/۰۰۰).

Phi، شاخص تعیین شدت ارتباط در مطالعات آماری توصیفی است که دامنه تغییرات آن بین -۱ و +۱ می‌باشد. منظور از Phi منفی، عامل حفاظتی (Protective) و Phi مثبت، عامل خطرزا (Risk factor) می‌باشد.

بحث

در مطالعه حاضر، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی، نولی‌پاریتی، سابقه UTI در حاملگی فعلی و بی‌سواد یا

شود^(۴)، مطالعه بیش‌تر در مورد ریسک فاکتورهای آن در جنبه‌های مختلف ممکن است به درک بهتر علت آن کمک کند. در ضمن تشخیص زنان در معرض خطر تنها براساس ریسک فاکتورهای کلینیکی و اپیدمیولوژیک صورت می‌گیرد که بررسی این ریسک فاکتورها را در اهمیت خاصی قرار می‌دهد. با شناخت این ریسک فاکتورها در حاملگی می‌توان بیمار را از ابتدا تحت کنترل دقیق‌تر قرار داده و نیز می‌توان بیماری را بهتر پیش‌بینی، پیشگیری و سرانجام بهتر کنترل کرد. مثلاً درمان سریع عفونت ادراری و یا عدم تجویز آهن در بیمارانی که هموگلوبین بالا دارند و یا محدود کردن فعالیت در زنان با ریسک بالا برای پره‌اکلامپسی، می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. در عین حال ممکن است به علت بیماری پی‌برده شود و از این طریق، راه‌های جدیدی برای پیشگیری کشف گردد. به همین سبب پیشنهاد می‌شود مطالعات وسیع دیگری نیز در این مورد در ایران صورت گیرد. در مطالعه حاضر محدودیتی وجود نداشت.

نتیجه‌گیری

سابقه عفونت ادراری، سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی، نولی‌پاریده، گروه خونی A^+ ، سطح تحصیلات پایین مادر و میزان Hb بالاتر مادر، ممکن است از موارد خطر پره‌اکلامپسی در طی حاملگی باشند. تعیین ریسک فاکتورها در جوامع مختلف و یافتن تفاوت‌های آنان می‌تواند به تشخیص علت این بیماری و نیز یافتن زمینه‌های ژنتیک بیماری کمک کند.

فهرست منابع

- 1- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hanth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 762-3.
- 2- Sibai B, Dekker G, Kupferminc M. Pre-eclampsia. Lancet 2005 Feb 26- Mar 4; 365(9461): 785-99.
- 3- Martin JA, Hamilton BE, Ventura SS. Births: Final data for 2001, National vital statistics report, National Center for Health Statistics 2002; 51(2): 1-3.
- 4- Dieti J. The pathogenesis of pre-eclampsia: new aspects. J Perinat Med 2000; 28(6): 464-71.
- 5- Dekker G, Robillard PY. Pre-eclampsia: Is the immune

برای پره‌اکلامپسی بوده‌اند که با مطالعه حاضر در بسیاری موارد همخوانی دارد. در مطالعه دیگری نیز^(۸) پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی، سابقه خانوادگی، فشار خون بالا و BMI بالا از عوامل خطر برای پره‌اکلامپسی بوده‌اند. وقتی در مطالعات و جوامع مختلف، ریسک فاکتورها با هم متفاوتند، احتمالاً علت آن فاکتورهای ژنتیک و یا مسائل زمینه‌ای ناشناخته دیگر است. بهمین علت باید مطالعاتی که چنین ماهیتی دارند، در جوامع مختلف صورت گیرند.

در مورد اینکه آیا سن حاملگی در زمان زایمان در حاملگی قبلی که با پره‌اکلامپسی همراه بوده است، می‌تواند در مورد وقوع پره‌اکلامپسی در حاملگی دوم مؤثر باشد، مطالعه‌ای توسط Mostello و همکاران^(۱۲) صورت گرفته است. آنان متوجه شدند که هر چه سن حاملگی در زمان زایمان در حاملگی قبلی کمتر باشد، ریسک پره‌اکلامپسی در حاملگی بعدی افزایش دارد که بیانگر وجود یک فاکتور تعیین کننده قوی در بروز بیماری است.

در مطالعه Lawler^(۱۸) میزان پره‌اکلامپسی در ۵ سال اخیر کاهش نشان داده است و لزوم بررسی از نظر کاهش میزان پره‌اکلامپسی در جوامع مختلف با توجه به ریسک فاکتورها مطرح گردیده است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ای نیز در ایران صورت گیرد.

در مطالعه‌ای^(۱۹) میزان اریتروپوئیتین در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی، بالاتر بوده است ولی میزان Hb تفاوتی با افراد نرمال نداشته است. در این مطالعه تعداد نمونه‌ها بسیار کم بوده و مطالعات بعدی را راهگشا دانسته است. در صورت اثبات این موضوع، که در ضمن با مطالعه حاضر همخوانی دارد، باید از تجویز آهن مکمل به زنان باردار با هموگلوبین بالا خودداری کرد.

در مطالعه Mahaba^(۲۴) پره‌اکلامپسی در افراد با گروه خونی B و RH منفی و فصل تابستان بیش‌تر دیده شده است، در حالیکه مطالعه دیگری^(۲۰) گروه خونی O و RH منفی را در موارد سندرم HELLP گزارش کرده است. در مطالعه حاضر گروه خونی A^+ از فاکتورهای خطر بوده است. تفاوت گروه‌های خونی در مطالعات متفاوت، می‌تواند بیانگر تفاوت‌های ژنتیک و نژادی باشد.

در مجموع با توجه به اینکه پروسه پره‌اکلامپسی بسیار پیچیده است و احتمالاً نمی‌تواند به یک علت واحد نسبت داده

Hypertens Pregnancy 2007; 26(1): 67-76.

19- Hershkovitz R, Ohel I, Sheizaf B, Nathan I, Erez O, Sheiner E, et al. Erythropoietin concentration among patients with and without pre-eclampsia. Arch Gynecol Obstet 2005 Dec; 273(3): 140-3.

20- Sezik H, Toyran H, Yapar EG. Distribution of ABO and Rh blood groups in patients with HELLP syndrome. Arch Gynecol Obstet 2002 NoV; 267(1): 33-6.

mal-adaptation hypothesis still standing? An epidemiological update. J Reprod Immunol 2007; 76(1-2): 8-16.

6- Austgulen R. Recent knowledge on mechanisms underlying development of pre-eclampsia. Tidsskr Nor Laegeforen 2004 Jan 8; 124(1): 21-4.

7- Gonzales AL, Ulloa Galvan G, Alpuche G, Romero Arauz JF. Risk factors for pre-eclampsia, Multi variate analysis. Gynecol Obstet Mex 2000 Aug; 68: 357-62.

8- Eskenazi B, Fenster L, Sidney S. A multivariate analysis of risk factors for pre-eclampsia. JAMA 1991 Jul; 266(2): 237-41.

9- Coonrod DV, Hickok DE, Zhu K, Easterling TR, Daling JR. Risk factors for pre-eclampsia in twin pregnancies: a population-based cohort study. Obstet Gynecol 1995 May; 85(5 pt 1): 645-50.

10- Spinillo A, Capuzzo E, Colonna L, Piazzini G, Nicola S, Baltaro F. The effect of work activity in pregnancy on the risk of severe pre-eclampsia. Aust N Z J Obstet Gynecol 1995 Nov; 35(4): 380-5.

11- Carr DB, Epplein M, Johnson CO, Easterling TR, Critchlow CW. A sister's risk: family history as a predictor of preeclampsia. AM J Obstet Gynecol 2005 Sep; 193(3 pt 2): 965-72.

12- Mittendorf R, Lain KY, Williams MA, Walker CK. Pre-eclampsia, A nested, case-control study of risk factors and their interactions. J Reprod Med 1996 Jul; 41(7): 491-6.

13- Mostello D, Catlin TK, Roman L, Holcomb WL, Leet T. pre-eclampsia in the parous women: who is at risk? Am J Obstet Gynecol 2002 Aug; 187(2): 425-9.

14- Mahaba HM, Ismail NA, EL Damaty SI, Kamel HA. Pre-eclampsia: Epidemiology and outcome of 995 cases. J Egypt Public Health Assoc 2001; 76(5-6): 357-68.

15- Dempsey JC, Williams MA, Luthy DA, Emanuel I, Shy K. Weight at birth and subsequent risk of pre-eclampsia as an adult. Am J Obstet Gynecol 2003 Aug; 189(2): 494-500.

16- Ray JG, Burrows RF, Burrows EA, Vermeulen MJ. Mos HIP: Mc Master Outcome study of hypertension in pregnancy. Early Hum Dev 2001 Sep; 64(2): 129-43.

17- Trogstad L, Skrondal A, Stoltenberg C, Magnus P, Nesheim BI, Eskild A. Recurrence risk of pre-eclampsia in twin and singleton pregnancies. Am J Med Genet A 2004 Apr 1; 126(1): 41-5.

18- Lawler J, Osman M, Shelton JA, Yeh J. Population-based analysis of hypertensive disorders in pregnancy.

Evaluation of Some of the Risk Factors for Preeclampsia

I *M. Kashanian, MD *II* R. Ali Mohammadi, MD *III* H.R. Baradaran, MD, PhD

Abstract

Background & Aim: Preeclampsia is one of the important complications of pregnancy and knowing its risk factors can help us to understand it better. The aim of the present study is to evaluate some of the risk factors for preeclampsia.

Patients and Methods: This retrospective case-control study covered 636 preeclamptic women. 318 preeclamptic women constituted the case group and the other 318 preeclamptic women who were normotensive at the time of delivery were considered as the control group. The following factors were evaluated and compared between the two groups: maternal age, gestational age, nulliparity, occupation, educational status of mother, maternal BMI (Body Mass Index), maternal hemoglobin, blood group and Rh, family history of preeclampsia, history of preeclampsia in the previous pregnancy, being relative to spouse, urinary tract infection (UTI) during the present pregnancy, season in which preeclampsia occurs, neonatal sex, and the method of contraception. The obtained results were analyzed using statistical tests such as Chi-square and Mann-Whitney.

Results: UTI ($P=0.027$, $\phi=0.031$), history of preeclampsia during the previous pregnancy ($P=0.000$, $\phi=0.144$), nulliparity ($P=0.008$, $\phi=0.108$), blood group of A⁺ ($P=0.000$, $\phi=0.129$), and low educational status of mother ($P=0.009$, $\phi=0.007$) were significantly more common in the case group. Maternal hemoglobin was also higher in the case group (12.23 ± 1.41 gr/dl vs 11.9 ± 1.46 gr/dl; $P=0.014$, $\phi=0.042$). The rate of cesarean section was higher in the case group than in the control group [245 cases (77%) vs 85 cases (26.7%), $P=0.000$]. The Apgar score of less than 8 in the first minute of birth was more commonly seen in the case group (28.6% vs 47.4%, $P=0.000$). Gestational age at the time of delivery was lower in the case group (36.48 ± 3.4 weeks vs 37.12 ± 3.3 weeks, $P=0.000$).

Conclusion: UTI, history of preeclampsia during the previous pregnancy, nulliparity, blood group of A⁺, low educational status of mother, and high maternal hemoglobin might be the risk factors for preeclampsia.

Key Words: 1) Preeclampsia 2) Risk Factor 3) Pregnant Women

This article is an abstract of Ms. Ali Mohammadi's thesis advised by Dr. Kashanian in partial fulfillment of a medical doctor's degree.

*I) Associate Professor of Gynecology and Obstetrics. Shahid Akbarabadi Hospital., Molavi St., Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran. (*Corresponding Author)*

II) General Practitioner.

III) Assistant Professor of Epidemiology. Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.