

## گانگلیون داخل استخوانی اسکافوئید (گزارش یک مورد و مروری بر مقالات پزشکی)

### چکیده

دکتر ابراهیم عامری\*

گانگلیون داخل استخوانی برخلاف نوع نسج نرم آن نسبتاً نادر بوده ولی از لحاظ هیستولوژی و پاتوژنز کاملاً مشابه آن است. معمولاً در سنین میانه عمر در ناحیه اپی فیز استخوانهای طویل بخصوص در استخوان تیبیا و کمر در استخوانهای کوتاه ظلیر مج دست دیده می شود. نادر بودن آن ممکن است به علت اسامی عدیده ضایعه یا بدون علامت بودن آن باشد.

درد که با فعالیت تشدید می شود از علائم آن است. تستهای آزمایشگاهی طبیعی است. در رادیوگرافی ضایعه بصورت استوپلیتیک با حدود کاملاً مشخص بصورت تک حجره ای یا چند حجره ای با کناره اسکلروتیک مشهود است. در اسکن استخوان افزایش جذب ماده رادیواکتیو دیده می شود. دو نوع اساسی از ضایعه شرح داده شده است: ۱- نافذ (گانگلیون ابتدا در خارج استخوان ساخته می شود و سپس به تدریج به داخل استخوان نفوذ می کند)، ۲- ایدیوپاتیک (ضایعه به صورت اولیه در داخل استخوان ایجاد می گردد). پاتوژنز گرچه دقیقاً مشخص نیست، ولی در بین توری های مطروحه متاپلازی و پرولیفراسیون اولیه سلولهای مزانشیمی (فیبروبلاست) در داخل استخوان، ترشح موسین و تجمع آن و در نتیجه ایجاد کیست بیشتر مورد قبول است. درمان با کورتاژ و پیوند استخوان یا اکسیزیون است. عود نادر است. در این مقاله یک بیمار با گرفتاری استخوان اسکافوئید مج دست معرفی شده و گزارشات پزشکی در این زمینه بررسی گردیده است.

### ۲- گانگلیون

### ۴- استخوانهای مج دست

### کلیدواژه ها: ۱) کیست استخوان

### ۳- اسکافوئید

### مقدمه

گانگلیون نسج نرم نخستین بار توسط بقراط شرح داده شد. برخلاف گانگلیون نسج نرم که بسیار شایع است، فرم داخل استخوانی آن نادر می باشد (۹، ۱۵ و ۲۲)، اولین گزارش توسط Hicks در سال ۱۹۵۶ منتشر گردید.<sup>(۷)</sup>

گانگلیون به دو نوع نافذ و ایدیوپاتیک تقسیم می شود.<sup>(۲۲)</sup> ضایعه معمولاً در اپی فیز استخوانهای طویل دیده می شود.

\*- استادیار گروه ارتپیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - بیمارستان شفایحیان

در رادیوگرافی مج دست (تصویر شماره ۱) ضایعه لیتیک بیضی شکل به ابعاد تقریبی  $5 \times 3$  میلیمتر در ناحیه ثلث میانی وپروگزیمال اسکافوئید چپ مشاهده گردید، که حدود آن کاملاً مشخص بود و به نظر چند حجره‌ای می‌رسید، در اطراف ضایعه باریکه‌ای از استخوان واکنشی مشهود بود، سطوح مفصلی استخوان اسکافوئید دست نخورده و سالم بود.

در اسکن استخوان با  $Tc-MDP$  ۹۹ (تصویر شماره ۲)

افزایش جذب در استخوان اسکافوئید چپ مشاهده گردید.

بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت: از طریق برش در سطح قدامی مج استخوان اسکافوئید ظاهر گردید، غضروف سطوح مفصلی طبیعی بود، ناحیه میانی استخوان با یک کورت ظرفی باز شد، ماده‌ای ژله‌مانند و غلیظ و چسبنده خارج گردید. جداره کیست که پوشیده از لایه ظرفی از نسج بود کوتاه شد حفره‌ای چند حجره‌ای با حدود کاملاً مشخص باقی ماند و با استخوان اسفنجی که از متافیز تحتانی رادیوس بدست آمد پر گردید، عضو به مدت دو هفته در آتل کوتاه بسی حركت شد.

تشخیص گانگلیون با پاتولوژی تأیید گردید.  
در آخرین ویزیت که سه ماه پس از عمل جراحی صورت گرفت بیمار فاقد درد بود. دامنه حرکات مج دست طبیعی و ضایعه ترمیم شده بود.

مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده اختلاف نظر نسبتاً شایع گزارش گردیده است و توصیه شده که بسویژه در دردهای مج دست باشستی به آن توجه نمود<sup>(۱۴)</sup>.


هدف از این مقاله معرفی یک مورد نادر گرفتاری استخوان اسکافوئید و بررسی مقالات منتشره با تأکید بر پاتوژنز بیماری است.

### معرفی بیمار

بیمار خانم ۲۳ ساله، ماشین‌نویس و راست دست است که بعلت درد مج دست چپ با سابقه یک ساله مراجعه نموده است. شروع درد تدریجی و بدون سابقه ضربه بوده و با فعالیت تشدید می‌شده است. از سه روز قبل از مراجعه درد بصورت ناگهانی شدت یافته و به انگشت شست انتشار داشته است. در معاينه بالینی تورم مختصری در ناحیه پشت مج دست در سمت رادیال و حساسیت در *Snuff box* داشت، دامنه حرکات مج دست و انگشتان طبیعی بود. در سطح قدامی مج دست راست تودهای از نسج نرم به ابعاد یک در یک سانتی‌متر (تشخیص بالینی: گانگلیون) وجود داشت که سابقه ایجاد آن را از دو هفته قبل ذکر می‌کرد. معاينه سایر قسمتهاي بدن طبیعی بود. تستهاي آزمایشگاهی نرمال بودند.



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۲

شیوع در دیستال تی بیا (قوزک داخلی)، پروگزیمال تی بیا<sup>(۵)</sup>، ران، استخوانهای مچ دست<sup>(۱۹،۱۸،۱۰،۱۲،۱۳،۱۴،۱۶،۱۷)</sup> و استخوانهای پادیده می شود.

حدود ۱ موارد استخوان ساق پا (تی بیا) مبتلا است و در استخوانهای پهن هم دیده شده است<sup>(۷،۹،۱۵،۲۲)</sup>.

از نظر علامت بالینی ممکن است فاقد هرگونه علامتی باشد و بصورت یک یافته اتفاقی هنگام رادیوگرافی کشف گردد. درد خفیف که با فعالیت تشدید می شود و برای چندماه تا چندسال وجود داشته است از علل مراجعه بیماران است. تورم مختصر در نسوج نرم و حساسیت در لمس از سایر نشانه های بیماری است.<sup>(۱۵)</sup>

تستهای آزمایشگاهی طبیعی است<sup>(۲۲)</sup>.

در رادیولوژی ضایعه بصورت لیتیک، دایره یا بیضی شکل با حدود مشخص، Eccentric طویل در نزدیک غضروف مفصلی مشاهده می گردد. کیستهای کوچک تک حفره ای و انواع بزرگ چندحفره ای هستند و گاهی ارتباطی بصورت یک خط ترانس لوستن بین کیست و مفصل مشهود است.

اندازه ضایعه بیشتر اوقات بین ۱-۲ سانتیمتر است ولی تا ۷ سانتیمتر هم گزارش شده است<sup>(۱۵)</sup>. در اطراف کیست یک لایه استخوان اسکلروتیک واکنشی دیده می شود که نشانه رشد کند

### بحث

براساس طبقه بندی W.H.O از تومورهای استخوانی، Juxta Articular Bone Cyst یا گانگلیون داخل استخوانی عبارت است از یک ضایعه خوش خیم کیستیک و اغلب چند حفره ای که از نسج فیبرو با تغییرات فراوان موکوئید ساخته شده و در ناحیه زیرغضروف استخوان مجاور یک مفصل قرار گرفته است و از لحاظ رادیولوژیک بصورت یک ضایعه استئولیتیک با اسکلرöz اطراف دیده می شود<sup>(۲۲)</sup>.

از لحاظ نمای ظاهری و میکروسکوپی مشابه گانگلیون نسج نرم است و حاوی ماده ای غلیظ، چسبنده و سرشار از موسین می باشد. گرچه ظاهرآ مشابه کیست بینظر می رسد ولی بر اساس تعریف دقیق پاتولوژی یک کیست محسوب نمی شود زیرا فاقد لایه پوشاننده اپی تلیال است. معمولاً در سنین میانه عمر دیده می شود<sup>(۵،۹،۱۵،۲۲)</sup>، حداقل سن ۱۴ سال و حداقل ۸۶ سال گزارش شده است<sup>(۲۳)</sup>.

گرچه در بعضی مقالات ضایعه بیشتر در زنان گزارش شده است ولی اغلب محققین شیوع بیشتری را در مردان گزارش نموده اند<sup>(۷،۲۲)</sup>، و عده ای نیز معتقدند که تفاوتی در دو جنس از نظر شیوع دیده نمی شود.

هر استخوان مجاور مفصل ممکن است درگیر شود معمولاً ناحیه اپی فیز استخوانهای طویل مبتلا است، ضایعه به ترتیب

## پاتوژن

- پاتوژن ایجاد ضایعات دقیقاً مشخص نیست ولی بنظر می‌رسد که مشابه گانگلیون نسج نرم باشد<sup>(۲۲)</sup>.
- اساساً به نظر می‌رسد که دو نوع گانگلیون داخل استخوانی وجود دارد: ۱- نوع نافذ که در این نوع احتمالاً گانگلیون ابتدا در نسوج نرم اطراف ایجاد و به تدریج به داخل استخوان نفوذ می‌کند.
- ۲- نوع ایدیوپاتیک که در این نوع گانگلیون از ابتدا در داخل استخوان ایجاد می‌گردد (۸۴ درصد موارد).
- جهت تبیین پاتوژن بیماری تئوریهای مختلفی پیشنهاد شده است:
- ۱- گانگلیون در نسوج نرم مجاور مفصل ایجاد و سپس به تدریج به داخل استخوان نفوذ می‌نماید<sup>(۲۲)</sup>. *Kambolis*<sup>(۱)</sup> و همکارانش این فرم را مهمترین نوع می‌دانند<sup>(۴)</sup>. اما در اغلب موارد ارتباطی بین کیست و نسوج نرم مجاور موجود نیست که این مسئله بر خلاف تئوری فوق است *Kambolis* معتقد است که این ارتباط ابتدا وجود داشته است و سپس در اثر واکنش استخوان و استخوانسازی از بین رفته است.
  - ۲- تئوری فق سینوویال: نزدیکی گانگلیون به مفصل این تصور را ایجاد می‌نماید که احتمالاً سینوویوم از کپسول مفصلی یا غلاف تاندون به علت یک نقص تروماتیک به داخل استخوان وارد و تدریجی رشد می‌نماید. لازم به ذکر است که از نظر پاتولوژی جداره گانگلیون فاقد سلولهای سینوویال است و در اغلب موارد سابقه ترومما در بیمار به دست نمی‌آید<sup>(۱۵) و (۹)</sup>.
  - ۳- تئوری بقایای نسج سینوویوم: باقی ماندن بقایای جنینی سینوویوم در داخل استخوان و رشد تدریجی آن مطرح گردیده است ولی همچنان که ذکر شد در جداره گانگلیون سلولهای سینوویال مشهود نیست<sup>(۱۵)</sup>.
  - ۴- تئوری دژنسانس موکوئید: در این تئوری ایجاد کیست را به دژنسانس موکوئیدی عناصر همبندی نسبت داده اند لیکن در بررسیهای بعمل آمده ترشح فعال موسین توسط سلولهای جدار کیست مشاهده شده است<sup>(۶)</sup>. در واقع ایجاد موسین ناشی از یک فعالیت متابولیک است تا دژنسانس و بر همین اساس پس از تخلیه محتویات کیست مجدداً موسین تراوش خواهد شد.

و خوش خیم بودن ضایعه است<sup>(۲۲، ۹، ۱۴، ۱۵)</sup>. از مشخصات مهم رادیوگرافی آن است که بر خلاف کیست اوستئوآرتربیت، غضروف مفصلی نرمال است و فاصله مفصلی کاهش نیافتد است. در اسکن استخوان افزایش جذب ماده رادیواکتیو دیده می‌شود<sup>(۱۴ و ۲)</sup>.

*MRI* و *C.T.Scan* به بررسی حدود ضایعه و تعیین برنامه درمان جراحی کمک می‌کند. بایستی توجه داشت که ممکن است رادیوگرافی ساده طبیعی باشد ولی اسکن استخوان افزایش جذب نشان دهد و یا ضایعه در *MRI* قابل رویت باشد<sup>(۱۴)</sup>، لذا توصیه می‌شود که در موارد علامت‌دار که رادیوگرافی ساده ضایعه‌ای را نشان نمی‌دهد اسکن استخوان و *MRI* صورت گیرد.

از نظر هیستوپاتولوژی ضایعه کاملاً مشابه گانگلیون نسج نرم است، از یک جداره فیبرو تشکیل شده و داخل آن از ماده‌ای ژله‌مانند، موکوئید و غلیظ به رنگ سفید یا مایل به زرد پر شده است و به راحتی از نسوج مجاور جدا می‌شود<sup>(۵، ۹، ۱۵ و ۲۲)</sup>، در ضایعات جوانتر جداره توسط سلولهای *Myxofibroblast* پوشیده شده و در بین این سلولها تجمع موسین مشهود است. تعدادی سلول فیبروبلاست نیز در جداره مشاهده می‌گردد. در ضایعات قدیمی تر سلولهای *Myxofibroblast* مشهود نیست<sup>(۱۵ و ۲۲)</sup>. در استخوان اسفنجی مجاور ضایعه فعالیت استخوانسازی و جذب استخوان توأمًا دیده می‌شود<sup>(۲۲)</sup>.

تشخیص‌های افتراقی گانگلیونهای داخل استخوانی عبارتست از<sup>(۱۵ و ۲۲)</sup>:

- ۱- کوندروبلاستوما
- ۲- ژانت سل تومور
- ۳- *Pigmented Villonodular Synovitis*
- ۴- کیست استئوآرتربیت
- ۵- استئوئیداستئوما
- ۶- کوندروما
- ۷- کیست اسٹریکتوما
- ۸- *Non Ossifying Fibroma*
- ۹- *Aneurysmal bone cyst*
- ۱۰- کوندرومیسکوکوئیدفیبروما
- ۱۱- کیست ساده استخوان
- ۱۲- کوتورو میسکوکوئیدفیبروما
- ۱۳- نقرس
- ۱۴- استئوبلاستوما
- ۱۵- *Brodies Abcess*
- ۱۶- *fibro-dysplasia*

ایجاد می‌شود، این سلولها بصورت فعال به ترشح موسین می‌پردازند. تجمع موسین در نسوج همبند و دژنرنسانس ثانوی آن منجر به ایجاد کیست می‌گردد<sup>(۱۱)</sup>.

این تئوری با کارهای بعدی سایر محققین اساس محکمتری می‌یابد<sup>(۱۲)</sup>. این عده در مطالعات خود متوجه پرولیفراسیون اولیه سلولهای فیبروبلاست، ترشح اسیدهای الورونیک و تجمع آن در نسوج همبندی و ایجاد کیست شدند. این محققین سلول پرولیفراتیو اولیه را فیبروبلاست می‌دانند برخلاف King آنرا *Synoviocytic* می‌دانست. شاید اسم صحیح تر این سلولها *Hyaluronblast* باشد زیرا ایتها در واقع سلولهای اولیه مزانشیمی هستند و می‌توانند هم به سلولهای *Synoviocytic* و هم به سلولهای فیبروبلاستیک تبدیل شوند<sup>(۵)</sup>.

به هر حال قابل قبول ترین تئوری در حال حاضر در مورد پاتوژن گانگلیون ترکیبی از متاپلازی سلولها در داخل استخوان، پدیده پرولیفراسیون و در تعقیب آن مرحله دژنراتیو و ایجاد کیست است<sup>(۵)</sup>. اگرچه علت اولیه این متاپلازی نامشخص است ولی ممکن است میکروترووما، نکروز موضعی استخوان و سپس برقراری مجدد خونرسانی عامل محرك باشد.

۵- تعدادی از محققین احتمال داده‌اند که در اثر نقص موجود در سطح مفصلی، مایع سینوویال به داخل استخوان راه یافته و منجر به ایجاد گانگلیون گردد.

بعضی نیز معتقدند که در اثر ترومایک شکستگی کوچک در سطح مفصلی ایجاد می‌شود و مایع سینوویال توسط یک عمل پمپ مانند از داخل مفصل به استخوان وارد می‌شود. Menges با استفاده از توموگرافی توانست در ۵۷ درصد موارد ارتباطی بین فضای کیست و مفصل بیابد که این مسئله احتمال تروماتیک بودن ضایعه را افزایش می‌دهد<sup>(۲۲)</sup>. همچنین Luke با آرترومگرافی ارتباط بین کیست لونیت و مفصل اسکافولونیت را اثبات کرد. ولی سایر محققین اغلب قادر به یافتن چنین ارتباطی نبوده‌اند<sup>(۱۳)</sup>.

۶- تعدادی از نویسندهای اخلاقی و اسکولر و نکروز موضعی استخوان را مؤثر می‌دانند که عامل آن می‌تواند ضربه‌های جزئی باشد، به هر حال در پاتولوژی علائمی از نکروز استخوان یافت نمی‌شود<sup>(۲۲)</sup>.

۷- تئوری متاپلازی یا پرولیفراسیون نسج همبند: King معتقد است که ابتدا یک هیپرپلازی سلولی در سلولهای

<i>Bone Metaplasia</i>	<i>Intramedullary Fibroblasts</i>	<i>Proliferation Mucin Secretion</i>	<i>Hyaluronic Acid Accumulation</i>
<i>Pressure Atrophy</i>		<i>Intraosseous Cyst Formation</i>	
<i>Intramedullary Trabecular Degeneration</i>			

در سمت چپ مبتلا به گانگلیون نسج نرم بوده که به تدریج به داخل استخوان اسکافوتید نفوذ نموده است. از نظر درمان کورتازی با یا بدون پیوند استخوانی و یا اکسیزیون معمولاً سبب بهبود کامل ضایعه می‌شود<sup>(۹،۱۵،۲۲)</sup>، عود ضایعات نادر است، در بررسی‌های مختلف عود گزارش شده است و در یک بیمار ظرف ۱۶ سال شش مرتبه عود دیده شده است<sup>(۲۳)</sup>.

در بیمار معرفی شده با توجه به وجود گانگلیون نسج نرم در مج دست مقابل و با توجه به شغل بیمار (ماشین‌نویس) می‌توان پاتوژن مشابهی را در مورد هر دو ضایعه فرض نمود. در واقع میکروتروماهای مکرر ناشی از شغل بیمار می‌تواند منجر به ایجاد ضایعه در استخوان مج دست در یک سمت و در نسج نرم طرف مقابل شده باشد. این تئوری نیز قابل طرح است که بیمار

## REFERENCES

- 1) Albaladego Mora F et al; *Intraosseous ganglion of Carpal Scaphoid: a Case report*; J.Hand. Surg. An., No. 18(4) 1993 PP: 665-6
- 2) Brown DM et al; *Intraosseous ganglion of the trapezoid*; J.Hand. Surg. Am., No.19(4), 1994; PP:607-8
- 3) Eiken O et al; *Carpal bone cysts: A clinical and radiographic study*, Scand- J.Plast.Reconstr. Surg, No(14),1980; PP: 285-90
- 4) Forstner H; *Intraosseous ganglion in the area of the wrist*, Chirurg, No. 63(11), 1992; PP: 977-9
- 5) Goldman R.L et al; *Ganglia (Synovial Cysts) arising in unusual locations: report of three cases*; Clin ortho & related research, No.(63), 1969; PP: 184-9
- 6) Helwig U et al; *The intraosseous ganglion: a clinical-pathological report on 42 cases*; Arch orthop trauma Surg, No. 114(1), 1994; PP: 14-7
- 7) Hicks J.D; *Synovial Cysts in Bone: Australian and New Zealand Journal of Surgery*, No.26, 1956; PP: 138-143
- 8) Jonsson K et al; *Development of carpal bone cysts as revealed by radiography*; Acta Radiol (Diagn), No.24, 1983; PP: 231-3
- 9) Kambolis C et al; *Ganglionic cystic defects of bone*; JBJS No.55-A, 1973; PP: 496-505
- 10) Kaplan E.B; *Intraosseous ganglion of the scaphoid bone of the wrist: case report*, Bull-Hosp-Joint-Dis, No.32(1), 1971; PP: 50-3
- 11) King E.S; *Pathology of ganglia, Australian & New Zealand*. J.Surg, No.1, 1932; PP: 367-381
- 12) Logan S.E et al; *Bilateral scaphoid ganglion cysts in an adolescent*; J.Hand Surg (Am), No.17, 1992; PP: 490-495
- 13) Luke D et al; *Communicating intraosseous ganglion of the lunate*, Can Assoc Radiol J, No. 44, 1993; PP: 304-6
- 14) Magee T.H et al: *Intraosseous ganglia of the wrist*. Radiology. No.195(2), 1995; PP: 517-20
- 15) Mirra J.M et al: *Bone tumors: Clinical, radiologic and pathologic correlations*; Lea & Febiger, Philadelphia, 1989; PP: 1320-1325
- 16) Mora F et al; *Intraosseous ganglion of carpal scaphoid: a case report*; J.Hand Surg (Am); No.18, 1993; PP: 665-6
- 17) Morris C.C et al; *Production of acid mucopolysaccharides by fibroblasts in cell cultures*, Nature, No. 188, 1960; PP: 407-9
- 18) Ohman U et al; *Carpal ganglia: a follow up study*; Scand. J. Plast. Reconstr. Surg, No. 5(2), 1971; PP:10-5
- 19) Peterson T; *Intraosseous ganglion of the scaphoid bone: a case report*, Handchir. Mikrochir. Plast. Chir, No.25(5), 1993; PP: 227-9
- 20) Pope T et a; *Intraosseous ganglion*; Skeletal Radiology; No. 18, 1989; PP: 185-8
- 21) Schajowicz F et al; *Histological typing of bone tumor*; International Histological Classification of tumors, No.6, 1972; Geneva: World Health Organization
- 22) Schajowicz F et al; *Juxta-articular bone cysts (intraosseous ganglia) A clinicopathological study*, JBJS, No.50-B, 1968;PP: 312-7
- 23) Sim F.H et al; *Ganglion cysts of bone*, Mayo. Clin. Proc, No. 46, 1971; PP: 484-8
- 24) Tavernier T et al; *A rare bone abnormality: intra-bone synovial cyst. Apropos of a case*, J.Radiol No. 72(8-9), 1991; PP: 421-4
- 25) Treadwell E; *Synovial cysts and ganglia; the value of magnetic resonace imaging*, J. Semin., Arthritis & Rheum. No.24(1), 1994; PP: 61-70

---

## INTRAOSSEOUS GANGLION OF THE SCAPHOID (REPORT OF ONE CASE & REVIEW OF THE LITERATURE)

*E. Ameri, M.D.\**

### **ABSTRACT**

*Although soft tissue ganglia are commonly encountered, their intraosseous counterparts have been rarely recorded. This apparent rarity may be due to confusion in terminology or asymptomatic lesions.*

*The intra osseous ganglion is grossly and histologically identical to soft tissue ganglion and has the same pathogenesis.*

*The patient has mild pain during activity or may be asymptomatic. Lab tests normal.*

*These lesions present a characteristic lytic roentgenographic appearance with sclerotic rim and are most often seen eccentrically at the end of a long bone, frequently the lower end of the tibia, in middle aged patients.*

*Bone scan demonstrates increased uptake.*

*There are two types of lesions: one apparently arising from penetration of soft tissue ganglion into the underlying bone, and the other is an idiopathic form which is primarily intra osseous.*

*Although the pathogenesis is still uncertain, current opinion tends to support the theory of intramedullary metaplasia and proliferation of fibroblastic elements (fibroplasia): The mechanical stress and repeated minor trauma near the surface of the bone may lead to intramedullary vascular disturbance with consequent foci of aseptic bone necrosis. The revitalisation of these areas causes fibroblastic proliferation, followed by a degenerative stage with mucoid secretion and accumulation which enlarges the ganglionic cyst.*

*Curretage (with or without bone graft) or excision is usually effective, and recurrence is rare.*

*The purpose of this paper is to describe a case of an intraosseous ganglion occurring within the scaphoid bone, and review of the literature.*

**Key Words:** 1) Bone cyst

2) Ganglion

3) Scaphoid

4) Carpal bone

---

\* Assistant Professor of Orthopedics- Iran University of Medical Sciences and Health services