

# بررسی میزان پوشش واکسیناسیون کودکان ۱۴-۱۲ ماهه در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - خرداد ۱۳۷۶\*

## چکیده

امروزه به برکت ارائه خدمات ایمن‌سازی در قالب برنامه *EPI* سالانه جان بیش از سه میلیون کودک حفظ و به رشد مطلوب هیلیونها کودک کمک می‌شود اما علیرغم برنامدهای جاری *EPI* هنوز هم بیماریهای قابل پیشگیری می‌توانند از کودکان معصوم قربانی بگیرند.

مطالعه حاضر به منظور تعیین درصد پوشش ایمن‌سازی کودکان ۱۲-۲۴ ماهه مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و نیز مشخص نمودن مناطقی که نیاز به پایش و مراقبت دارد انجام شده است. در این تحقیق از پنج منطقه غرب تهران، کرج، شهریار، رباط کریم و ساوجبلاغ جمعاً ۴۷ خوشه ۷ تائی مورد بررسی قرار گرفته است. ۵۳/۸ درصد کودکان مورد بررسی دختر و ۴۶/۲ درصد پسر بودند، توزیع سنی این گروه نرمال می‌باشد، بطوری که میانگین سنی ۱۷/۷ ماه میانه ۱۸ ماه و مدنظر ۱۷ ماه بوده است.

نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از این است که :

میزان پوشش واکسیناسیون ب.ث.ز = ۹۹/۴ درصد، میزان پوشش واکسیناسیون سه‌گانه ۱ = ۹۷/۶ درصد،  
میزان پوشش واکسیناسیون سه‌گانه ۲ = ۹۸/۲ درصد، میزان پوشش واکسیناسیون سه‌گانه سوم = ۹۶/۶ درصد  
میزان پوشش واکسیناسیون سه‌گانه نوبت چهارم = ۸۰/۵ درصد، میزان افت پوشش واکسن سه‌گانه از ۱ به ۳ = ۱ درصد  
میزان پوشش ایمن‌سازی فلج اطفال برای نوبت صفر = ۹۹/۷ درصد و بقیه نوبتها مشابه سه‌گانه بوده است.  
میزان پوشش ایمن‌سازی هپاتیت نوبت صفر = ۹۹/۱ درصد، میزان پوشش ایمن‌سازی هپاتیت نوبت یک = ۹۷ درصد  
میزان پوشش ایمن‌سازی هپاتیت نوبت دو = ۹۲ درصد و میزان افت پوشش واکسیناسیون هپاتیت از صفر بدو = ۷/۲ درصد.  
میزان پوشش ایمن‌سازی سرخک ۱ = ۹۵/۴ درصد، میزان پوشش ایمن‌سازی سرخک ۲ = ۸۱/۴ درصد و  
میزان افت پوشش ایمن‌سازی سرخک = ۱۴/۳ درصد (پس از ۱۹/۸ درصد و دختران ۹/۶ درصد)  
در مقایسه میزانهای پوشش در مناطق پنجگانه منطقه رباط کریم از ضعف بیشتری برخوردار بوده و لزوم مراقبت و برنامه‌ریزی دقیقی را جهت اصلاح طلب می‌نماید.

*EPI*-۳

۲- پوشش واکسیناسیون

کلید واژه‌ها: ۱- ایمن‌سازی

\* این گزارش بر اساس یکی از پژوهه‌های مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تهیه و تنظیم شده است.

۱- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۲- متخصص پزشکی اجتماعی

۳- پژوهش عمومی

دکتر محمد مهدی گویا<sup>(۱)</sup>

دکتر فخرالسادات امامی اوره<sup>(۲)</sup>

دکتر مهشید ناصحی<sup>(۳)</sup>

## مقدمه

- ۶- تعیین میزان افت پوشش ایمن‌سازی سه‌گانه
- ۷- تعیین میزان افت پوشش ایمن‌سازی هپاتیت
- ۸- مشخص نمودن مناطقی که پوشش واکسیناسیون کمتر از ۹۵ درصد می‌باشد.

در تحقیقی که توسط F.T Cutts و همکاران در سال ۱۹۸۹ در گینه کناکری در این خصوص صورت پذیرفت، ۵۳ درصد کودکان کارت ایمن‌سازی داشتند، ۳۸ درصد کارت ایمن‌سازی را گم کردند، ۸ درصد اصلاً کارت ایمن‌سازی دریافت نکرده بودند (۳۷۷ کودک مورد مطالعه قرار گرفته بودند). در کودکانی که کارت ایمن‌سازی داشتند میزان ایمن‌سازی کامل و صحیح ۳۵ درصد بود از ۱۳۳ کودکی که واکسن سرخک را تزدهبودند ۶۱ درصدشان سابقه مراجعته به مرکز بهداشتی درمانی بعد از ۹ ماهگی را داشته‌اند (۲).

در بررسی کشوری پوشش ایمن‌سازی کودکان ۲۳-۲۴ ماهه در کشور هندوستان که در سال ۱۹۸۷ توسط Bhaneaar و همکاران صورت پذیرفت کودکان کامل ایمن شدند (Fully Immunized) ۴۴/۶ درصد و کودکان با ایمن‌سازی ناقص ۳۸/۶ درصد و کودکان غیرایمن ۱۶/۷ درصد برآورده‌اند.

۸۳/۲ درصد	پوشش ایمنی سه‌گانه ۱
۷۶/۷ درصد	پوشش ایمنی سه‌گانه ۲
۶۵/۵ درصد	پوشش ایمنی سه‌گانه ۳
۴۵/۱ درصد	پوشش ایمنی سه‌گانه سرخک

میزان افت پوشش واکسیناسیون سه‌گانه و فلج اطفال ۲/۱ درصد گزارش شده است (۱).

در تحقیقی دیگر در سال ۱۹۹۱ که توسط Nirupam و همکاران روی ۲۱۰ دختر و ۲۱۰ پسر در منطقه شهری نگارستاپور هندوستان صورت پذیرفت، میزان پوشش ایمن‌سازی فلح اطفال در پسران ۶۰/۹ درصد و در دختران ۴۹/۵ درصد میزان پوشش ایمن‌سازی سه‌گانه ۳ در پسران، ۶۵/۲ درصد و در دختران ۵۱ درصد برآورده است.

میزان افت پوشش ایمن‌سازی در دختران بطور معنی‌داری بیش از پسران بوده است (۳).

امروزه به برکت ارائه خدمات واکسیناسیون در قالب برنامه EPI (Expanded program on Immunization) سالانه جان بیش از سه میلیون کودک حفظ و به رشد طبیعی میلیونها کودک کمک می‌شود. بنا به اظهار کارشناسان بهداشتی اگر واکسن‌های کارآمد علیه تمامی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، به کار گرفته شود می‌توان سالانه از مرگ بیش از ۱۶ میلیون نفر در جهان پیشگیری نمود.

بدون اقدامات ایمن‌سازی کودکان متولد شده بطور متوسط ۲ درصد در اثر سرخک، ۲ درصد در اثر سیاه‌سرفه، ۱ درصد در اثر کراز می‌میرند و ۱/۵ درصد موارد ابتلاء به فلج اطفال دچار عوارض بیماری می‌گردد (۴).

در حال حاضر علیرغم برنامه‌های جاری ایمن‌سازی EPI سرخک عامل مرگ سالانه ۱/۱ میلیون کودک و کراز نوزادی عامل مرگ ۱/۵ میلیون کودک می‌باشد بنابراین ارائه خدمات واکسیناسیون به تنهایی پایان مشکل نیست چراکه هر نسل از نوزادان متولدشده (بیش از ۱۰۰ میلیون نوزاد در سال اول زندگی نیاز به حداقل ۴-۵ نوبت واکسیناسیون دارد) عوامل مهم دیگری همچون شاخص اولویت دادن به ایمن‌سازی، خودکفایی دولتها در امر تهیه واکسن، پایش منظم برنامه‌های ایمن‌سازی و انجام تحقیقات کاربردی جهت ارزشیابی پوشش واکسیناسیون و شناسائی نقاط ضعف و قوت برنامه نقش مهمی در تداوم برنامه‌های ایمن‌سازی دارد و این مهم جز در سایه تلاشهای پیگیر و برنامه‌ریزی در جهت حفظ پوشش واکسیناسیون در سطح مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

اهداف پژوهشی در این مطالعه عبارتند از:

- ۱- تعیین درصد پوشش ایمن‌سازی ب.ث.ر. بدرو تولد
- ۲- تعیین درصد پوشش ایمن‌سازی واکسن فلح اطفال در هر یک از مراحل صفر، یک، دو، سه و چهار
- ۳- تعیین درصد پوشش ایمن‌سازی واکسن سه‌گانه در هر یک از مراحل یک، دو، سه و چهار
- ۴- تعیین درصد پوشش ایمن‌سازی هپاتیت در مراحل صفر، یک و دو
- ۵- تعیین درصد پوشش ایمن‌سازی سرخک در هر یک از مراحل یک و دو

## روش بررسی

این مطالعه به روش توصیفی مقطعی - (Cross sectional Descriptive) بر روی خانوارهای ساکن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که شامل غرب تهران، کرج، ساوجبلاغ، رباط کریم و شهریار می‌باشد صورت پذیرفت.

نمونه‌گیری به روش خوش‌ای طبقه‌بندی شده انجام شده است. با جستجو در اکثر مطالعات انجام شده تعداد نمونه ۲۰ (۳۰ خوش ۷ تائی) مورد تحقیق قرار گرفته بود و معمولاً در اکثر تحقیقات بهداشتی بر اساس فرمول  $N = \frac{(Z^2 \cdot p \cdot (1-p))}{d^2}$  با ضریب اعتماد ۹۵ درصد و دقت ۵ درصد با محاسبه  $= 2/5$   $D.E$  تعداد نمونه برای نمونه‌گیری خوش‌ای حدود ۲۱۰-۲۳۰ برآورد می‌گردد<sup>(۱)</sup>. پس از انجام مشاوره آماری با متخصص اپیدمیولوژی جهت به حداقل رساندن میزان خطای مطالعه با استفاده از روش Cluster Sampling (خوش‌ای) و در نظر گرفتن خطای ۵ درصد با استفاده از مأخذ تئوریک نمونه‌گیری EPI (سازمان جهانی بهداشت {limshow} و مأخذ محاسبه EPI 6 ویرایش ۶/۰۴ حجم نمونه ۴۷ خوش ۷ تائی یا ۳۲۹ کودک ۱۲-۲۴ ماهه محاسبه گردیده است.

پس از تعیین تعداد خوش‌ای مورد بررسی در هر یک از مناطق پنجگانه (به نسبت جمعیت تحت پوشش) و تهیه لیست تجمعی از جمعیتهای مختلف مختلف شهری و روستائی و تعیین فاصله بین خوش‌ای، اولین سرخوش بر اساس انتخاب تصادفی تعیین گردیده و با افزودن مرتب فاصله بین خوش‌ای مناطق مورد تحقیق لیست گردیدند. سپس از لیست خیابانهای هر یک از مناطق آدرس سرخوش‌ها بصورت تصادفی تعیین گردید. از محل اولین سرخوش به سمت راست تا پیدانمودن ۷ نمونه مورد نظر و تکمیل ۷ پرسشنامه مربوطه، بررسی ادامه می‌یافتد. تعداد خوش‌های مورد بررسی در هر یک از مناطق بشرح ذیل می‌باشد:


● غرب	۱۵	خوش ۷ تائی
● کرج	۱۴	خوش ۷ تائی
● شهریار	۷	خوش ۷ تائی
● رباط کریم	۵	خوش ۷ تائی
● ساوجبلاغ	۶	خوش ۷ تائی

## نتایج


سن کودکان مورد بررسی (۱۲ تا ۲۴ ماهه) با میانگین سنی

۹۷/۶ درصد	میزان پوشش واکسیناسیون سه گانه ۱
۹۸/۲ درصد	میزان پوشش واکسیناسیون سه گانه ۲
۹۶/۶ درصد	میزان پوشش واکسیناسیون سه گانه ۳
۸۰/۵ درصد	میزان پوشش واکسیناسیون سه گانه ۴
۹۹/۱ درصد	میزان پوشش ایمن‌سازی هپاتیت نوبت صفر
۹۷ درصد	میزان پوشش ایمن‌سازی هپاتیت نوبت ۱
۹۲ درصد	میزان پوشش ایمن‌سازی هپاتیت نوبت ۲
۹۵/۴ درصد	میزان پوشش ایمن‌سازی سرخک نوبت اول
۸۱/۴ درصد	میزان پوشش ایمن‌سازی سرخک نوبت دوم
۹۵ افت پوشش ایمن‌سازی سه گانه (اول تا سوم) ۱ درصد	میزان افت پوشش ایمن‌سازی سه گانه (اول تا سوم)
۷/۱ درصد	میزان افت پوشش ایمن‌سازی هپاتیت (از نوبت صفر تا ۲)

\* مناطقی که درصد پوشش واکسیناسیون کمتر از ۹۵ درصد بوده طبق جدول صفحه ۱۵ مشخص گردیده است.



نمودار ۱- درصد پوشش کلی واکسن ب ث ژ



نمودار ۲- درصد پوشش کلی واکسن خالج کردن


۱۷/۷۸ ماه و بیشینه (مد) ۱۷ (۹/۸ درصد) و میانه ۱۸ از توزیع نسبتاً متعددی برخوردار بود. از نظر جنسیت نیز ۸/۵۳ درصد کودکان دختر و ۲/۴۶ درصد آنان پسر بودند. از نظر رتبه تولد نیز ۹/۸۲ درصد آنها فرزند اول تا سوم خانواده، ۲/۱۲ درصد فرزند چهارم یا پنجم و مابقی ششم تا نهم بوده‌اند. ۴/۹۵ درصد آنها در زایشگاه و ۴/۲ درصد در منزل متولد شده‌بودند. (۱/۲ درصد نامشخص) از نظر وضعیت سنی مادران ۵/۱۰ درصد زیر ۲۰ سال (با حداقل ۱۸ سال) و ۴/۹۱ درصد زیر ۳۵ سال سن داشتند که البته توزیع سنی آنان نسبتاً متعدد بوده است. (میانگین ۹/۲۶) سال، مدد ۲۴ (۹ درصد)، میانه ۲۶ (۲۶) اکثر مادران تحصیلات زیر دیپلم (۲/۶۰ درصد) داشته و ۶/۱۴ درصد آنها بیسواد بودند.

۳/۸۱ درصد آنها سه فرزند، با میانگین ۹/۳۹ فرزند، داشتند.


از نظر سطح تحصیلات پدر نیز ۶/۷ درصد آنان بیسواد و ۳/۸۶ درصد ایشان تحصیلاتی تا سطح دیپلم داشته‌اند (بالاتر از دیپلم ۱/۶ درصد) و سرانجام از لحاظ تعداد افراد خانواده اکثریت آنها (۷۸/۷۸ درصد) از ۵ نفر کمتر بوده‌اند. (میانگین ۵/۴ نفر، بیشینه (مد) ۳/۳۵ نفر ۸/۳۵ درصد)

قبل از ارائه نتایج بدست آمده در مورد میزان پوشش هر یک از واکسنها لازم به یادآوری است که در تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده برای بدست آوردن میزان پوشش دقیق (به درصد) موارد ایمن‌سازی Early جزو پوشش محسوب نگردیده است. بدیهی است که رقم درصد پوشش واکسن با رقم درصد دریافت واکسن کمی متفاوت است که در قسمت بحث و بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

۴/۹۹ درصد میزان پوشش واکسیناسیون ب.ث.ژ  
۷/۹۹ درصد میزان پوشش ایمن‌سازی فلج اطفال نوبت صفر  
۸/۹۸ درصد میزان پوشش ایمن‌سازی فلح اطفال نوبت ۱  
۵/۹۸ درصد میزان پوشش ایمن‌سازی فلح اطفال نوبت ۲  
۳/۹۶ درصد میزان پوشش ایمن‌سازی فلح اطفال نوبت ۳  
۵/۸۱ درصد میزان پوشش ایمن‌سازی فلح اطفال نوبت ۴



نمودار ۶- میزان کاهش پوشش واکسیناسیون موارد زیر در کل گروه



نمودار ۳- درصد پوشش کلی واکسن سه گانه

### بحث

#### ۱- بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون ب.ث.ر:

بطور کلی  $\frac{۹۹}{۴}$  درصد موارد تحت واکسیناسیون ب.ث.ر قرار گرفته بودند، که  $\frac{۹۴}{۲}$  درصد آنها به موقع و  $\frac{۵}{۸}$  درصد آن با تأخیر صورت پذیرفته بود.

از نظر مناطق تفاوت پوشش تفاوت بارزی دیده می شد، بدینگونه که فقط در یک منطقه (رباط کریم)  $\frac{۷}{۵}$  درصد نمونه ها واکسینه نشده بودند.

کار واکسیناسیون  $\frac{۲۱}{۲}$  درصد نمونه ها نیز در آن منطقه با تأخیر صورت پذیرفته بود. در منطقه ساوجبلاغ نیز  $۱۰۰$  درصد نمونه ها موقع واکسینه شده بودند.


#### ۲- بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون سه گانه:

$\frac{۹۹}{۷}$  درصد کل نمونه ها واکسن سه گانه نوبت اول،  $\frac{۱}{۱}$  درصد نوبت دوم،  $\frac{۹۷}{۹}$  درصد نوبت سوم و  $\frac{۸۲}{۶}$  درصد سه گانه نوبت چهارم خود را دریافت کرده بود.


از لحاظ پوشش واکسیناسیون نیز برای نوبت اول  $\frac{۹۷}{۶}$  درصد، نوبت دوم  $\frac{۹۸}{۲}$  درصد، نوبت سوم و چهارم نیز به ترتیب  $\frac{۹۶}{۶}$  درصد و  $\frac{۸۰}{۵}$  درصد زیر پوشش قرار گرفته اند.

(بديهی است موارد Early جزو پوشش محسوب نگردیده است). میزان افت پوشش ايمنسازی سه گانه (از نوبت اول تا سوم)  $\frac{۱}{۸}$  درصد بوده است.

موارد فوق در بين دو جنس تفاوتی نداشته است. از نظر موقعیت منطقه نیز  $\frac{۱}{۷}$  درصد موارد در منطقه کرج سه گانه نوبت اول را زودتر از موعد و  $\frac{۳۵}{۳}$  درصد موارد در منطقه



نمودار ۴- درصد پوشش کلی واکسن هپاتیت



نمودار ۵- درصد پوشش کلی واکسن سرخ

می شد. قطره نوبت صفر در منطقه رباط کریم به ۲۶/۵ درصد موارد دیر خورانیده شده بود.

نوبت یک نیز در کرج به ۱/۳ درصد موارد زود و در رباط کریم به ۱/۴۶ درصد دیر خورانیده شده بود و کمترین پوشش نوبت نیز مربوط به منطقه کرج بود است.

قطره نوبت دوم در رباط کریم کمترین پوشش را داشته و ۳۷/۵ درصد موارد ساکن آن منطقه قطره را دیر دریافت کرده بودند.

در کرج نیز ۲ درصد موارد زودتر از موعد واکسینه شده بودند.

قطره نوبت سوم در منطقه رباط کریم به ۲۳/۵ و در کرج به ۲/۱ درصد داده نشده بود و ۲/۲ درصد موارد کرج نیز آن را زود دریافت کرده بودند.

باز هم پائین ترین پوشش مربوط به رباط کریم بوده است. ۴۳/۵ درصد موارد ساکن در رباط کریم و ۲۱ درصد در منطقه غرب تهران قطره فلچ نوبت چهار را نخورد بودند، ۲ درصد موارد منطقه غرب و ۵/۶ درصد در کرج آن را زودتر از موعد خورد بودند.

#### ۴- بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون هپاتیت:

هپاتیت نوبت صفر را ۹۹/۱ درصد، هپاتیت یک را ۹۷ درصد و هپاتیت دو را ۹۲ درصد موارد دریافت کرده بودند. از نظر زمان تلقیح ۳۵/۲ درصد موارد نوبت صفر را با تأخیر و در موارد آن را زودتر از موعد دریافت کرده بودند.

میزان افت پوشش ایمنی هپاتیت (از نوبت صفر تا دو) ۷/۱ درصد می باشد.

در مورد موارد فوق اختلاف بین دو جنس دیده نشد.

۱۷/۱ نمونه های ساکن رباط کریم و ۳/۱ درصد نمونه های ساکن کرج هپاتیت یک را دریافت نکرده بودند. هپاتیت نوبت دوم نیز به همان ترتیب به ۵۵/۹ درصد موارد در رباط کریم و ۵/۲ درصد در کرج داده نشده بود. ۵۵/۹ درصد موارد در رباط کریم و ۵۰ درصد موارد در شهریار واکسن نوبت صفر را دیر دریافت کرده بودند.

واکسن نوبت یک و دو را در کرج به ترتیب ۱/۲ درصد و

رباط کریم آن را دیرتر از موعد دریافت کرده اند و پائین ترین پوشش نیز مربوط به کرج (۸/۹۲ درصد) بوده است.

در مورد سه گانه نوبت دوم، ۶/۸ درصد موارد در منطقه رباط کریم واکسینه نشده بودند و ۳۱/۳ درصد موارد واکسینه شده، در آن منطقه نیز با تأخیر واکسینه شده اند. ۳/۳ درصد موارد ساکن کرج نیز پیش از موعد واکسینه شده بودند که پائین ترین پوشش نیز مربوط به رباط کریم بود (۴/۹۱ درصد). در بررسی تلقیح سه گانه سوم در مناطق مختلف ۱۷/۱ درصد موارد در منطقه رباط کریم واکسینه نشده بودند و ۱/۴ درصد موارد در منطقه کرج آن را پیش از موعد و ۵۵/۳ درصد در منطقه رباط کریم آن را با تأخیر دریافت کرده بودند که پائین ترین پوشش مربوط به رباط کریم بود.

در مورد سه گانه چهارم تفاوت در مناطق بارز بوده در منطقه رباط کریم ۴۱/۷ درصد موارد واکسینه نشده و کار ۶۴/۳ درصد موارد واکسینه شده با تأخیر صورت پذیرفته بود، در حالی که در منطقه شهریار ۹۵ درصد موارد واکسینه شده بودند و در منطقه کرج نیز ۵/۶ آن را زودتر از موعد دریافت کرده بودند.

پائین ترین پوشش را رباط کریم داشته است.

از نظر افت ایمن سازی سه گانه تنها در منطقه رباط کریم ۱۴/۷ درصد کاهش دیده می شود، در سایر مناطق کاهش مشهود نبود.

۳- بررسی وضعیت پوشش واکسیناسیون فلچ اطفال: ۹۹/۷ درصد نمونه ها قطره نوبت صفر و نوبت یک خود را دریافت کرده بودند.

قطره نوبت دوم نیز به ۹۹/۱ درصد و نوبت سوم به ۹۶/۹ درصد و چهارم به ۸۳/۶ درصد موارد بررسی خورانده شده بود.

پائین ترین پوشش مربوط به نوبت چهارم (۵/۸۰ درصد و بعد نوبت سوم ۶/۹۶ درصد است).

میزان افت پوشش ایمن سازی فلچ اطفال از نوبت صفر تا ۳/۲ درصد بوده است.

موارد مذکور در دو جنس تفاوتی نداشته است. تفاوتها بیایی در زمان خوراندن قطره نوبت صفر و یک دیده

جهت رسیدگی سریع به امر وضعیت ایمن‌سازی کودکان و بهبود ارائه خدمات ایمن‌سازی در این منطقه ایجاب می‌نماید.

- میزان درصد دریافت هر یک از واکسنها در حدی قابل پیش‌بینی می‌باشد اما با حذف موارد ایمن‌سازی زودتر از ۱۵ روز از موعد مقرر میزان پوشش ایمن‌سازی مختصری کاهش می‌یابد گرچه موارد ایمن‌سازی دیرتر از موعد مقرر در این تحقیق جزء پوشش محسوب می‌گردد اما در ارزشیابی ارائه خدمات ایمن‌سازی اهمیت ویژه دارد چراکه سعی و تلاش کارکنان بهداشتی ارائه خدمات ایمن‌سازی با تأکید بر بموقع بودن آن باید صورت پذیرد.

بطور کلی انجام یک تحقیق سریع *Rapid Survey* در مقاطع مختلف زمانی (در هر یک از مناطق) علاوه بر مشخص نمودن وضعیت ارائه خدمات ایمن‌سازی، مناطق در معرض خطر را مشخص نموده و برنامه‌ریزی دقیق‌تری را با توجه به موانع و مشکلات موجود ایجاب می‌نماید.

- ترتیب‌دادن برنامه‌های بازآموزی جهت کارکنان بهداشتی خصوصاً کارکنان سطوح محیطی ارائه خدمات ایمن‌سازی در امر ارائه هرچه بهتر این خدمات بر اساس رعایت دقیق زمان مقرر و تأکید بر پی‌گیری‌ها و همچنین تقویت مهارت‌های فنی - ادراکی و انسانی گامی مؤثر در بهبود وضعیت موجود بشمار می‌رود.

امید آن می‌رود که این تحقیق مقطعی به عنوان یک ملاک پایه در ارزشیابی ارائه خدمات ایمن‌سازی جاری مفید بوده و با روشن نمودن نکات قابل تعمق در برترانه ریزی‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲/۱ درصد موارد زود دریافت نموده بودند.  
به‌حال، پوشش واکسیناسیون نوبت اول و دوم در رباط کریم و کرج به ترتیب پائین‌ترین سطح را داشته است.

۵- بررسی پوشش واکسیناسیون سرخک:  
به ترتیب ۷/۹۶ و ۵/۸۳ درصد موارد واکسن سرخک نوبت اول و دوم خود را دریافت کرده بودند که به ترتیب پوشش برای نوبت یک ۴/۹۵ درصد و برای نوبت دو ۴/۸۱ درصد بوده است. (موارد *Early* از پوشش حذف گردیده است).  
میزان افت پوشش نیز ۳/۱۴ درصد بود که از لحاظ این افت در دو جنس تفاوت بارزی دیده می‌شد و بچه‌های پسر با ۸/۱۹ درصد افت نسبت به دختران با ۶/۹ درصد پیشی داشته است.

از نظر بررسی میزان واکسیناسیون سرخک در مناطق مختلف رباط کریم ۶/۲۸ درصد موارد عدم واکسیناسیون را دارا بوده است.

از نظر زمان تلقيق آن نیز کرج با ۱/۳ درصد موارد پیش از موعد با سایرین تفاوت داشته است. ۵۶ درصد واکسیناسیون نوبت اول منطقه رباط کریم با تأخیر صورت گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبه دقیق میزانهای پوشش ایمن‌سازی دو مسئله مهم قابل بحث و تعمق می‌باشد:

۱- تعداد نمونه‌های مورد بررسی در این طرح پژوهشی ۴۷ خوشه هفت‌تایی و مجموعاً ۳۲۹ نمونه بوده است. گرچه این تعداد نمونه برای قضاوت نمودن در مورد میزان پوشش هر یک از مناطق پنجمگانه کافی می‌باشد اما وجود اختلافات معنی دار آماری در منطقه رباط کریم لزوم انجام یک بررسی مقطعی را

## References

## منابع

- ۱- دکتر آسائی. محمد، جمشید بیگی. عصمت، احمدیه. محمدحسین، مقدمه‌ای بر اپیدمیولوژی و روش تحقیق، چاپ خ، اردیبهشت ۱۳۷۳، ۱، ۷۲(ص)
- 2) Bhandare. B & mandoware. S.L & Gupta. G.K.; Evaluation of vaccination coverage; Indian pediatr, 57, 1990: 191-201
- 3) Cutts. F.T & et al; Determinants of vaccination in

*an urban population in Conakry Guinea; International Journal of Epidemiology* 20(4) 1991, 1099

- 4) Nirupam. S, chandra, R, Srivastava, VK; Sex bias in immunization coverage in an urban area; *Indian pediatr*, 27 (4) 1990: 338-41
- 5) Unicef; progress of Nations, ISBN: 92-806-3170-5, Sales No; E.95.X.X.UKD.1, 1996

---

## EVALUATION OF VACCINATION COVERAGE OF 12 TO 24 MONTH OLD CHILDREN IN IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES REGION (1997, MAY & JUNE)

M.M Gooya, M.D; M.P.H\*

F.Emami, M.D;M.P.H\*\*

M. Nasehi, M.D \*\*\*

### ABSTRACT

Today, the lives of more than 3000000 children are protected by immunization services in the form of EPI (expanded program of immunization).

This program helps ideal growth and development for millions of children, but inspite of current EPI, preventable diseases are still able to take the lives innocent children.

Cause specific mortality rates of children, due to preventable diseases, show that immunization services alone are not the end of problem, because the important factors, such as giving priority to EPI, regular monitoring of immunization programs, doing practicable studies in this connection and cross sectional evaluations for recognition of strength and weak points of the program, have an important role in continuation of immunization program and keeping the immunization coverage at a favorable level.

With due attention to EPI goals of year of 2000 (such as increasing of vaccine coverage throughout world, neonatal tetanus elimination and polio eradication) and also health policy makers universal efforts in this connection, we decided to review the situation of immunization coverage of 12 to 24 month old children who are resident in Iran University of Medical Sciences (IUMS) region.

There are 5 districts in IUMS region (west of Tehran, Karadj, Shahriar, Savojbolagh & Robatkarim).

In this study we calculated the number of clusters of each district on the basis of its population and finally 47 clusters (each cluster includes 7 cases) were studied. 53.8% of cases were female and 46.2% were male.

Age distribution of this group of children was normal (normal distribution; mean age= 17.7, mode=17).

Following results were obtained in this study:

BCG vaccination coverage rate = 99.4%

DPT.1 vaccination coverage rate = 97.6%

DPT.2 vaccination coverage rate = 98.2%

DPT.3 vaccination coverage rate = 98.6%

DPT.4 vaccination coverage rate = 80.5%

Drop out of DPT.1 to DPT.3 vaccination coverage = 1%

Polio.0 vaccination coverage rate = 99.7%

The rest of polio Vaccination coverage rates were similar to DPT.

Hepatitis 0 vac coverage rate = 99.1%

Hepatitis.1 vac coverage rate = 97%

Hepatitis.2 vac coverage rate = 92%

Drop out of H.O to H.2 vaccination coverage = 7.1%

Measles.2 Vac. Coverage rate = 81.4%

Drop out of measles vaccination coverage = 14.3% (male: 19.8%, Female 9.6%)

If we compare vaccination coverage rates of those 5 districts with each other, we find that Robatkarim is the weakest point in IUMS region & therefore it needs more attention and a punctual planning for improvement of EPI and surveillance system.

We hope that this study will be a basis for following evaluations of immunization services in this region.

**Key Words:** 1) Immunization      2) Vaccination Coverage  
3) Expanded Program of Immunization (EPI)

\* Iran University of Medical Sciences and Health Services Health Vice - Chancellor

\*\* Social Medicine Specialist

\*\*\* Physician