

سنجه سطح ادراری اینترلوکین ۸ به عنوان یک روش غیر تهاجمی جهت غربالگری ریفلaks و زیکویورترال در بیماران بعد از بهبود پیلونفریت حاد

دکتر سعیده پرورش: استادیار و متخصص گروه کودکان، بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. sparvaresh@yahoo.com

دکتر محمد آهنگردآوی: دستیار بیماری های کودکان، بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. mohamaddavudi@yahoo.com

دکتر شهریار دبیری: استاد و متخصص بخش پاتولوژی، بیمارستان افضلی پور، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

اعظم دهقانی: کارشناسی ارشد آمار زیستی، پایگاه تحقیقات بالینی، بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

تاریخ پذیرش: ۹۲/۶/۴

تاریخ دریافت: ۹۲/۲/۴

چکیده

زمینه و هدف: برگشت ادرار از مثانه به حالب (VUR) از یافته های شایع در کودکان مبتلا به پیلونفریت است که می تواند باعث آسیب کلیوی شود. تشخیص ریفلaks نیازمند تصویربرداری به روشن تهاجمی می باشد. استفاده از روش های غیر تهاجمی برای تشخیص VUR مانند سنجه سطح اینترلوکین ۸ ادراری می تواند روش جایگزین مناسبی باشد.

روش کار: در این مطالعه مقلعی، ۸۰ کودک با سابقه هی پیلونفریت که حداقل ۱ ماه از درمان آن ها گذشته بود، مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس (VCUG) Voiding Cystourethrogram (به دو گروه الف) ۴۰ بیمار مبتلا به ریفلaks ادراری به عنوان مورد و گروه (ب) ۴۰ کودک بدون ریفلaks ادراری با کشت ادراری منفی به عنوان گروه کنترل تقسیم شدند. سطح ادراری IL8 و کراتینین در این دو گروه سنجیده و از آزمون T و نرم افزار spss جهت تحلیل آماری استفاده شد.

یافته ها: از ۸۰ کودک مورد مطالعه ۱۲ نفر پسر (۱۵٪) و ۶۸ نفر دختر (۸۵٪) بودند. میانگین سنی کل بیماران ۳۲/۵ ماه بود. از ۴۰ بیمار مبتلا به VUR ۲۲ نفر (۵۵٪) ریفلaks یک طرفه داشتند. نسبت IL8 به کراتینین ادراری در گروه مبتلا به ریفلaks ۴/۹ \pm ۷/۶۰ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و در گروه غیر مبتلا به ریفلaks ۵/۲ \pm ۹/۴۶ پیکوگرم به ازای هر میکرومول با ($p=0.094$) گزارش شد که نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین دو گروه بود. تفاوتی در سطح ادراری اینترلوکین ۸ در درجات مختلف ریفلaks و موارد یکطرفه با دو طرفه VUR مشاهده نشد.

نتیجه گیری: اینترلوکین ۸ ادراری ساختن مناسبی جهت غربالگری و تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به ریفلaks ادراری نیست. همچنین در تعیین شدت VUR نیز کمک کننده نیست.

کلیدواژه ها: ریفلaks ادراری، سیستویورتروگرام حین ادرار، اینترلوکین ۸ ادرار، پیلونفریت

مقدمه

عفونت دستگاه ادراری در ۱-۳٪ دختران و ۰.۱٪ پسران رخ می دهد (۱). ریفلaks معمولاً مادرزادی بوده و به صورت فامیلی رخ می دهد و حدود ۰.۱٪ از کودکان را درگیر می کند (۱). در مواردی که عفونت مجاری ادراری تب دار وجود دارد خطر VUR افزایش می یابد و شیوع آن به ۴۵-۳۰٪ درصد می رسد (۲ و ۳). ریفلaks ادراری کلیه را به عفونت (پیلونفریت) از طریق تسهیل عبور باکتری از مثانه به مجاری ادراری فوکانی مستعد می کند. واکنش التهابی ایجاد شده از طریق عفونت کلیوی

می تواند منجر به ریفلaks نفوropاتی شود (۱).

در بررسی ژنتیک مولکولی جهش ژن Agtr2 در موش ها می تواند باعث VUR در پسران با نفوذ پایین شود. جهش ژن Uroplakin3 انسانی همراهی ضعیفی با VUR داشته و بدون سایر آنومالی های اولیه می باشد (۴). جهت تشخیص از (Voiding Cystourethrogram- VCUG) و (Radionuclide cystogram RNC) استفاده می شود. VCUG اطلاعات آناتومیک دقیق به خصوص در پسران ارائه می دهد و به عنوان روش ارجح است اما میزان رادیاسیون بالا است (۱).

و (IBD) (Inflammatory bowel disease) عفونت‌های بیمارستانی ارزشمند است. همچنین در پزشکی هسته‌ای Tc^{99m} -labeled IL8 سینتوگرافی برای اقدامات تشخیصی کاربرد دارد (۹).

به علت این‌که IL8 ادراری در موارد التهاب حاد اپی‌تیالیا مجاری ادراری افزایش می‌یابد و طبق بررسی‌های به عمل آمده طی ۳-۴ هفته بعد از برطرف شدن التهاب به سطح طبیعی بر می‌گردد، بالا ماندن سطح IL8 ادراری پس از ۱ ماه می‌تواند بیانگر پروسه‌ی التهابی مزمن مثل VUR در سیستم ادراری می‌باشد. در نتیجه سنجش این مارکر التهابی به عنوان یک روش غیر تهاجمی می‌تواند جایگزین مناسبی برای غربالگری و پیگیری بیماران مبتلا به VUR در مقایسه با VCUG باشد.

روش کار

در این بررسی ۸۰ کودک مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان و کلینیک فوق تخصصی بعثت (درمانگاه نفرولوژی کودکان) با سابقه‌ی پیلونفریت که حداقل ۱ ماه از دوره‌ی عفونت ادراری -UTI (Urinary Tract Infection) - تبدیل آن‌ها گذشته و درمان شده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. البته کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن دیگر نظیر اسیدوز توبولار کلیوی (Renal Tubular Acidosis-RTA)، نفرولیتازیس، سابقه‌ی جراحی اوروزنیتال، مalfورماسیون‌های ادراری و تناسلی، سندروم‌های نفروتیک و نفریتیک، بیماری‌های کلژن واکسکولر و Systemic Lupus Erythematosus بافت همبند (SLE) از مطالعه حذف شدند.

تمام بیماران تحت VCUG قرار گرفتند که شامل بیماران مبتلا به اولین پیلونفریت حاد که در سونوگرافی شواهد هیدرونفروز، اسکار یا سایر یافته‌های مؤید ریفلaks درجه‌ی بالا یا اوروپاتی‌های انسدادی و یا DMSA مثبت داشتند و بیماران مبتلا به پیلونفریت راجعه بودند. بعد از کاتترگذاری مثانه و وارد کردن ماده حاجب یددار، تصویربرداری رادیولوژیک مجاری ادراری فوکانی و

RNC است و در ارزیابی‌های بعدی روش ارجح محسوب می‌شود (۱).

طبق دستورالعمل جدید (سال ۲۰۱۱) آکادمی کودکان آمریکا در خصوص شیرخواران مبتلا به پیلونفریت بدون ریفلaks با درجه ۱ تا ۴ بی نیاز از پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی هستند. انجام VCUG نیز محدود به یافته‌های غیر طبیعی در سونوگرافی شامل هیدرونفروز، اسکار، سایر یافته‌های مؤید ریفلaks درجه بالا، اوروپاتی انسدادی، علائم غیر معمول و پیچیده در شرایط بالینی و یا پیلونفریت راجعه شده است (۵). سیستوگرافی غیرمستقیم برخلاف دو روش فوق نیاز به کاتترگذاری ندارد ولی حساسیت پایین‌تری (۷۵٪) دارد. در نمای سیستوسکوپی سوراخ حالب بررسی می‌شود که در حالت نرمال به شکل VUR نمای استادیوم و در مرحله‌ی یک آسیب volconiccone در مرحله‌ی یک آسیب VUR نمای نعل اسبی و در مرحله‌ی سه نمایی به شکل گلف دیده می‌شود (۶). در کودکان VUR اگر در سونوگرافی اتساع مجرای فوکانی کلیه (حالب و پیلوکالیس) گزارش شود نیازمند بررسی اورودینامیک است (۷). در VUR طح میکروپروتئینوری، پروستاگلندین E2 ادراری، بتامیکروگلوبینوری، Retinol Tom-Horsfall N-acetyl-D-blinding protein ادراری، اینترلوكین ۶ و ۸ ادراری، glucosaminidase ادراری، اینترلوكین ۸ ادراری، اینترلوكین ۴۴ سنجش پروکلسی‌تونین سرم نیز ۸۰٪ حساسیت و ۴۴٪ اختصاصی برای تشخیص VUR بوده است (۸).

اینترلوكین ۸ به عنوان یک بیومارکر مهم جهانی در شناخت بسیاری از بیماری‌ها ارزشمند است. به عنوان مثال اینترلوكین ۸ ادراری در شناخت سرطان مهاجم مثانه ۷۱٪ اختصاصی است. همچنین اینترلوكین ۸ ادراری شاخصی افزایش یافته‌ه در پروستاتیت، پیلونفریت حاد و VUR می‌باشد. اینترلوكین ۸ سرم جهت بررسی لغفوم غیره‌چکین، استئومیلیت، پنومونی، کوریوآمنیونیت، بیماری التهابی روده

تمام بیماران به صورت نمونه وسط ادرار (Mid Stream) یا با کیسه‌ی ادراری گرفته شد و مواردی که کشت ادراری منفی داشتند وارد مطالعه شدند و آن‌هایی که کشت ادراری مثبت داشتند نمونه‌ی ادراری مجدد به صورت سوپرآپوبیک یا کاتتر ادراری ارسال شد و موارد با UC منفی جهت سنجهش سطح IL8 ادراری انتخاب شدند و بیماران با کشت مثبت تحت درمان UTI قرار گرفتند و از مطالعه حذف شدند. نمونه‌های ادراری در دمای ۷۰- درجه‌ی سانتی گراد در آزمایشگاه جمع‌آوری و فریز شدند. طی مدت ۸ ماه نمونه‌گیری تکمیل شد و نمونه‌ها با کیت Human CXCL8/IL-8 ساخت USA به روش ELISA مورد سنجهش قرار گرفتند. جهت جلوگیری از اثر ترقیقی و افزایش دقیقت جواب اینترلوکین ۸ ادراری بیماران، کراتینین ادرار نیز سنجهش شد تا از نسبت اینترلوکین ۸ به کراتینین ادرار استفاده شود. همچنین از کیت تشخیص کمی کراتینین شرکت پارس آزمون در آزمایشگاه مرکز طبی کودکان تهران برای استفاده شد.

از فراوانی نسبی، مطلق و شاخص مرکزی mean \pm SD برای ارائه نتایج توصیفی استفاده شده است.

یافته‌ها

در این بررسی از ۸۰ کودک مورد مطالعه ۱۲ نفر پسر (۱۵٪) و ۶۸ نفر دختر (۸۵٪) بودند. در بیماران VUR مثبت ۸ پسر (۲۰٪) و ۳۲ دختر (۸۰٪) بودند و در گروه کنترل ۴ نفر پسر (۱۰٪) و ۳۶ نفر دختر (۹۰٪) بودند. میانگین سنی کل بیماران ۳۲/۵ ماه بود که در گروه اول (VUR مثبت) ۳۶ ماه که تفاوت سنی معنی‌داری در دو جنس دیده نشد و در گروه دوم (VUR منفی) ۲۹/۷ ماه بود که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه روئیت شد ($p=0.024$).

سابقه‌ی ریفلaks در خانواده درجه‌ی یک (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) در کل بیماران ۶ نفر بود (۷/۵٪) که همگی متعلق به گروه مبتلا به ریفلaks ادراری بودند. از ۴۰ بیمار مبتلا به ریفلaks ادراری ۲۲ نفر (۵۵٪) ریفلaks یک

تحتانی انجام شد که بنابر شدت ریفلaks بر اساس تقسیم بندی بین المللی مطالعات ریفلaks از درجه ۱ تا ۵ تعریف شدند که شامل درجه‌ی ۱، ریفلaks به داخل حالب که متسع نمی‌باشد؛ درجه ۲، ریفلaks به داخل سیستم جمع‌کننده‌ی فوقانی بدون اتساع؛ درجه ۳، ریفلaks به داخل حالب متسع همراه با صاف شدگی فورنیکس کالیس‌ها؛ درجه ۴، ریفلaks به داخل حالب کاملاً متسع؛ درجه ۵، ریفلaks شدید توام با اتساع شدید و پیچ‌خوردگی حالب و از بین رفتان نمای پاپیلری. بر اساس نتایج VCUG بیماران به ۲ گروه مبتلا به ریفلaks ادراری و غیر مبتلا به ریفلaks ادراری طبقه‌بندی شدند تا نتایج VCUG مقایسه شوند. با توجه به اینکه بالا بودن IL8 ادراری بیماران مبتلا به UTI نسبت به گروه کنترل (کودکان سالم) در سایر مطالعات و کتب مرجع تأیید شده است و محدودیت نمونه‌گذاری در کیت‌ها (۹۰-۸۰ نمونه در هر کیت) از تعریف مجدد گروه سالم به عنوان گروه کنترل صرف نظر شد و عملًا گروه دوم که VUR منفی و کشت ادراری منفی داشتند و درمان موفق UTI شده بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. گروه اول نیز که مبتلا به VUR با تأیید VCUG بودند (پروسه‌ی التهابی مزمن ادراری) به عنوان گروه مورد تعریف شدند. در ضمن همین تقسیم‌بندی باعث شد تا تعداد بیشتری بیمار مبتلا به ریفلaks ادراری در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده تحت پیگیری و سنجهش ادراری IL8 قرار بگیرند تا ارزش مطالعه (در مقایسه با انجام آزمایش تکراری در گروه سالم) بالاتر رود.

گروه اول بیماران شامل ۴۰ کودک مبتلا به ریفلaks ادراری بودند که طی ۲ سال اخیر متعاقب پیلونفریت حاد یا راجعه با VCUG شناسایی و تحت درمان با آنتی‌بیوتیک پروفیلکتیک قرار گرفته‌اند. گروه دوم شامل ۴۰ کودک با سابقه‌ی پیلونفریت حاد مکرر یا اولیه بودند که بیش از ۱ ماه از درمانشان گذشته و طبق آندیکاسیون‌های ذکر شده VCUG منفی داشتند و اکنون کشت ادراری منفی دارند. نمونه‌ی ادراری

۵/۰۵ پیکوگرم به ازای هر میکرومول گزارش شد که نشان داد اختلاف سنی در سطح ادراری IL8 بین دو گروه تأثیر گذار نیست ($p=0/64$). همچنین مقایسه نسبت اینترلوکین ۸ به کراتینین ادرار در کودکان زیر دو سال بر حسب نتایج VCUG (متلا ب ریفلاکس و غیر مبتلا به ریفلاکس) اختلاف معنی داری را نشان نداد ($p=0/308$).


نسبت IL8 به کراتینین ادراری در گروه اول VUR (ثبت) $4/9 \pm 7/6$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و در گروه دوم $5/2 \pm 9/5$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول با گزارش شد که نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین دو گروه بود ($p=0/894$) (نمودار ۲).

نسبت اینترلوکین ۸ ادراری به کراتینین ادرار بر اساس یک طرفه و دوطرفه بودن VUR در ۴۰ بیمار مورد بررسی نشان داد که در موارد یک طرفه $4/33 \pm 1/24$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و در بیماران مبتلا به VUR دو طرفه $5/63 \pm 2/23$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول می باشد که اختلاف معنی دار نبود ($p=0/598$). (P).


سطح IL8 ادراری در درجات مختلف VUR به ترتیب درجه یک $2/74 \pm 0/9$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول، درجه دو $6/76 \pm 2/73$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول، درجه سه $4/18 \pm 1/55$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و درجه پنجم $3/20 \pm 0/95$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و درجه پنجم $5/50 \pm 0/00$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول گزارش شد که نشان داد در درجات بالاتر ریفلاکس، سطح IL8 ادراری بالاتر نبود (نمودار ۲) طبق VCUG می باشد ($p=0/796$).

بحث و نتیجه گیری

بین دو گروه مبتلا به VUR و غیر مبتلا به VUR تفاوت معنی داری در دفع ادراری اینترلوکین ۸ دیده نشد که مشابه مطالعه بادلی (۱۰)، شو (۱۱) و جاتلی (۱۲) بود و برخلاف یافته های گلنکیس (۱۳)، گکس (۱۴)، کورادا (۱۵)، فرناندز (۱۶)، هاراوکا (۱۷)، شنوفی (۱۸) و مریخی (۱۹) بود که احتمال دارد به علت تفاوت



نمودار ۱- مقایسه نسبت اینترلوکین ۸ ادراری به کراتینین ادرار بر اساس درجه VUR



نمودار ۲- مقایسه نسبت اینترلوکین ۸ ادراری به کراتینین ادرار در دو گروه مطالعه

طرفه و ۱۸ نفر (۴۵٪) ریفلاکس دو طرفه داشتند. بیشترین درجه ریفلاکس گزارش شده به ترتیب شیوع شامل درجه دو ۱۶ نفر (۴۰٪)، درجه سه ۱۲ نفر (۳۰٪)، درجه چهار ۶ نفر (۱۵٪)، درجه یک ۵ نفر (۱۲/۵٪) و درجه پنجم ۱ نفر (۲/۵٪) بود (نمودار ۱). مقایسه کراتینین ادرار در دو گروه موردن مطالعه VUR مثبت $65/2 \pm 5/23$ میلی گرم بر دسی لیتر و VUR منفی $56/67 \pm 6/07$ میلی گرم بر دسی لیتر بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد ($p=0/293$). همچنین سطح کراتینین ادرار با درجه VUR ارتباطی نداشت ($p=0/848$).

سطح IL8 به کراتینین ادراری در پسران $5/9 \pm 5/49$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و در دختران $4/9 \pm 9/09$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول گزارش شد که ارتباط معنی داری بین جنسیت و سطح IL8 ادراری دیده نشد ($p=0/723$).

سطح IL8 به کراتینین ادراری در شیرخواران زیر ۲ سال $5/1 \pm 6/13$ پیکوگرم به ازای هر میکرومول و کودکان ۲۴ ماهه و بزرگتر $\pm 9/93$

ریفلاکس ادراری نیست. همچنین در تعیین شدت ریفلاکس نیز کمک کننده نیست.

هر چند IL8 به عنوان یک مارکر التهابی در بسیاری از بیماری های عفونی و التهابی حاد افزایش می یابد ولی در مطالعه حاضر دفع ادراری آن در بیماری مزمن VUR سطح افزایش یافته ای در مقایسه با گروه کنترل نداشت و جهت غربالگری بیماران مبتلا به پیلونفریت درمان شده توصیه نمی شود. به نظر می رسد VCUG طبق اندیکاسیون های ذکر شده (۵) همچنان به عنوان روش ارجح جهت ارزیابی آناتومی و تشخیص و پیگیری VUR و برنامه ریزی درمانی آن می باشد.

منابع

1. Kleigman R, Santon B, Geme J, Schor N, Behrman R. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. USA: Elsevier Saunders; 2011. 1829-1838.
2. Ransley PG. Vesicoureteric reflux: continuing surgical dilemma, Urology. 1978;12:546.
3. Hoberman A, Chrron M, Hickey RW, Baskin M, Kearney DH, Wald ER. Imaging studies after a first febrile urinary tract infection in young children. N Engl J Med; 2003. 348: 195-202.
4. Gearhat J, Rink R, Pierree D. Pediatric urology. 2nd ed. USA: Saunders Elsevier; 2010. p. 209 and 304.
5. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. American Academy of pediatrics; 2011. 128 (3): 595-607.
6. Tanagho EA, McAnish JW. Smith's General Urology. 17th ed. USA: Mc Graw Hill Medical; 2008. p. 189.
7. Abrams P. Urodynamics. 3rd ed. London: Springer; 2006. p. 151.
8. Gearhat J, Rink R, Pierree D. Pediatric urology. 2nd ed. USA: Saunders Elsevier; 2010.p. 209, 304.
9. Shahzad A, Knapp M, Lang I, Kohler G. Interlukin 8 a universal biomarker. Int Archive Med; 2010. 3:11.
10. Badeli H, Khoshnevis T, Hassanzadeh Rad A, Sadeghi M. Urinary albumin and interleukin-8 levels are not good indicators of ongoing vesicoureteral reflux in children who have no active urinary tract infection. AJNT; 2013. 6: 27-30.
11. Sheu JN, Chen MC, Lue KH, Cheng SL, Lee IC, Chen SM, Tsay GJ. Serum and urine levels of interleukin-6 and interleukin-8 in children with acute pyelonephritis. Cytokine; 2006. 36: 276-82.
12. Jutely RS, Youngson GG, Eremin O, Ninan

در تعداد نمونه های مورد مطالعه به خصوص تعداد بیشتر مبتلایان به VUR در این بررسی باشد. همچنین تفاوت کیت اینترلوکین ۸ شرکت های مختلف در مطالعات می تواند در نتایج تاثیر گذار بوده باشد. مقایسه نسبت اینترلوکین ۸ ادراری به کراتینین ادرار بر اساس یک طرفه و دوطرفه بودن VUR در ۴۰ بیمار مورد بررسی (P = ۰/۵۹۸) نیز معنی دار نبود. همچنین در شدت های مختلف ریفلاکس اختلاف معنی داری در دفع ادراری اینترلوکین ۸ مشاهده نشد که همانند نتایج مطالعات گلنکیس (۱۳) و گکس (۱۴) و مغایر با یافته های هاراوکا (۱۷)، فرناندز (۱۶) و کورادا (۱۵) می باشد.

میانگین سنی بیماران مبتلا به ۳۶ VUR که تقریباً مشابه مطالعه شنوفی در مصر (۱۸) بود و لی در مطالعه مریخی در اصفهان میانگین سنی ۴ سال گزارش شده است (۱۹).

البته میانگین سطح IL8 به کراتینین ادراری در شیرخواران زیر ۲ سال و کودکان ۲۴ ماهه و بزرگ تر نشان داد که اختلاف سنتی در سطح ادراری IL8 بین دو گروه تأثیر گذار نبوده است (P = ۰/۶۴). همچنین مقایسه نسبت اینترلوکین ۸ به کراتینین ادرار در کودکان زیر دو سال بر حسب نتایج VCUG اختلاف معنی داری (P = ۰/۳۰۸) را نشان نداد که بر خلاف مطالعه گلنکیس (۱۳) می باشد. بیشترین گزارش VCUG در بیماران مورد بررسی درجه دو ریفلاکس بود. تفاوتی در دفع کراتینین ادراری مشابه بررسی گلنکیس (۱۳)، بین دو گروه مورد مطالعه دیده نشد. در ضمن، اختلاف معنی داری در سطح اینترلوکین ۸ به کراتینین ادرار بین پسران و دختران روئیت نشد که نتایج مانند مطالعه هاراوکا (۱۷) است.

در مجموع بر خلاف برخی مطالعات (۱۳) که IL8 ادراری به عنوان جایگزین VCUG جهت غربالگری VUR اشاره شده و در بعضی از مطالعات دیگر (۱۰ و ۱۹)، IL8 ادراری به عنوان شاخص مناسب اولیه ای جهت تشخیص و نفوپاتی ریفلاکس مطرح نشده است. در این مطالعه نیز IL8 ادراری شاخص مناسبی جهت غربالگری و تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به

GK. Serum cytokine profile in reflux nephropathy. *Pediatr Surg Int*; 2000. 16: 64-8.

13. Galanakis E, Bitsori M, Dimitriou H, Giannakopoulou C, Karkavitsas NS, Kalmanti M. Urine Interleukin-8 as a marker of vesicoureteral reflux in infants. *Pediatrics*; 2006. 117: e863- e867.

14. Gokce I, Alpay H, Biyikli N, Unluguzel G, Dede F, Topuzoglu A. Urinary levels of interleukin-6 and interleukin-8 in patients with vesicoureteral reflux and renal parenchymal scar. *Pediatr Nephrol*; 2010. 25: 905-12.

15. Kuroda S, Puri P. Lack of association of IL8 gene polymorphisms with familial vesico-ureteral reflux. *Pediatr Surg Int*; 2007. 23: 441-5.

16. Fernandez MS, Gonzalvez J, Juncos MA, Vidal A, Hernandez E, Sotoca J, et al. Usefulness of the urinary levels of interleukin1 beta, interleukin6 and interleukin8 in the diagnosis of vesicoureteral reflux in children. Proceeding of 1st World Congress of Pediatric Urology; 2010 May 27-31; California, USA.

17. Haraoka M, Senoh K, Ogata N, Furukawa M, Matsumoto T, Kumazawa J. Elevated interleukin-8 levels in the urine of children with renal scarring and/or vesicoureteral reflux. *J Urology*; 1996. 155: 678-80.

18. Shenoufy AE, Issa M, Abd Elfatah M, Elabd N. Urine level of interleukin-8 as a non-invasive marker for diagnosis of vesicoureteral reflux in children. *J Med Sci*; 2009. 9: 133-9.

19. Merikhi AR, Keivanfar M, Gheissari A, Mousavinasab F. Urine interleukin 8 as a diagnostic test for VUR in children. *J Pak Med Assoc*; 2012. 62: S52-4.

Detection of urine interleukin-8 levels as a noninvasive method for diagnosis of vesicoureteral reflux in children after resolvent urinary tract infection

Saeideh Parvaresh, MD, Assistant Professor of Pediatric, Department of Pediatrics, Afzalipur Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. sparvaresh@yahoo.com

Mohammad Ahangar Davudi, MD, Resident of Pediatrics, Department of Pediatrics, Afzalipur Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. mohamaddavudi@yahoo.com

Shahriar Dabiri, Professor of Pathology, Department of Pathology, Afzalipur Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Azam Dehghan, MSc, Clinical Research Unit, Afzalipoor Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Abstract

Background: The retrograde flow of urine from the bladder to the ureter (Vesicoureteral Reflux-VUR) is a common finding in children with Urinary Tract Infection (UTI) that can result in renal injury. Diagnosis of reflux requires interventional invasive imaging (Voiding Cystourethrogram -VCUG). Detection of urine Interleukin-8 (IL8) levels as a noninvasive method can be usefull method for diagnosis of VUR in children after resolvent UTI.

Methods: In this cross sectional study, 80 children in whom at least one month had passed from their UTI treatment, were assessed. According to VCUG, the children were divided in to two groups; “case group” consisted of 40 patients with VUR and “control group” consisted of 40 patients without VUR. Then urinary levels of IL8 and creatinin were assessed. T_study and chi square were used for analytical conclusions in SPSS software.

Results: From 80 children, 12 were males and 68 were females. Overall mean age was 32-48 months. From 40 VUR patients, 22 had unilateral reflux. Relation of IL8 to Ucr in the first group (VUR positive) was 4.9 ± 7.60 pg/ μ mol and in the second group was 5.2 ± 9.46 pg/ μ mol revealing no significant relationship between the two groups. Also there was no relationship between IL8/Ucr in different grades of reflux, uni/ bilateral cases and infant age with older.

Conclusion: Urinary IL8 is not a benefit marker for screening, diagnosis and follow up of patients with VUR.

Keywords: Vesicoureteral Reflux (VUR), UTI, IL8/Ucr, Voiding Cystourethrogram (VCUG)