

بررسی رابطه افزایش نسبت ضخامت به پهناى مچ دست با ابتلا به سندروم تونل کارپ

چکیده

*دکتر مهدی مقدسی I

دکتر ناهید کیانمهر II

دکتر فروغ نجات III

سندروم تونل کارپ(CTS) نوروپاتی ناشی از اینtrapment عصب مدیان در مچ دست است و به عنوان شایعترین بیماری شغلی مطرح میباشد که با روشهای الکترودیاگنوستیک تشخیص داده میشود اما آزمون خاصی برای بیماریابی وجود ندارد. در این مطالعه در ۵۵ بیمار که با آزمونهای الکترودیاگنوستیک بیماری آنها تأیید شده بود نسبت ضخامت به پهناى مچ دست یا T/WThickness width ratio محاسبه و با هدایت تأخیری یا DL(Distal latency) عصب مدیان مقایسه شد، تا معلوم شود بین $\frac{7}{2} \geq \frac{T/W}{DL} \geq \frac{4}{2}$ میلی ثانیه وجود دارد، تا بتوان از محاسبه T/W در افراد در معرض خطر به عنوان آزمون بیماریابی بهره جست. نظر به اینکه ۸۳/۶٪ بیماران درگیری دو طرفه دستها را داشتند، بجای ۵۵ نفر، $T/W \geq 1.01$ دست گرفتار محاسبه شد. حساسیت آزمون ۵۹/۸٪ و با تعمیم به جمعیت عمومی در ۹۵٪ افراد بین ۷۰-۴۸٪ به دست آمد($P < 0.001$). در نهایت مشاهده گردید بین T/W و DL ارتباط مثبتی وجود دارد(ضریب ۰/۶).

کلیدواژه‌ها: ۱- سندروم تونل کارپ ۲- نسبت ضخامت به پهناى مچ دست
۳- هدایت تاخیری انتهایی

مقدمه

از جمله بیماریهای زمینه‌ای نقرس، مولتیپل میلوما، غفوت استخوانهای مچ دست یا تاندونهای فلکسور مچ، حاملگی، اورمی، دیابت، آمیلوئیدوز، ترومما و آکرومگالی هستند. در صورتی که بیماری زمینه‌ای خاصی وجود نداشته باشد، واژه CTS ایدیوپاتیک به کار می‌رود و در افرادی که حرکات مکرر دست دارند مثلاً نوازندهای که ساعتها مچ دستشان در وضع flexion باقی

CTS اولین بار در سال ۱۹۸۳ توسط Marie&Foaix تعریف شد(۱).

این بیماری شایعترین entrapment عصب محیطی و شایعترین اختلال درگیر کننده عصب مدیان است همچنین یکی از شایعترین شکایتها مراجعه کنندگان به درمانگاه و مطبهای اعصاب بوده و به عبارت دیگر ناتوان کننده‌ترین مشکلات فعالیتها صنعتی می‌باشد(۲).

این مقاله خلاصه‌ای است از پایان نامه خانم دکتر ناهید کیانمهر و دکتر فروغ نجات جهت دریافت مدرک دکترای تخصصی بیماریهای داخلی، استاد مشاور دکتر مهدی مقدسی، سال ۱۳۷۹.

(I) استادیار گروه داخلی اعصاب، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران(*مولف مسئول).

(II) متخصص داخلی، طب اورژانس، استادیار گروه طب اورژانس، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

(III) متخصص داخلی.

مطالعه $\geq 4/2$ DL به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شد.

DL عصب مدیان از راه تحریک عضله دور کننده کوتاه شست در فاصله ۸ سانتیمتری از الکترود فعل ثبت می شد.

بطور کلی در ۵۵ بیمار متغیرهای سن، جنس، شغل، مدت اشتغال، علائم و نشانه ها، دست غالب از نظر راست دست یا چپ دست بودن و دست گرفتار بررسی می شدند.

به علت خانه دار بودن اغلب بیماران، مدت اشتغال از مطالعه حذف شد.

با توجه به درگیری دو طرفه دسته ادار اغلب موارد، هر دست گرفتار به عنوان یک دست بیمار تلقی شده، بنابراین متغیرهای T/W و DL در ۱۰۱ دست گرفتار مورد بررسی قرار گرفت.

برای اندازه گیری ابعاد مج از وسیله کولیس استفاده شد برای جلوگیری از تورش اندازه گیری تو سطح یک فرد صورت گرفت.

ضخامت مج از فاصله عمودی بین سطح پشتی - شکمی مج و پهنهای مج به صورت فاصله اپیکوندیل رادیال و اولنار در ناحیه چین تحتانی مج اندازه گیری شد.

به دلیل تفاوت ابعاد مج دست بر حسب جثه افراد برای استاندارد نمودن اعداد جهت مقایسه، نسبت ضخامت به پهنهای مج محاسبه گردید.

براساس مطالعات قبلی، معیار بیماریابی $T/W \geq 0/7$ در نظر گرفته شد، اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

می ماند و در خیاطها و رانندگان به فراوانی دیده می شود^(۲).

تشخیص قطعی بیماری توسط مطالعه هدایت عصبی صورت می گیرد^(۳) که نیاز به صرف هزینه و وقت دارد. بنابراین اگر بتوان آزمونی در جهت غربالگری بیماران پیدا کرد و بیماران با نتایج مثبت را با مطالعه الکترودیاگنوستیک تأیید نمود، از نظر هزینه و وقت مقرن به صرفه بوده، امکان بیماریابی را سریعتر می سازد تا بدین ترتیب از عوارض بیماری پیشگیری گردد.

در این تحقیق سعی شد که ارتباط بین نسبت ضخامت به پهنهای مج دست با این بیماری شناخته شود تا در صورت امکان بتوان از آن به عنوان آزمون بیماریابی استفاده نمود.

در یک مطالعه گذشته نگر توسط Johnson در کارخانه اتمیلیسازی ۱۰۰ کارگر با $0/7 \leq T/W \leq 1/0$ (مربعی بودن مج) تحت بررسی الکترودیاگنوستیک قرار گرفتند که ۹۹٪ آنها CTS داشتند^(۴).

روش بررسی

این مطالعه به صورت مشاهدهای و آینده نگرانجام شد و بیماران از بین مراجعه کنندگان سرپایی به درمانگاه اعصاب که با علائم و نشانه های CTS بدون هیچ بیماری زمینه ای (سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک) انتخاب شده و با مطالعه الکترودیاگنوستیک تأیید شدند.

تشخیص براساس $\geq 4/2$ DL میلی ثانیه، سرعت هدایت حسی غیر طبیعی در قسمت انگشتان مج دست (finger-wrist) و سرعت هدایت حسی غیر طبیعی در قسمت کف دست به مج (Palm-wrist) استوار بود، اما در بررسی بیماران برای تشخیص بیماری در این

بحث
در مطالعاتی که تا کنون در مورد رابطه $T/W \geq 0.7$ با CTS انجام شده، نظرات گوناگونی ارائه گردیده است.

در یک مطالعه گذشته‌نگر در ۱۰۰ کارگر کارخانه اتومبیل سازی که $T/W \geq 0.7$ (مربعی‌تر بودن شکل مج) داشتند، مطالعه الکترودیاگنوستیک در ۹۹٪ موارد CTS را تأیید کرد.(۲).

در مطالعه دیگر Johnson در ۶۷ مورد که ۲۷ نفر آنها مبتلا به CTS بودند، اندازه‌گیری ابعاد مج دست انجام شد و این نتیجه به دست آمد که افراد با DL طولانی‌تر مچهای مربعی‌تری دارند و نیز در افراد با $T/W \geq 0.7$ شانس بروز CTS بالاتر است.(۵).

در یک بررسی دیگر که توسط Armstrong روی خانمهای خیاط با بیماری یا بدون CTS انجام شد، اختلاف قابل توجهی در ابعاد مج دست یعنی ضخامت و پهنهای مج آنها به دست نیامد.(۶).

Barhart و همکاران با بررسی مشابهی روی ۴۱۷ کارگر راه آهن بیان نمودند که ابعاد مج دست نمی‌توانند معیار خوبی برای پیش‌بینی CTS باشد.(۷).

Bleecker و همکاران با استفاده از توموگرافی کامپیوتربنی مج دست محیط داخلی کانال کارپ را اندازه گرفتند که بیماران با CTS کانال خیالی کوچکی داشتند(۸)، اما در مطالعه‌ای که Bleecker با اندازه‌گیری محیط خارجی مج (دور مج) انجام داد، بیان نمود محیط خارجی مج معیار خوبی جهت تشخیص CTS نمی‌باشد.(۹).

در بررسی ما، بین DL و T/W رابطه مثبتی به دست آمد($P < 0.001$)(نمودار شماره ۱).

نتیجه
میانگین سنی بیماران ۴۴/۸۳±۲/۶ سال بود، ۸۰٪ زن و از نظر اشتغال ۶۲/۶٪ خانه‌دار بودند.

۸۳/۶٪ بیماران درگیری هر دو دست را داشتند. شایعترین علامت، گزگز دست بود که در ۱۰۰٪ بیماران وجود داشت در حالی که بیماری شانه در ۴۵/۵٪ موارد یافت شد.

نشانه Tinel در ۸۳٪ و Phalen در ۴۵٪ بیماران مثبت بود.

میزان Sensitivity و Specificity tinel و phalen میزان Specificity به ترتیب $0.88/5$ ٪ و $0.85/7$ ٪ و میزان Sensitivity به ترتیب $0.57/5$ ٪ و $0.54/7$ ٪ محاسبه شد. در بررسی ۱۰۱ دست مبتلا، ۵۲ مورد مثبت حقیقی ($DL \geq 0.7$)، $T/W \geq 0.7$)، ۹ مورد مثبت کاذب ($DL < 0.7$)، $T/W < 0.7$) ۳۵ مورد منفی کاذب ($DL < 0.7$) و ۵ مورد منفی حقیقی ($DL < 0.7$) بودند(جدول شماره ۱). بر اساس این: $P.P.V.: 0.85/2$ (۷۳/۳-۹۲/۶)، $N.P.V.: 0.12/5$ (۴/۷-۲۷/۶)، $SEN: 0.59/8$ (۴۸/۷-۷۰)، $SPE: 0.35/7$ (۱۴-۶۴/۴) $T/W \geq 0.7$ ، $DL \geq 0.7$ همچنین تگی مثبت وجود داشت($P < 0.001$).

جدول شماره ۱- ارتباط بین DL و نسبت T/W در بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپ

منفی	مثبت	بیمار	سالم
۳۵	۹	۵۲	$DL \geq 0.7$
۵			$T/W \geq 0.7$

بیشتر بودن تعداد افراد خانه‌دار در این مطالعه نسبت داد.

این بیماری را در دست غالب شایعتر می‌داند، در حالی که در این بررسی درگیری دست غالب فقط ۱۲/۷٪ و اغلب بیماران (۸۳/۶٪) درگیری دستها را به صورت دو طرفه داشتند.

منابع

1- Julian Youmans, Neurological surgery, 4th edition, philadelphia, Pensilvania, WB saunders company, 1996, PP(2186-64).

2- Raymond D., Adams principles of neurology, 6th edition, Boston massachusetts, Mac Grawhill, 1997, PP: 1358-9.

3- H. Merritt., Merritt's textbook of neurology, 9th edition, NewYork, Williams, Wilkins, 1995, PP: 664.

4- Jonson EW., Practical electromyography, second edition, columbas, ohio, williams and wilkins, 1989, PP: 199-205.

5- Jonson EW., Gatens T., Paindexter D., Bowers D., Wrist dimension: Correlation with median sensory latencies. Arch phy med rehab, 1983, 64: 556-7.

6- Armstrong TJ., Chaffin DB., Carpal tunnel syndrome and selected personal attributes J., Occup. Med, 1979, 21: 481-6.

7- Barhart, Demers PA., Miller M., Langsteth WT., rosenstock L., Carpal tunnel syndrome among Ski manufacturing wokers, Scand J work environ health, 1991, 17: 46-52.


8- Bleeker ML., Bohlman M., morland R., Tipton A., Carpal tunnel syndrome: Role of carpal tunnel size, Neurology, 1985, Nov, 35: 1599-1604.

9- Bleeker ML., Medical surveillance for carpal tunnel syndrome in workers J, Hand, surg, 1987, 12A(2pt2): 845-8.

10- John H., Klippel, Rheumatology, 2 nd edition, Bethesda USA., Paul dieppe, 1998, PP: 4,16, 5-8, 5.16.6-7.

11- Sposato RC., Riley M., W, Ballard JL., Stentz TL., Glismann CL., Wrist squareness and

سال دهم / شماره ۳۴ / تابستان ۱۳۸۲



نمودار شماره ۱- رابطه بین هدایت تأخیری انتهایی و نسبت ضخامت به پهنهای مج دست

در مورد حساسیت آزمون، مقایسه بین T/W و Phalen و Tinel صورت گرفت که به ترتیب حساسیت ۰/۵۹٪ و ۰/۵۴٪ و ۰/۸۸٪ به دست آمد.

در تأیید یا رد بیماری به ترتیب ارزش Tinel>Phalen>T/W بوده است.

با توجه به یافته‌های فوق به نظر می‌رسد، اگر چه رابطه معنی‌داری بین T/W و DL وجود دارد، اما اینکه آیا بتوان از محاسبه T/W به عنوان آزمون بیماریابی استفاده کرد مطالعات گسترده‌تری در این زمینه بخصوص روی مشاغل خاص صنعتی مورد نیاز است.

در رابطه با متغیرهای دیگر، میانگین سنی در مطالعه Klippel ۲۴ سال (۱۰)، در مطالعه ۳۹/۸ Sposato ۴۹ سال، در بررسی Bleeker ۴۶ سال (۱۱) و در مطالعه ما ۴۴/۶±۲/۸۳ بوده است.

میزان فراوانی زن به مرد در ۲/۵ به ۱ و در مطالعه ما ۴ به ۱ بود که این افزایش را می‌توان به

median nerve impairment, JOEM. 1995 sep, 137:
1122-6.

ASSESSMENT OF ASSOCIATION OF INCREASED THICKNESS WIDTH RATIO WITH CARPAL TUNNEL SYNDROM

I
***M. Moghaddasi, MD N. Kianmehr, MD F. Nejat, MD**
II
III

ABSTRACT

Carpal tunnel syndrome which is median nerve entrapment neuropathy, is the most frequent occupational disease. Diagnosis is mainly made by electrodiagnostic study but there is no specific exam for screening of patients. In study of 101 hands(55 patients) with CTS (confirmed by electrodiagnostic study), wrist-squareness. Ratio(thickness/width=T/W) were measured. Correlation between $T/W \geq 0.7$ & $DL \geq 4.2$ (distal latensy=DL) were assessed In order to find whether or not $T/W \geq 0.7$ would indicate a median nerve sensory latency greater than 4.2ms, as a predictor of CTS. Results of this study indicate that: There is a positive correlation with T/W & DL . The sensitivity of T/W was 59.8%, so this ratio in screening of suspicious patients with CTS has limited value.

Key Words: 1) CTS=Carpal tunnel syndrome 2) T/W=Thickness width ratio 3) DL= Distal latency

This article is the summary of the thesis of specialty in Internal medicine of N.Kianmehr,MD and F.Nejar,MD, Consultation with M.Moghaddasi,MD, 2000.

I) Assistant professor of neurology, Hazrat Rasool Akram Hospital, Niayesh st., Satarkhan Ave, Iran University of Medical Sciences and Health services, Tehran Iran(*Corresponding author).

II) Internist, Assistant professor of urgent medicine, Rasool Akram Hospital, Niayesh st., Satarkhan Ave, Iran University of Medical Sciences and Health services, Tehran Iran.

III) Internist