

اندازه‌گیری شاخصهای طبیعی در سونوگرافی داپلر شریان سلیاک در افراد بالای ۲۰ سال

چکیده

سونوگرافی داپلر یکی از روش‌های غیرتھاجمی برای بررسی جریان خون در عروق مختلف بدن است و تنها سلیاک به عنوان اولین شاخه آئورت شکمی، یکی از شریانهای مهم احشایی محسوب می‌گردد. با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش‌های مربوط به شاخصهای طبیعی شریان سلیاک در سونوگرافی داپلر در بخش‌های مختلف تصویربرداری پژوهشی دنیا وجود دارد، برآن شدیم که این شاخصها را در بخش سونوگرافی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) مورد بررسی قرار دهیم در این مطالعه ۸۴ فرد سالم(۴۲ مرد و ۴۲ زن بالای ۲۰ سال) به روش غیراحتمالی سهیمه‌ای آسان که بدون داشتن مشخصه‌های انحصاری(exclusive criteria) انتخاب شدند و با استفاده از دستگاه سونوگرافی داپلر هیتاچی EU-525 از نظر متغیرهای PSV(حداکثر سرعت جریان خون در ابتدای سیستول قلبی)، EDV(سرعت جریان خون در انتهای دیاستول قلبی)، MV(متوسط سرعت جریان خون)، d(قطر تنۀ شریان)، RI(شاخص مقاومت شریانی)، PI(شاخص ضربان شریانی)، VF(حجم خونی که در دقیقه از سطح مقطع رگ می‌گذرد) و همچنین شکل امواج اسپکتروال داپلر مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی در حالت ناشتا و در وضعیت تاقباز(Supine) صورت گرفت. نتایج کلی به دست آمده از این تحقیق عبارت بودند از: ۱- PSV شریان سلیاک بر حسب سانتیمتر بر ثانیه دارای میانگین ۹۶ و انحراف معیار ۲۵۴ بود. ۲- EDV شریان سلیاک بر حسب سانتیمتر بر ثانیه دارای میانگین ۳۱ و انحراف معیار ۲۰ بود. ۳- MV شریان سلیاک بر حسب سانتیمتر بر ثانیه دارای میانگین ۶۵ و انحراف معیار ۱۱/۵۶ بود. ۴- میانگین قطر شریان سلیاک ۵۴ سانتیمتر و انحراف معیار ۷۶۷/۰ سانتیمتر بود. ۵- میانگین PI و RI شریان سلیاک به ترتیب ۰/۶۶ و ۰/۹۸ و انحراف معیار آنها به ترتیب ۰/۰۵۰۸ و ۰/۱۱۸۹ بود. ۶- VF شریان سلیاک بر حسب میلی‌لیتر در دقیقه دارای میانگین ۸۷۷ و انحراف معیار ۱۴۵/۷۴۵ بود. ۷- شکل امواج اسپکتروال داپلر در تمام افراد به صورت Low pulsatility بود و جریان خون در سرتاسر دیاستول ادامه داشت. ۸- بین گروههای مختلف سنی، اختلاف معنی‌داری در PSV، PI، RI، d، MV، EDV، VF مشاهده شد($P < 0.05$). ۹- تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان در شاخصهای ذکر شده وجود نداشت.

*دکتر داریوش ساعدی I
دکتر عبدالرضا حدادپور II

کلیدواژه‌ها: ۱- سونوگرافی داپلر ۲- شریان ۳- سلیاک ۴- احشایی

مقدمه

سونوگرافی داپلر شریان سلیاک که یکی از ۳ شریان مهم احشایی است^(۱) در مقایسه با روش‌های مانند

این مقاله خلاصه‌ای است از پایان نامه دکتر عبدالرضا حدادپور برای دریافت مدرک دکترا تخصصی رشته رادیولوژی به راهنمایی آقای دکتر داریوش ساعدی، سال ۱۳۸۱-۸۲.

I) استادیار گروه رادیولوژی، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران(* مولف مسئول).

II) دستیار رشته رادیولوژی، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

سال و گروههای سنی مختلف بالای ۲۰ سال با تفکیک گروه جنسی.

-۲- تعیین معنی‌دار بودن یا نبودن اختلاف شاخصهای سونوگرافی داپلر شریان سلیاک در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بالای ۲۰ سال.

شاخصهای سونوگرافی داپلر و سایر متغیرهای مربوط به سونوگرافی شریان سلیاک که در این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از:

PSV -۱ (Peak Systolic Velocity): حداکثر سرعت جریان خون در ابتدای سیستول قلبی بر حسب سانتیمتر بر ثانیه.

EDV -۲ (End Diastolic Velocity): سرعت جریان خون در انتهای دیاستول قلبی بر حسب سانتیمتر بر ثانیه.

MV -۳ (Mean Velocity): متوسط سرعت جریان خون بر حسب سانتیمتر بر ثانیه (با محاسبه مساحت واقع در زیر یک موج اسپکتروال به دست می‌آید).

d -۴ (Caliac trunk diameter): قطر تنہ شریان سلیاک بر حسب سانتیمتر.

RI -۵ (Resistance Index): شاخص مقاومت شریانی که حاصل تفاضل EDV از PSV تقسیم بر PSV است.

PI -۶ (Pulsatility Index): شاخص ضربان شریانی که حاصل تفاضل EDV از PSV تقسیم بر MV است.

VF -۷ (Volume Flow): حاصل ضرب سطح مقطع شریان سلیاک در MV بر حسب میلی لیتر در دقیقه (از فرمول $VF = 15 \times \pi \times d^3 \times MV$ به دست می‌آید).

Wave Forms -۸: شکل امواج اسپکتروال داپلر شریان سلیاک.

به جز متغیر آخر که از نوع کیفی رتبه‌ای می‌باشد، بقیه متغیرها از نوع کمی پیوسته هستند.

(CTA) Computed Tomographic Angiography (MRA) Magnetic Resonance Angiography ساده و ارزانتری بوده و در تشخیص برخی از بیماریهای مهم جراحی (مثل ایسکمی مزمن مزانتریک) مفید و مؤثر می‌باشد. بررسی عروق با روش داپلر (از نظر آناتومی، درگیری دیواره عروق، سرعت جریان خون و نمای جریان خون) در دهه اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده بطوری که نیاز به روش تهاجمی آنتیوگرافی را بشدت کاهش داده است. این روش در بررسی شریان سلیاک، ساده، ارزان و غیرتهاجمی بوده و دسترسی به آن تقریباً آسان است اما در صورتی که به صورت صحیح و توسط پزشک ماهر انجام نشود، نتایج آن قابل اعتماد نبوده و به ناچار باید از روش‌های دیگر برای تشخیص بیماری استفاده نمود(۲).

از سوی دیگر، استفاده از چنین روشی نیازمند اطلاع از محدوده طبیعی شاخصهای مربوطه است که در این رابطه، تحقیقات مختلفی صورت گرفته و هر یک از آنها، مقادیر خاصی را به عنوان محدوده طبیعی در نظر گرفته‌اند. افراد صاحب‌نظر در این زمینه بر این باور هستند که جدولی در مورد مقادیر طبیعی شاخصهای داپلر باید در هر مرکز بطور جداگانه تهیه شود. از آنجاییکه این مهم تا کنون در کشور ما بطور اصولی صورت نگرفته است و با توجه به کاربرد روزافزون سونوگرافی داپلر در تشخیص بیماریهای احتشایی، این مطالعه در بخش سونوگرافی بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران انجام شد.

اهداف این پژوهش عبارت بودند از: الف - هدف کلی که شامل تعیین حدود طبیعی، میانگین و انحراف معیار شاخصهای سونوگرافی داپلر شریان سلیاک و همچنین شکل امواج اسپکتروال داپلر این شریان در افراد بالای ۲۰ سال بود.

ب - اهداف ویژه که شامل ۲ مورد بود: ۱- تعیین حدود طبیعی، میانگین و انحراف معیار شاخصهای سونوگرافی داپلر شریان سلیاک و همچنین شکل امواج اسپکتروال داپلر این شریان در هر یک از گروههای جنسی بالای ۲۰ سال، هر یک از گروههای سنی مختلف بالای ۲۰

فرکانس ۳/۵ و ۷ مگاهرتز می‌باشد(پروباهای ۳/۵ و ۵ مگاهرتز از نوع Convex و پروب ۷/۵ مگاهرتز از نوع Linear بود). برای گردآوری اطلاعات، با افراد بالای ۲۰ سالی که برای سونوگرافی Gray Scale از نواحی مختلف بدن مراجعه کرده و ناشتا بودند، مصاحبه کوتاهی به عمل می‌آمد و در صورت تمایل به شرکت در این مطالعه و نداشتن مشخصه‌های انحصاری در همان زمان، برای بیمار سونوگرافی داپلر از شریان سلیاک انجام می‌شد. ارزیابی توسط سونوگرافی داپلر پس از ۱۰ دقیقه استراحت(جهت برقراری تعادل در سیستم گردش خون) در وضعیت تاقباز(Supine) صورت می‌گرفت(۳). بررسی شریان سلیاک در وضعیت طولی و در افراد لاغر و دارای جثه کوچک توسط پروب ۵ و در سایر افراد توسط پروب ۳/۵ مگاهرتز انجام می‌شد(۵).

ابتدا با سونوگرافی Gray Scale، تمام مسیر شریان سلیاک و نواحی قابل مشاهده از شاخه‌های آن از نظر وجود ضایعات بررسی و قطر تن شریان سلیاک(d) اندازه‌گیری می‌گردد. پس از آن، عروق ذکر شده توسط داپلر رنگی، از نظر جهت جریان خون و عدم وجود تنگی یا انسداد مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. در مرحله بعد پس از قراردادن Pulsed Sample Volume Cursor مربوط به Doppler در مرکز لومن تن شریان سلیاک(در قسمت میانی آن)، زاویه داپلر در محدوده مناسب آن(یعنی ۶۰-۳۰ درجه) تنظیم می‌شود(۶) و در حالت استراحت تنفسی(قطع تنفس بعد از بازدم عادی) شاخصهای داپلر شامل PSV، EDV، MV، RI، PI و همچنین شکل امواج داپلر شریان سلیاک توسط دستگاه محاسبه و ترسیم می‌گردد. سپس با استفاده از حاصل ضرب سطح مقطع شریان سلیاک در $MV = \pi \times d^2 \times 15$ میزان VF بر حسب میلی لیتر در هر مورد محاسبه می‌شود.

در تمام بررسیها (Pulse Repeataion Frequency) PRF بین ۵-۸ کیلوهرتز و Wall Filter روی عدد ۱۰۰ تنظیم شده بود(۳). هر یک از اندازه‌گیریها، ۲ بار تکرار و برای هر پارامتر، مقدار میانگین (Mean Value) در

روش بررسی

این مطالعه به صورت مشاهدهای - توصیفی (observational-Descriptive) (روی ۸۴ فرد سالم بالای ۲۰ سال (۴۲ مرد و ۴۲ زن) بدون داشتن مشخصه‌های انحصاری Exclusive Criteria) که در بررسی سونوگرافی داپلر نیز در آنها ضایعه‌ای مشاهده نشده بود انجام گردید. مشخصه‌های انحصاری در این مطالعه عبارت بودند از: ۱- افراد سیگاری ۲- مبتلایان به دیابت ملیتوس ۳- بیماران قلبی، ۴- افراد مبتلا به بیماریهای عروق محیطی ۵- مبتلایان به بیماریهای گوارشی ۶- مبتلایان به بیماریهای کبدی ۷- افرادی که داروهای گشاد کننده یا تنگ کننده عروق مصرف می‌کردند، ۸- افراد دارای اسپلنومگالی ۹- بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد یا مزمن ۱۰- افرادی که با توجه به سن، قد و جنس، وزن طبیعی نداشتند. ۱۱- افرادی که در بررسی سونوگرافی Gray Scale، ضایعه‌ای در شریان سلیاک یا آئورت شکمی آنها وجود داشت(۳).

افرادی که به دلیل پرهوایی روده‌ها، مشاهده شریان سلیاک در آنها امکان‌پذیر نبود از مطالعه حذف می‌شدند. همچنین در صورت عدم همکاری کافی در نگهداشتن تنفس، وجود ضربان قوی آئورت شکمی(که موجب لرزش تصویر می‌شود) و واریاسیون شریان سلیاک(مثلاً منشاً مشترک با شریان مزانتریک فوقانی)، بیمار از مطالعه خارج می‌گردد. روش نمونه‌گیری به صورت غیراحتمالی سهمیه‌ای آسان(Quata Convenience Non probability) بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول $n = \frac{Z^2 \cdot SD^2}{d^2}$ و ضریب اعتماد ۹۵٪($Z=1.96$) و خطای قابل قبول ۰/۰۵ و با توجه به SD برابر ۶/۴ سانتیمتر بر ثانیه (مربوط به PSV) که از مطالعات قبلی به دست آمده بود(۴)، ۸۴ نفر محاسبه گردید. روش گردآوری اطلاعات، مشاهده مشارکتی مستقیم (Direct participation observation) بود و برای انجام سونوگرافی داپلر از دستگاه Ultra sound scanner: Hitachi EUB-۵۲۵ کشور ژاپن استفاده شد. این دستگاه دارای پروباهای با

نتایج

توزیع سنی و جنسی افراد مورد مطالعه، در جدول شماره ۱ و حدود میانگین و انحراف معیار شاخصهای سونوگرافی داپلر شریان سلیاک با تفکیک گروههای سنی و جنسی در جدول شماره ۲ و نمودارهای شماره ۱ تا ۳ آورده شده است.

جدول شماره ۱- توزیع سنی و جنسی در افراد مورد مطالعه

M+F	زن (F)	مرد (M)	جنسی گروه سنی(سال)
۲۴	۱۱	۱۳	۲۰-۲۹
۳۳	۱۵	۱۸	۳۰-۳۹
۱۶	۹	۷	۴۰-۴۹
۱۱	۷	۴	۵۰-۵۹
۸۴	۴۲	۴۲	جمع

برگه‌های جمع‌آوری اطلاعات که براساس افراد تحت بررسی و متغیرهای مورد مطالعه تنظیم شده بودند ثبت می‌شد. سن و جنس هر داوطلب نیز در این برگه‌ها مشخص شده بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS-۱۰ تجزیه و تحلیل صورت گرفت سپس با استفاده از آمار توصیفی، جدولهای توزیع فراوانی و نیز شاخصهای پراکنده‌گی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای مورد مطالعه براساس گروههای مختلف سنی و جنسی به دست آمد.

مقایسه بین متغیرهای ذکر شده در دو جنس با استفاده از آزمون Chi-square و مقایسه بین این متغیرها در گروههای سنی مختلف توسط آزمون ANOVA صورت گرفت. از نظر رعایت نکات اخلاقی در این پژوهش قبل از انجام مطالعه، برای هر فرد، در مورد روش انجام کار، توضیح لازم داده شد و با وجود بی‌خطر بودن سونوگرافی داپلر، از هر یک از افراد داوطلب رضایت نامه گرفته شد.

جدول شماره ۲- حدود میانگین و انحراف معیار شاخصهای سونوگرافی داپلر شریان سلیاک در افراد مود مطالعه با تفکیک گروههای سنی و جنسی

(مرد، F=مرد، زن=M)

VF	PI	RI	d	MV	EDV	PSV	جنس	گروه سنی(سال)
دقیقه/میلی‌لیتر				سانتیمتر	ثانیه/سانتیمتر	ثانیه/سانتیمتر	ثانیه/سانتیمتر	
۹۴۶ ± ۱۵۸/۷۲	۰/۸۷ ± ۰/۰۴	۰/۶۱ ± ۰/۰۳	۰/۶۱ ± ۰/۰۵	۵۴ ± ۵/۹۳	۲۹ ± ۲/۲۶	۷۶ ± ۸/۶۹	M	
۹۸۲ ± ۸۲/۷۴	۰/۸۰ ± ۰/۰۶	۰/۶۰ ± ۰/۰۳	۰/۶۳ ± ۰/۰۲	۵۴ ± ۷/۶۹	۳۰ ± ۲/۳۸	۷۶ ± ۱۱/۱	F	۲۰-۲۹
۹۶۳ ± ۱۲۸/۰۸	۰/۸۶ ± ۰/۰۵	۰/۶۱ ± ۰/۰۳	۰/۶۲ ± ۰/۰۴	۵۴ ± ۶/۶۵	۲۹ ± ۲/۸۴	۷۶ ± ۹/۶۵	M+F	
۹۲۷ ± ۱۲۶/۱۱	۰/۹۸ ± ۰/۰۹	۰/۶۷ ± ۰/۰۲	۰/۵۶ ± ۰/۰۴	۶۴ ± ۶/۵	۳۱ ± ۲/۱۲	۹۴ ± ۱۰/۸	M	
۸۱۹ ± ۱۲۲/۳۵	۰/۹۷ ± ۰/۰۵	۰/۶۶ ± ۰/۰۲	۰/۵۴ ± ۰/۰۵	۶۳ ± ۹/۳۳	۳۱ ± ۲/۸۹	۹۲ ± ۱۳/۸	F	۲۰-۳۹
۹۰۱ ± ۱۲۶/۳۵	۰/۹۸ ± ۰/۰۷	۰/۶۷ ± ۰/۰۲	۰/۰۰ ± ۰/۰۵	۶۴ ± ۷/۷۹	۳۱ ± ۲/۴۶	۹۳ ± ۱۲/۱۲	M+F	
۷۵۸ ± ۷۳/۷۷	۱/۱۳ ± ۰/۰۲	۰/۷۲ ± ۰/۰۰۷	۰/۴۶ ± ۰/۰۲	۷۷ ± ۵/۹۴	۳۳ ± ۲/۵	۱۲۱ ± ۱۰/۵	M	
۸۱۷ ± ۱۳۶/۲۵	۱/۰۳ ± ۰/۰۶	۰/۶۸ ± ۰/۰۳	۰/۰۰ ± ۰/۰۶	۶۹ ± ۱۱/۰۲	۳۳ ± ۲/۳۱	۱۰۰ ± ۱۶/۱۲	F	۴۰-۴۹
۷۹۱ ± ۱۱۴/۰۰	۱/۰۸ ± ۰/۰۷	۰/۷۰ ± ۰/۰۳	۰/۴۸ ± ۰/۰۵	۷۳ ± ۹/۸	۳۳ ± ۲/۹	۱۱۲ ± ۱۵/۸۴	M+F	
۸۲۹ ± ۱۴۴/۶۸	۱/۱۶ ± ۰/۰۴	۰/۷۴ ± ۰/۰۰۹	۰/۴۷ ± ۰/۰۳	۸۲ ± ۵/۴۷	۲۴ ± ۱/۷۳	۱۲۹ ± ۸/۱	M	
۶۸۸ ± ۸۷/۲۲	۱/۱۳ ± ۰/۰۵	۰/۷۲ ± ۰/۰۱	۰/۴۳ ± ۰/۰۳	۷۹ ± ۵/۵	۳۳ ± ۲/۰۸	۱۲۲ ± ۱۰/۳۴	F	۵۰-۵۹
۷۴۳ ± ۱۲۹/۱۴	۱/۱۴ ± ۰/۰۴	۰/۷۲ ± ۰/۰۱	۰/۴۴ ± ۰/۰۳	۸۰ ± ۵/۴۹	۳۳ ± ۱/۸۸	۱۲۴ ± ۹/۷۲	M+F	
۸۹۶ ± ۱۴۵/۲۲	۰/۹۹ ± ۰/۱۲	۰/۶۷ ± ۰/۰۵	۰/۰۰ ± ۰/۰۷	۶۵ ± ۱۱/۲۲	۳۱ ± ۲/۷۶	۹۶ ± ۲۳/۹۶	M	
۸۵۷ ± ۱۴۵/۳۸	۰/۹۸ ± ۰/۱۱	۰/۶۶ ± ۰/۰۵	۰/۰۴ ± ۰/۰۷	۶۵ ± ۱۲/۰۱	۳۱ ± ۲/۱۷	۹۶ ± ۲۰/۱۷	F	کل گروههای سنی
۸۷۷ ± ۱۴۵/۷۴	۰/۹۸ ± ۰/۱۱	۰/۶۶ ± ۰/۰۵	۰/۰۴ ± ۰/۰۷	۶۵ ± ۱۱/۰۵	۳۱ ± ۲/۹۶	۹۶ ± ۲۰/۳۵	M+F	

بحث

در این مطالعه، محدوده PSV و EDV شریان سلیاک به ترتیب $96 \pm 20/25$ سانتیمتر بر ثانیه و $21 \pm 2/96$ سانتیمتر بر ثانیه به دست آمد که در مقایسه با اعداد موجود در کتاب مرجع Zwiebel (به ترتیب ۱۲۲-۸۶) سانتیمتر بر ثانیه و $22-35$ سانتیمتر بر ثانیه) (۴)، تفاوت چندانی بین نتایج ما با نتایج مطالعات قبلی وجود نداشت.

در این مطالعه، یافته‌های قابل توجه عبارت بودند از:

۱- بین گروههای مختلف جنسی، تفاوت معنی‌داری در VF، PI، RI، d، MV، EDV، PSV مشاهده نشد.

۲- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت معنی‌داری در PSV شریان سلیاک وجود داشت ($P < 0.05$) بطوری که با افزایش سن، PSV این شریان افزایش یافته بود.

۳- بین گروههای مختلف سنی مختلف در مردان، اختلاف معنی‌داری در PSV شریان دیده شد (بجز بین ۲ گروه ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال).

۴- بین گروههای مختلف سنی در زنان، تفاوت معنی‌داری در PSV شریان سلیاک وجود داشت (بجز بین ۲ گروه ۳۰-۳۹ سال و ۴۰-۴۹ سال و ۲ گروه ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال).

۵- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت معنی‌داری در EDV شریان سلیاک دیده شد ($P < 0.05$) بطوری که با افزایش سن، EDV این شریان افزایش یافته بود. هر چند که در ۲ گروه مجاور هم، این افزایش، معنی‌دار نبوده است.

۶- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت معنی‌داری در MV شریان سلیاک دیده شد ($P < 0.05$) بطوری که با افزایش سن، MV این شریان افزایش

نمودار شماره ۱- میانگین و انحراف معیار VF در گروههای سنی مختلف در افراد مورد مطالعه بر حسب میلی‌لیتر در دقیقه

نمودار شماره ۲- میانگین و انحراف معیار MV و PSV شریان سلیاک در گروههای سنی مختلف در افراد مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر بر ثانیه

نمودار شماره ۳- میانگین و انحراف معیار RI و PI و قطر شریان سلیاک در گروههای سنی مختلف در افراد مورد مطالعه

همان طور که اشاره شد، در مطالعه ما اختلاف معنی‌داری در MV، EDV، VF، PI، RI، PSV، VF، PI، MV، RI و VF و d کاهش یافته است. (P<0.05)

بطوری که با افزایش سن، EDV، PSV، RI و PI افزایش و VF و d کاهش یافته بودند.

این اختلاف معنی‌دار را می‌توان به تغییرات اترواسکلروتیک شریان سلیاک (که با افزایش سن بر شدت آن افزوده می‌شود) نسبت داد.

در کتاب مرجع Zwiebel، شکل امواج اسپکتروال داپلر شریان سلیاک به صورت Low pulsatility توصیف شده است⁽⁴⁾ که در این بررسی نیز، همین الگو مشاهده گردید.

منابع

1- Warwick W., Bannister D Angiology. In: Warwick W., Bannister D., Gray's anatomy, thirty seventh edition, Norwich, Churchill livingstone,1989, PP: 768-71.

2- Zoli M., Merkel C., Sabba C., Fillinger MF., Hirano T., Inter observer and interequipment variability of echo-doppler sonographic evaluation of the superior mesenteric artery, J-Ultrasound-Med, 1996, 15(2): 99-106.

3- Moneta GL., Taylor DC., Helton WS., Misson A., Duplex ultrasound measurement of post prandial intestinal blood flow, Gastro-enterology, 1988, 95: 1294-1301.

4- Zwiebel WJ., Ultrasound assessment of Splanchnic arteries. In: Zwieble W.J. Interoduction to vasular ultrasonography, Forth edition, Philadelphia, W.B.Saunders company, 2000, PP: 421-429.

5- Palmer PES., Manual of diagnostic ultrasound, First edition, Geneva, WHO, 1995, PP: 49-51.

6- Rizzo RJ., Sandager G., Astleford P., Zwolak RM., Walsh DB., Mesenteric flow

یافته بود (این افزایش بین ۲ گروه سنی ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال معنی‌دار نبوده است).

7- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت قطر شریان سلیاک معنی‌دار بود (P<0.05) و با افزایش سن، قطر شریان کاهش می‌یافتد (این کاهش، بین ۲ گروه سنی ۲۰-۲۹ سال و ۳۰-۳۹ سال و نیز بین ۲ گروه سنی ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال معنی‌دار نبود).

8- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت معنی‌داری در RI شریان سلیاک وجود داشت (P<0.05) و با افزایش سن، RI شریان افزایش می‌یافتد.

9- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت معنی‌داری در PI شریان سلیاک دیده شد (P<0.05)، بطوری که با افزایش سن، PI این شریان افزایش می‌یافتد (این افزایش بین ۲ گروه سنی ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال معنی‌دار نبود).

10- بین گروههای مختلف سنی، تفاوت در VF شریان سلیاک معنی‌دار بود (P<0.05)، بطوری که با افزایش سن، VF شریان کاهش یافته بود (این کاهش بین ۲ گروه سنی ۲۰-۲۹ سال و ۳۰-۳۹ سال و نیز بین ۲ گروه سنی ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال معنی‌دار نبود).

لازم به ذکر است که در مطالعات قبلی، بجز PSV و EDV شریان سلیاک، سایر متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق (MV، RI، VF، d، PI) تحت بررسی قرار نگرفته بودند و از سوی دیگر معنی‌دار بودن تغییرات این متغیرها (با توجه به سنین مختلف و همچنین در بین ۲ جنس) مشخص نشده بود.

velocity variations as a function of angle of insonation, J-Vasc-Surg, 1990,11(5): 688-94.

MEASUREMENT OF NORMAL INDICES OF CELIAC ARTERY DOPPLER ULTRASOUND IN PERSONS OVER 20 YEARS OLD

^I
***D. Saedi, MD** ^{II}
A.R. Haddadpour, MD

ABSTRACT

Doppler ultrasound is one of the non-invasive methods for blood flow assessment in cardio-vascular system and celiac trunk as the first branch of abdominal aorta is an important splanchnic artery. According to the relative differences in the reports of normal indices from doppler ultrasound of the celiac artery in the different medical centers of the world, it was decided to evaluate this issue in the department of sonography of Hazrat-e-Rasool-e-Akram Hospital in Tehran. 84 normal persons (42 men and 42 women over 20 years old) were selected by quota convenience non probability sampling method with no exclusive criteria and with the use of doppler ultrasound scanner (HITACHI: EUB-525). Different variables such as PSV(Peak Systolic Velocity), EDV(End Diastolic Velocity), MV(Mean Velocity), d(celiac trunk diameter), RI(Resistance Index), PI(Pulsatility Index), VF(Volume Flow) and doppler spectral wave forms were studied. This study was performed in the fasting and resting(supine) state. Exclusive criteria have been indicated in subject of methodology. This research had the following general conclusions: 1- Mean and standard deviation(SD) of PSV of celiac artery were 96 cm/s and 20.354 cm/s respectively. 2- Mean and SD of EDV of celiac artery were 31 cm/s and 2.967 cm/s respectively. 3- Mean and SD of MV of celiac artery were 65 cm/s and 11.566 cm/s respectively. 4- Mean and SD of diameter of celiac artery were 0.54 cm/s and 0.0767 cm/s respectively. 5- Mean and SD of RI of celiac artery were 0.66 cm/s and 0.0508 cm/s respectively. 6- Mean and SD of PI of celiac artery were 0.98 cm/s and 0.1189 cm/s respectively. 7- Mean and SD of VF of celiac artery were 877 ml/min and 145.745 ml/min respectively. 8- Doppler spectral wave forms had low-pulsatility pattern with forward continuous flow in diastole. 9- Between different age groups, there was a significant difference in PSV, EDV, MV, d, RI, PI and VF ($P < 0.05$), so PSV, EDV, MV, RI and PI increased with aging, while d and VF decreased with aging. 10- Finally, there was not any significant difference between men and women in indicated variables.

Key Words: 1) Doppler ultrasound 2) Artery 3) Celiac 4) Splanchnic

This article is a summary of the thesis of speciality in Radiology of A.R. Haddadpour, MD under supervision of D. Saedi, MD, 2002-2003.

I)Assistant professor of radiology, Hazrat-e-Rasoul-e-Akram Hospital, Niayesh St., Sattarkhan Ave., Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran(*Corresponding Author).

II)Resident of radiology, Hazrat-e-Rasoul-e-Akram Hospital, Niayesh St., Sattarkhan Ave., Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.