

تعیین ارزش تشخیصی نسبت کلسترول و بیلیروبین مایع پلور به سرم در تعیین نوع افیوژن پلور

چکیده

نخستین گام در راه تشخیص علت مایع جنبی جدانمودن موارد اگزوودا از ترانسسودا می‌باشد. در این راستا معیار Light سالها مورد استفاده قرار گرفته است، ولی گاهی مقادیر پروتئین و LDH مایع جنبی در محدوده مرزی قرار می‌گیرند و لذا استفاده از میزان دیگر مواد موجود در مایع جنبی می‌تواند کمک کننده باشد. این تحقیق یک مطالعه مقطعی با حجم نمونه ۷۰ نفر بود که در آن بیماران دارای تجمع مایع جنبی مورد بررسی قرار گرفتند و میزان LDH، بیلیروبین، کلسترول و پروتئین مایع پلور و سرم بطور همزمان اندازه‌گیری شد. از معیارهای Light نیز بعنوان مک (gold standard) استفاده گردید. میزان کلسترول مایع جنبی معادل و یا بیشتر از 60 mg/dl و نسبت کلسترول پلور به سرم معادل و یا بیشتر از $\frac{1}{3}$ و نسبت بیلیروبین پلور به سرم معادل $\frac{1}{6}$ و بالاتر نیز بعنوان اگزوودا در نظر گرفته شد. در آنالیز نتایج از شاخصهای حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبت درستنمایی مثبت و منفی و دقت استفاده گردید.

حساسیت و ویژگی نسبت بیلیروبین پلور به سرم بترتیب $\frac{5}{4}\%$ و $\frac{69}{2}\%$ محاسبه گردید و این شاخصها برای کلسترول پلور بترتیب $\frac{81}{5}\%$ و $\frac{66}{6}\%$ بدست آمد. برای شاخص کلسترول پلور به سرم حساسیت $\frac{87}{2}\%$ ، ویژگی $\frac{68}{6}\%$ ؛ ارزش اخباری مثبت برابر $\frac{87}{2}\%$ ؛ ارزش اخباری منفی برابر $\frac{68}{4}\%$ ؛ نسبت درستنمایی مثبت (PLR) برابر $\frac{2}{75}\%$ و نسبت درستنمایی منفی (NLR) برابر $\frac{18}{0}\%$ محاسبه گردید. با نگاه کلی به نتایج طرح، شاخصهای کلسترول پلور و نسبت کلسترول پلور به سرم از ارزش تشخیصی بالایی برخوردارند اما شاخص نسبت بیلیروبین پلور به سرم ارزش تشخیصی مناسبی در افتراق مایع جنبی اگزوودا از ترانسسودا ندارند.

۱ - افیوژن پلور	۲ - ترانسسودا	۳ - اگزوودا	۴ - بیلیروبین	۵ - پروتئین	۶ - کلسترول	کلید واژه‌ها:
-----------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

فضای جنب بین دو لایه جنب جداری و احشایی قرار دارد و جدار داخلی قفسه سینه و نسج ریه را می‌پوشاند. بطور فیزیولوژیک در فضای جنب لایه نازکی از مایع شبیه سرم وجود دارد. افیوژن پلور (pleural effusion)

فضای جنب بین دو لایه جنب جداری و احشایی قرار دارد و جدار داخلی قفسه سینه و نسج ریه را می‌پوشاند.

مقدمه

این مقاله در چهارمین کنگره بیماریهای ریوی ارائه شده است، تهران، ۱۳۷۹. همچنین این مقاله خلاصه‌ایست از پایان‌نامه دکتر رامین امامزادگان و دکتر مرتضی رضائیان

جهت دریافت درجه دکترای عمومی به راهنمایی دکتر محمد Mehdi Zanjani.

(I) استادیار و فوق تخصص بیماریهای ریه، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران. (مؤلف مسؤول)

(II) دانشیار و فوق تخصص بیماریهای ریه، مدیر گروه بیماریهای داخلی، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

(III) پژوهش عمومی

(IV) کارورز، عضو کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشکده پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

بیلیروبین مایع پلور و گرادیان پروتئین سرم و مایع پلور در افتراق انواع افیوژن مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی

این پژوهش مطالعه‌ای مقطعی - توصیفی (descriptive cross-sectional) جهت تعیین ارزش تشخیصی کلسترول و بیلیروبین مایع پلور بود.

نمونه‌های مورد نیاز طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۷ از بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در تهران - که بهر علت دچار پلورال افیوژن بودند- تهیه گردید. حجم نمونه لازم براساس فرمول برآورد یک نسبت ۶۵ نفر محاسبه شد.

برای افراد مورد پژوهش در کنار آزمایش‌های لازم جهت تشخیص و درمان، آزمایش‌های تعیین میزان پروتئین، LDH، بیلیروبین و کلسترول همزمان مایع جنب و سرم نیز درخواست شد. سپس نسبت LDH، بیلیروبین، کلسترول و پروتئین مایع پلور به سرم محاسبه گردید. جهت تعیین نوع واقعی مایع پلور، از شاخصهای Light بعنوان محرک (gold standard) استفاده شد.

در روش Light جهت تشخیص اگزوودا از شاخصهای زیر استفاده می‌گردد(۴): ۱- نسبت پروتئین مایع پلور به سرم بیشتر از ۰/۰۵، ۲- نسبت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) مایع جنب به سرم بیشتر از ۰/۰۶، ۳- میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) مایع جنبی بیش از دو سوم بالاترین حد طبیعی میزان LDH سرم. همچنین جهت تشخیص اگزوودا از ترانسوزدا در مورد سایر شاخصها، میزان کلسترول مایع پلور بیش از ۶۰ mg/dl، نسبت کلسترول مایع پلور به سرم معادل ۰/۳ و بیشتر، همچنین نسبت بیلیروبین مایع پلور به سرم بیش از ۰/۶ بعنوان اگزوودا در نظر گرفته شد. گرادیان پروتئین سرم و مایع پلور کمتر از ۱/۲ نیز بعنوان اگزوودا در نظر گرفته شد.

در تحلیل نتایج، برای تعیین ارزش تشخیصی هر یک از نسبتهای از شاخصهای حساسیت

زمانی ظاهر می‌شود که مایع اضافی در فضای جنب تجمع یابد و در واقع ناشی از عدم تعادل بین تولید و ترشح مایع و باز جذب آن است(۱).

افیوژن پلور بهمراه بیماریهای گوناگونی چون نارسایی قلبی، بیماریهای کبدی، عفونت ریه، متاستاز به جنب، مزوتلیوما، آمبولی ریه، سل، ایدز، بیماریهای قارچی، بیماریهای انگلی، ترومما، نارسایی کلیوی، آرتربیت روماتویید، لوپوس و دیگر موارد مشابه دیده می‌شود(۵-۲).

ذکر این نکته لازم است که افیوژن پلور صرفاً یک علامت محسوب می‌گردد و باید در هنگام برخورد با آن تا زمان تشخیص بیماری اصلی، بیمار را تحت نظر قرار داد؛ لذا قدم اول در برخورد با چنین بیمارانی شناسایی خصوصیات مایع تجمع یافته در پرده جنب می‌باشد. بهترین راه جهت تقسیم‌بندی موارد تشخیصی افتراق مایع ترانسوزدا از اگزوودا است و بدین وسیله دو دسته بزرگ از تشخیص‌های افتراقی ایجاد می‌گردد که در رویکرد بالینی به بیمار بسیار کمک کننده می‌باشد(۶-۴).

شناسایی نوع مایع جنبی علاوه بر رسیدن به تشخیص در تعیین نوع درمان و روند بهبود بیماری نیز کمک می‌کند(۶). برای تقسیم افیوژن پلور به انواع ترانسوزدا و اگزوودا لازم است معیارهای مشخصی مد نظر قرار گیرند تا در تعیین و تشخیص موارد متنوع تجمع مایع در فضای جنب کمک کننده باشند.

یکی از بهترین و رایجترین این معیارها شاخصهای ارائه شده توسط Light می‌باشد که با استفاده از میزان پروتئین و LDH در مایع پلور و سرم همزمان، نوع مایع تجمع یافته را مشخص می‌نماید(۴).

در بعضی از منابع از شاخصهای دیگری همچون کلسترول مایع پلور، بیلیروبین مایع پلور و تفاوت غلظت (gradiant) آلبومین مایع پلور و سرم بعنوان معیارهای تشخیصی یاد شده است(۷-۱۲).

با توجه به عدم وجود تحقیقات کافی در رابطه با سه شاخص اخیر، در این مطالعه ارزش تشخیصی کلسترول،

و ۲۷ نفر (۵٪/۳۸) بودند. میانگین سنی کلیه افراد مورد پژوهش ۵۶/۲ سال (حدوده ۵۵/۶-۵۶/۸ سال) بود.

از مجموع ۷۰ نفر، بر اساس شاخصهای Light (که بعنوان gold standard استفاده شد) ۴۹ نفر (۷۰٪) دارای مایع جنبی اگزوداتیو و ۲۱ نفر (۳۰٪) دارای مایع جنبی ترانسوزداتیو بودند (جدول شماره ۱). توزیع فراوانی انواع تشخیص نهایی بیماران نیز در جدول شماره ۲ ذکر شده است.

(specificity)، ویژگی (sensitivity) ارزش اخباری مثبت (positive predictive value)، ارزش اخباری منفی (Negative predictive value) و نسبت درست نمایی (positive & Negativ likelihood ratio) مثبت و منفی (positive & Negativ likelihood ratio) است که محققین در کلیه مراحل تحقیق متعهد به اصول اخلاقی اعلامیه هلسینکی بوده‌اند.

نتایج

چهل و سه نفر (۵/۶۱٪) از افراد مورد پژوهش مرد

جدول شماره ۱- نتایج آزمایش‌های بیوشیمیایی افیوژن پلور

ترانسوزدا			اگزودا			تست
	تعداد موارد مثبت تست	تشخیص قطعی		تعداد موارد مثبت تست	تشخیص قطعی	
۱۸	۵۳	۲		۱۰		نسبت بیلی روبین پلور به سرم
۲۰	۲۷	۳۱		۴۱		کلسترول پلور
۱۳	۱۹	۴۱		۴۷		نسبت کلسترول پلور به سرم
۲۱	۲۱	۴۹		۴۹		شاخصهای Light

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی علل افیوژن پلور در بیماران مورد پژوهش

توزیع فراوانی	علل افیوژن پلور	بدخیمی ریه و پرده جانب	پلورال افیوژن پاراپنومونیک	آمبولی ریوی	سل ریوی	CHF	سایر علل
۹	۱۵	۱۵	۳	۱۴	۱۴	۱۴	۹

ارزش اخباری مثبت و منفی آن بترتیب ۴/۵٪، ۲۰٪/۲٪ و ۹٪/۳۳٪ محاسبه گردید و این در حالیست که نسبت درست نمایی مثبت و منفی آن بترتیب ۰/۱۷۵ و ۰/۳۶ بود. در نگاه کلی، این نسبت در افتراق موارد اگزودا و ترانسوزدا دقی (accuracy) معادل ۳۱٪ دارد (جدول شماره ۳).

در ۶۳ مورد، شاخص نسبت بیلی روبین مایع پلور به سرم جهت تشخیص مورد استفاده قرار گرفت (در بقیه موارد، نتایج این آزمایش موجود نبود) که تنها ۲ مورد (۲۰٪) اگزودا و ۱۸ مورد (۳۳٪) ترانسوزدا تشخیص داده شده توسط این تست، درست بودند (جدول شماره ۱) و بدین ترتیب حساسیت، ویژگی و

جدول شماره ۳- ارزش تشخیصی آزمایش‌های بیوشیمیایی پلور در افتراق موارد اگزودا و ترانسوزدا از یکدیگر

NLR	PLR	NPV(%)	PPV(%)	Spc(%)	Sen(%)	Accuracy(%)	تست
۱/۳۶	۰/۱۷۵	۳۲/۹	۲۰	۶۹/۲	۵/۴	۳۱	بیلی روبین پلور به سرم
۰/۲۷	۲/۴۴	۷۴	۷۵/۶	۶۶/۶	۸۱/۵	۷۵	کلسترول پلور
۰/۱۸	۲/۷۵	۶۸/۴	۸۷/۲	۶۸/۴	۸۷/۲	۲	کلسترول پلور به سرم

Sen: Sensitivity

NLR: Negative likelihood ratio

PLR: Positive likelihood ratio

NPV: Negative Predictive Value

PPV: Positive Predictive Value

کارایی ضعیفی داشته و مورد توجه نمی باشد^{۷، ۸ و ۱۲}. میزان کلسترول پلور جهت افتراق موارد اگزوودا از ترانسودا دارای حساسیت نسبتاً بالایی می باشد. در نتیجه موارد منفی کاذب آن پایین و جواب منفی (ترانسودا) این تست دارای ارزش می باشد. ویژگی این تست نیز در حد متوسطی قرار دارد و نتایج مثبت آن نیز از ارزش مناسبی برخوردار است. در مطالعات مشابه نیز حساسیت، ویژگی، PPV و NPV آن بترتیب ۹۱٪، ۱۰۰٪ و ۷۹٪ محاسبه شده است که خود نشان از ارزش تشخیصی بالای آن دارد^۹. همچنین شاخص نسبت کلسترول پلور به سرم نیز از بیشترین حساسیت (نسبت به سایر شاخصها) برخوردار است و در نتیجه، گزارش منفی آن (ترانسودا) ارزش تشخیصی بالایی دارد اما با توجه به ویژگی نه چندان بالای آن، نتیجه مثبت (اگزوودا) دارای ارزش متوسطی می باشد.

در مطالعات مشابه نیز حساسیت، ویژگی، PPV و NPV این شاخص بترتیب ۹۲/۵٪، ۸۷/۶٪ و ۸۰٪ محاسبه گردید که نشان از ارزش تشخیصی مناسب این شاخص در افتراق اگزوودا از ترانسودا دارد^{۱۰}.

با توجه به نسبت درست نمایی مثبت (PLR) شاخصهای بدست آمده و مقایسه آنها، بهترین شاخص جهت اثبات (rule in) اگزوودا استفاده از نسبت کلسترول پلور به سرم می باشد. همچنین ضعیفترین شاخص جهت اثبات اگزوودا استفاده از نسبت بیلی روبین پلور به سرم است.

با مقایسه نسبت درست نمایی منفی (NLR) شاخصهای یاد شده بهترین تست جهت رد (rule out) اگزوودا (و در نتیجه اثبات ترانسودا) استفاده از نسبت کلسترول پلور به سرم و بعد از آن کلسترول پلور می باشد و ضعیفترین شاخص جهت رد اگزوودا نیز استفاده از نسبت بیلی روبین پلور به سرم است.

ذکر این نکته لازم است که با توجه به شاخصهای کلسترول مایع پلور، نسبت بیلی روبین و نسبت کلسترول مایع پلور به سرم به تنها ی نمی توان نوع مایع پلور را بطور قطع مشخص کرد و هر یک از این شاخصها دارای موارد مثبت و منفی کاذب می باشد.

جهت بررسی کلسترول مایع پلور تنها از ۶۸ مورد استفاده گردید (بقیه موارد نتایج آزمایش مشخصی نداشتند). از مجموع ۴۱ مورد تشخیص اگزوودا توسط این تست، نتایج مربوط به ۳۱ مورد درست بود و از مجموع ۲۷ مورد تشخیص ترانسودا توسط این تست، براساس شاخصهای Light تنها ۲۰ مورد آن درست تشخیص داده شد (جدول شماره ۱) و بدین ترتیب حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی این تست بترتیب ۸۱/۵٪، ۶۶/۶٪ و ۷۵/۶٪ محاسبه گردید و این در حالیست که نسبت درست نمایی مثبت و منفی آن بترتیب ۲/۴۴ و ۰/۲۷ بود.

در نگاه کلی، این نسبت در تشخیص اگزوودا از ترانسودا دقیق معادل ۷۵٪ دارد (جدول شماره ۲). در نهایت جهت بررسی نسبت کلسترول مایع پلور به سرم از ۶۶ نمونه استفاده گردید.

توسط این تست ۴۷ بیمار در گروه اگزوودا قرار گرفتند که ۴۱ مورد (۸۷/۲٪) آن توسط شاخصهای Light تایید شد. همچنین ۱۲ مورد از ۱۹ مورد ترانسودا با شاخصهای Light همخوانی داشت (جدول شماره ۱) و بدین ترتیب حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی این تست بترتیب ۸۷/۲٪، ۶۸/۴٪ و ۴/۸٪ محاسبه شد. نسبت درست نمایی مثبت و منفی آن نیز بترتیب ۲/۷۵ و ۰/۱۸ بود. بطور کلی دقت این شاخص در افتراق اگزوودا از ترانسودا ۸۲٪ بود (جدول شماره ۳).

بحث

با نگاهی به نتایج طرح در مورد شاخص بیلی روبین پلور به سرم می توان گفت که این شاخص از حساسیت بسیار پایینی برخوردار است، نتایج مثبت کاذب بالایی دارد و در نتیجه جواب مثبت آن (اگزوودا) ارزش تشخیصی کمی دارد. این در حالی است که ویژگی این شاخص نیز چندان بالا نمی باشد و نتایج منفی آن (ترانسودا) نیز ارزش بالای ندارد.

لازم بذکر است که این شاخص در مطالعات مشابه نیز

- 9- Voldes L., Pose A., Suarez J., et al., cholesterol a useful parameter for distinguishing between pleural transudates & exudates. Chest. 1991; 99: 1097-102.
- 10- Lakhoti s., Yadav P., Sinha F., et al., comparison of biochemical parameters in pleural effusion-j-assoc-physicians. India. 1996; 44: 612-14.
- 11- Roth BJ., Meara TF., Gragun WH., the serum-effusion Albumin gradient in the evaluation of pleural effusion, chest. 1990; 98(3): 546-9.
- 12- Miesel S., Shamis A., Thaler M., et al., pleural fluid to serum bilirubin ratio for the separation of transudates for exudates, chest. 1990; 98: 141: 4.
- 13- Romero S., Candela A., Martin CA., et al., Evaluation of different criteria for the separation at pleural transudates from exudates. Chest. 1993; 104: 399-404.
- 14- Bwgess L., Martiz F., Taljard F., Comparative analysis of the biochemical parameters used to distinguish between pleural transudates and exudates. Chest. In press 1995, 107(6): 1604-9.

در تحقیقات مشابه دیگری نیز به مقایسه شاخصهای Light و سایر مشخصات بیوشیمیایی مایع پلور در افتراق اگزودا از ترانسرودا پرداخته شده است و در آنها شاخصهای Light کارآمدتر از شاخصهای کلسترول پلور و نسبت بیلی روبین و کلسترول پلور به سرم گزارش شده است. اما در مواردی شاخصهای Light حالت مرزی دارند و در چنین شرایطی استفاده از سایر شاخصها جهت تعیین نوع افیوژن توصیه می شود. همچنین در مواردی که از لحاظ بالینی برای بیمار احتمال افیوژن پلور ترانسروdatio مطرح است، اما با توجه به شاخصهای Light افیوژن اگزوداtiei محتمل می باشد نیز استفاده از سایر شاخصهای بیوشیمیایی بخصوص نسبت بیلی روبین و کلسترول مایع پلور به سرم توصیه می شود(۱۳ و ۱۴).

منابع

- 1- Light R.W., Harrison's principles of internal medicine, McGraw Hill, USA, 13 rd Edi. 1998, pp: 1472-76.
- 2- Martinez E., Aparicio J., Sanchis J., et al., malignant pleural effusion: prognostic factors for survival & response to chemical pleurodesis in a series of 120 cases, Respiration. 1998; 65(2): 108-13.
- 3- Murray J., Naidel, Textbook of respiratory medicine, W.B. Saunders company, USA, 1994, pp: 2164-92.
- 4- Light RW., pleural disease, Dis man, williams & wilkins, USA, 3rd ed. 1995, 28: 266-8.
- 5- Walker R., Vaughan L., Sahn S., et al., chemical pleurodesis for malignant pleural effusion, Ann. Intern. Med, 1994; 125: 56-9.
- 6- Wiener K., Broaddus V., Interrelationship of pleural & pulmonary interstitial liquid, Ann. Rev. physiol. 1993; 55: 209-11.
- 7- Metintas M., Alatas O., Alatas F., et al., compattative analysis of biochemical parameters for differentiation of pleural exudates from transudates, clin. Chim. Acta. 1997; 264: 149-62.
- 8- Hamm H., Brohan U., Bohmer R., et al., cholesterol in pleural effusions, chest. 1987; 92: 296-302.

ASSESSING THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE RATIO OF PLEURAL FLUID CHOLESTROL AND BILIRUBIN TO THAT OF SERUM IN DETECTING THE TYPE OF PLEURAL EFFUSION

I ***M.M. Zahmatkesh, MD** *II* **A. Ehteshami Afshar, MD** *III* **M. Rezaian, MD** *III* **R. Emamzadegan, MD**
IV **A. Chehrei**

ABSTRACT

The first step in diagnosing the cause of effusion is to differentiate exudate from transudate. In according to that, Light's criteria has been used for years, but sometimes the amount of protein and LDH of the pleural effusion remains at the borderline, therefore detecting other components may be useful.

This research is a cross-sectional study with a sample of 70 patients having pleural effusion, the levels of LDH, bilirubin, cholesterol and protein in the pleural fluid and serum were measured. Light's criteria also was used as "gold standard". The cholesterol level above than 60 mg/dl and the ratio of cholesterol and of pleural fluid to that of serum above than 0.3 and 0.6 respectively were considered to be the characteristics of an exudate. In the analysis of the results, specificity, sensitivity, positive and negative predictive value, positive and negative likelihood ratio and accuracy were used.

The sensitivity and the specificity of the ratio of bilirubin in the pleural effusion to serum was measured to be 5.4% and 69.2% respectively, for pleural cholesterol as 81.5% and 66.6%, for the ratio of pleural cholesterol to serum as 87.2% and 68.6%, PPV as 87.2%, NPV as 68.4%, PLR as 2.75 and NLR as 0.18.

Thoroughly, the results of the ratio of Pleural cholestrol to that serum and pleural cholestrol, proned to have more diagnostic values than the bilirubin level in differentiating exudate from transudate.

Key Words: 1) Pleural effusion 2) Transudate 3) Exudate 4) Bilirubin 5) Protein 6) Cholesterol

Presented in the 4th congress of pulmonary disease, Tehran, 2000. Also this article is a summary of the thesis of R. Emamzadegan, MD. and M. Rezaian, MD. under supervision of M.M. Zahmat Kesh, MD. 1998-1999.

I) Assistant professor of pulmonary diseases, Hazrat Rasul-e Akram hospital, Sattar Khan Ave. Niayesh St. Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran. (*Corresponding author)

II) Associate professor of pulmonary diseases and head of department of Internal medicine, Hazrat Rasul-e Akram hospital, Sattar Khan Ave. Niayesh St. Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

III) General physician

IV) Intern, member of student research committee, faculty of medicine, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.