

چرخش منفرد لوله فالوب در حاملگی: گزارش موردی

چکیده

دکتر شهره بهاء صدری^۱

چرخش منفرد لوله فالوب در حاملگی بسیار نادر است. از عوامل مساعد کننده می‌توان به هیدروسالپتیکس، اعمال جراحی قبلی بر لوله، توده‌های تخدمانی و جنب تخدمانی اشاره نمود. در بعضی موارد نیز هیچ عامل مساعد کننده‌ای یافت نمی‌شود. مهمترین شکایت بیمار درد در ناحیه تحتانی شکم است. تشخیص معمولاً پس از انجام عمل جراحی بعلت شکم حاد مشخص می‌شود و در اغلب موارد نیز خارج‌سازی (resection) لوله اجتناب‌ناپذیر است. در این گزارش خانم حامله ۲۴ هفته‌ای معرفی می‌گردد که بعلت درد ناحیه تحتانی راست شکم و با تشخیص سنگ حالب و پیلوفریت بمدت دو هفته تحت درمان بود و بعلت عدم پاسخ به درمان و تشدید درد، پس از انجام بررسیهای لازم با تشخیص شکم حاد تحت عمل جراحی قرار گرفت و چرخش لوله راست بصورت منفرد مشخص گردید. این مورد به لحاظ نادر بودن و اهمیت آن بعنوان تشخیص افتراقی شکم حاد در حاملگی معرفی می‌گردد.

کلید واژه‌ها: ۱- چرخش منفرد لوله ۲- حاملگی ۳- شکم حاد

مقدمه

چرخش منفرد لوله فالوب پدیده‌ای نادر است که برای اولین بار توسط Sutton در سال ۱۸۹۰ گزارش شد^(۱). شکایت اصلی بیمار درد متناوب در زیر شکم است و از آنجا که علائم و نشانه‌های غیر اختصاصی هستند، همانند سایر موقعیت‌های شایعتر، تشخیص صحیح قبل از عمل جراحی بندرت مسجل می‌گردد. در حاملگی تشخیص آن غالباً با آپاندیسیت حاد و چرخش تخدمان اشتباہ می‌شود^(۲-۵).

از آنجا که تشخیص بموضع، می‌تواند موجب حفظ لوله شود، لذا لازم است چرخش لوله نیز بعنوان تشخیص افتراقی مهم شکم حاد مدنظر قرار گیرد^(۱، ۶ و ۷).

معرفی بیمار
مورد معرفی خانم حامله ۲۶ ساله شکم اول با سن حاملگی ۲۴ هفته بود که با شکایت درد ناحیه تحتانی راست شکم برای مرتبه سوم بستری شد. بیمار از دو هفته قبل از بستری اخیر دچار درد متناوب در پهلوی راست شده و با تشخیص احتمالی عفونت ادراری، بمدت ۴۸ ساعت تحت درمان قرار گرفته و سپس مرخص شده بود.
وی چهار روز بعد مجدداً با همان شکایت (درد در ناحیه تحتانی راست شکم) مراجعه نمود، این بار بیمار با تشخیص احتمالی عفونت ادراری مقاوم به درمان معالجه شد.
لازم بذکر است که طی این مدت کشت ادرار بیمار

۱) استادیار بیماریهای زنان و زایمان، زایشگاه شهیداکبرآبادی، خیابان مولوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.



تصویر شماره ۱- نمای نکروتیک لوله فالوپ پس از عمل جراحی

بحث

چرخش منفرد لوله فالوپ بسیار نادر است و شیوع آن در حدود یک مورد در هر ۱,۵۰۰۰۰ زن در سال گزارش شده است. حدود ۸۰٪ موارد این عارضه در سنین باروری رخ می‌دهد و از این میزان حدود ۱۲٪ موارد آن طی حاملگی بروز می‌نماید^(۱). در اغلب موارد چرخش لوله راست اتفاق می‌افتد. وجود کولون سیگموئید در سمت چپ، کندی جریان خون در ورید تخدمانی راست و اقدام سریع به عمل جراحی در سمت راست راست از عوامل این اختلاف محسوب می‌شوند^(۲).

خونرسانی غنی لوله از شاخه‌های شریان تخدمانی و رحمی سبب می‌شود در ابتدا و قبل از انفارکتوس واضح لوله، درجاتی از ایسمکی بروز نماید. چرخش لوله ممکن است ابتدا متناوب و یا ناقص باشد در نتیجه بیمار با تاریخچه درد متناوب در زیر شکم از مدتی قبل مراجعه می‌کند^(۲).

اگر چه در مواردی چرخش لوله بدون عامل موثری ایجاد می‌شود، اما از عوامل مساعد کننده آن می‌توان از هیدروسالپنکس، هماتوسالپنکس، اعمال جراحی بر روی لوله، مزوسالپنکس بلند و یا ناقص، وجود کیست مورگانی و همچنین کیستهای تخدمان و جنب تخدمانی نام برد. براساس نظریه Jeffcoate رحم حامله در حال رشد نیز موجب ایجاد فشار چرخشی بر روی آدنکس می‌شود و می‌تواند از

منفی، اما آنالیز ادراری (U/A) حاوی گلبول سفید فراوان بود.

در سونوگرافی بعمل آمده هیدرونفروز درجه دو در کلیه راست مشخص بود و بهمین دلیل احتمال وجود سنگ در مسیر حالب راست مطرح شد.

همچنین توده‌ای اکولوست به ابعاد تقریبی ۳۶×۳۸mm در جایگاه تخدمان راست، با حاشیه مختصراً نامنظم در سمت داخل مشاهده شد که احتمال چرخش کیست تخدمان راست را نیز مطرح می‌کرد. همچنین جنین سالم با سن تقریبی ۱۲ ± ۲ هفته گزارش شد.

این بار بیمار پس از ۲۴ ساعت بستری، با بهبودی نسبی مرخص گردید و چند روز بعد برای مرتبه سوم بعلت شدت درد (همراه با تهوع و استفراغ) مجدداً بستری شد. تکرار سونوگرافی هیچ گونه یافته‌های جدیدی در بر نداشت و علائم حیاتی بیمار نیز در حد طبیعی بود.

در معاینه، رحم در حدود ۲۴ هفته قرار داشت و در لمس نیز حساس نبود، لیکن حساسیت در ناحیه تحتانی راست شکم یافته بارز معاینه بود. پس از انجام آزمایش‌های اولیه و مشاوره جراحی، جهت تشخیص نهایی اقدام به لапاراتومی گردید.

حين عمل توده‌ای به ابعاد ۶×۷cm و کاملاً نکروتیک مشخص شد که در واقع لوله راست رحم بود که در محل تلاقی آمپول به ناحیه ایسم دچار چرخش کامل شده بود(تصویر شماره ۱).

تخدمان راست و آپاندیس طبیعی بودند. لوله راست خارج و جهت بررسی به بخش پاتولوژی ارسال شد. گزارش پاتولوژی مؤید انفارکتوس و نکروز لوله بود. در این مورد عامل مساعد کننده مشخصی بغير از حاملگی وجود نداشت.

بیمار در روز سوم بعد از عمل با حال عمومی خوب بیمارستان را ترک نمود و در هفته چهل و یکم حاملگی بدنیال یک زایمان طبیعی نوزاد سالمی به وزن چهار کیلوگرم بدنیا آورد.

منابع

- 1- Adekanmi OA., Barrington JW., Edwards G., Isolated torsion and hemorrhagic infarction of normal fallopian tube. Case report BJOB 2000 AUG, 107(8); 1047-8.
- 2- Argenta PA., Yeagley JJ., Torsion of the uterine adnexa pathologic correlation and current management trends J Reprod med 2000 OCT, 45(10): 831-6.
- 3- Dueholm M., Praest J., Isolated torsion of the normal fallopian tube: Case report. Acta obstet Gynecol Scand 1987, 66: 89-90.
- 4- McKenna PJ., Gerbert Kill. Isolated torsion of uterine in pregnancy: A case report. J Reprod Med 1989, 34: 187-8.
- 5- Sorem KA., Bengtson JM., Walsh B., Isolated torsion of fallopian tube presenting in labor, A case report. J Reprod Med 1991: 36: 763-4.
- 6- Yalcin O., Hassa H., Zeytinoglu S., Isolated torsion of fallopain tube during pregnancy, report of two cases. Ear. J. of obstet. Gynecol 1997, 74: 174-182.
- 7- Wang PH., Yuan CC., Chao HT., Isolated tubal torsion managed laparasropically J Am Assoc Gynecol laparosc: 2000 Aug, 7(3): 433-7.

عوامل موثر در این پدیده باشد. براساس تئوری Sellheim تغییر وضعیت ناگهانی بدن نیز می‌تواند موجب حرکت غیرعادی ارگانهای داخلی شود (۱، ۲ و ۵). مهمترین شکایت بیمار درد زیر شکم است که می‌تواند همراه با تهوع و استفراغ باشد.

بیمار معمولاً تب ندارد و نتیجه آزمایش‌های وی نیز در محدوده طبیعی است (۲، ۵ و ۶). در این رابطه تشخیص‌های افتراقی زیادی وجود دارند که شامل چرخش توده‌های تخدمانی، آپاندیسیت حاد، حاملگی خارج از رحم، سالپنژیت، آبسه لوله و تخدمان، سنگ حالب، پارگی کیست تخدمان، دژنرسانس میوم و جداشدن زودهنگام جفت می‌باشد (۴-۶).

همچنین تشخیص اشتباه آپاندیسیت حاد بجای چرخش لوله راست و یا چرخش توده‌های تخدمانی (بعثت تشابه نمای سونوگرافی) از جمله موارد شایع است (۱). در مجموع تشخیص قبل از عمل بسیار دشوار است و معمولاً در هنگام لپاراتومی مشخص می‌گردد.

در غالب موارد لوله متورم است و به تناسب زمان تشخیص، می‌تواند دچار درجاتی از نکروز و انفکتوس شده باشد (۱، ۳ و ۵).

رهاسازی از وضعیت چرخش - در صورتیکه علائمی از انفکتوس مشاهده نشود - امکان‌پذیر است اما در غالب موارد خارج‌سازی (resection) لوله ضروری بنتظر می‌رسد (۱، ۳ و ۶).

نتیجه

تشخیص قبل از عمل چرخش منفرد لوله فالوب مشکل است، عدم تشخیص بموقع می‌تواند منجر به نکروز و صدمه غیرقابل جبران به لوله و حتی تخدمان شود، در حالیکه اقدام به لپاراتومی زود هنگام می‌تواند موجب حفظ لوله و حتی حفظ توانایی بارداری پس از رهاسازی از وضعیت چرخش شود.

در موارد مناسب لپاراسکوپی تشخیصی نیز نقش مهمی در تشخیص بموضع و اجتناب از تاخیر در درمان بر عهده دارد (۷).

ISOLATED TORSION OF THE FALLOPIAN TUBE IN PREGNANCY: A CASE REPORT

^I
Sh. Bahasadri, MD

ABSTRACT

Isolated torsion of fallopian tube is an unusual event during pregnancy. Predisposing factors for torsion are hydrosalpinx, prior tubal operation, ovarian and paraovarian masses, although there maybe no obvious cause. Patient present with lower quadrant pain and diagnosis is usually made during operation for acute abdomen and salpingectomy is almost always necessary. In this report, a 24-week pregnant woman, with chief complaint of lower abdominal and right flank pain is presented, who had been treated with impresion of pyelonephritis and ureteral stone. Finally, due to lack of improvement, an exploring laparatomy was done with daignosis of acute abdomen and isolated torsion of right fallopian tube with no predisposing factor was found.

This rare case is presented to emphasize its importance in differential diagnosis of acute abdomen during pregnancy.

Key Words: 1) Torsion of fallopian tube 2) Pregnancy 3) Acute abdomen

I) Assistant professor of gynecology, Shahid Akbar Abadi Maternity Hospital, Molavi st, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.