

گزارش یک مورد پاراگانگلیومای بدخیم جسم کاروتوید سمت راست

چکیده

در این گزارش خانم ۶۴ ساله‌ای معرفی می‌گردد که به علت وجود یک توده در سمت راست گردن (زیر زاویه فک تحتانی) که از ۴ ماه قبل از مراجعته رشد آن آغاز شده بود؛ تحت عمل جراحی خارج کردن توده قرار گرفت. در بررسی ماقروسوکوبی توده تومورال خارج شده، دارای حدود مشخص، به رنگ قرمز - قهوه‌ای و قوام آن در برش سفت بود. سطح مقطع غیریکنواخت و کانون‌های پراکنده خون‌ریزی مشاهده شد. همچنین دو عدد غده لنفاوی ناحیه‌ای به رنگ کرم - خاکستری با قوام نرم در برش سطح مقطعی غیریکنواخت دیده شد. در مطالعه ریزبینی تومور به طور غالب دارای نتای zell ballen بود. سلول‌های تومورال پلئومورفیک با سیتوپلاسم اوزیزوفیلیک فراوان و هسته هیبریکروم توسط سلول‌های حمایت کننده احاطه شده بودند. در اسلایدهای تهیه شده از غدد لنفاوی کانون متاستاتیک در ناحیه ساب کپسولار ملاحظه شد. در نهایت برای بیمار تشخیص تومور نادر پاراگانگلیومای بدخیم جسم کاروتوید مطرح گردید.

*دکتر فروغ هاشمی I

دکتر فاطمه سمیعی راد II

دکتر فیروزه شهرکی III

کلیدواژه‌ها: ۱- جسم کاروتوید ۲- پاراگانگلیوما ۳- بدخیم

تاریخ دریافت: ۸۳/۱۱/۴ تاریخ پذیرش: ۸۳/۶/۲۸

مقدمه

پاراگانگلیومای جسم کاروتوید یکی از شایع‌ترین پاراگانگلیوماهای است.^(۱-۴) بیماران گزارش شده دارای رنج سنی از ۵ تا ۷۹ سال هستند. میانگین سنی دهه پنجم می‌باشد.^(۴) اندکی در خانم‌ها شایع‌تر است.^(۱,۵) ممکن است به صورت فامیلیال نمایان شود.^(۴,۵) در ۴-۸٪ موارد درگیری دو طرفه و گاهی متعدد دیده می‌شود.^(۱,۵,۷)

پاراگانگلیوماهای از سلول‌های بدبوی ستیغ عصبی که در طی دوره رویانی به قسمت‌های مختلف بدن مهاجرت می‌کنند منشا می‌گیرد.^(۱-۲) سلول‌های بدبوی خود به دو گروه سلولی که شامل سلول‌های اصلی پاراگانگلیونیک و سلول‌های حمایت کننده با sastentacular بوده و از نظر ۱0۰-۱۰۰ مثبت است، تمایز می‌یابند. در ناحیه سر و گردن این سلول‌ها در ارتباط با اعصاب پاراسمپاتیک هستند.^(۱-۳)

I) استادیار گروه پاتولوژی، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. (**) مولف مسئول

II) دستیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران.

III) متخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران.

بالینی توده‌ای نسبت دار به اندازه 3×2 سانتی‌متر و متحرک وجود داشت. در CT اسکن به عمل آمده در سمت راست گردن درجه‌اتی از enhancement که باعث جابه‌جایی ورید ژوگولار تحتانی شده بود، گزارش شد.

بیمار در تاریخ ۱۶/۹/۷۹ در بخش ENT (گوش؛ حلق و بینی) بیمارستان فیروزگر تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از عمل، نمونه‌ها در دو ظرف جداگانه به بخش آسیب‌شناسی ارسال گردید. ظرف اول حاوی یک توده تومورال به رنگ قرمز - قهوه‌ای با سطح نامنظم و حدود مشخص به اندازه $1 \times 5 \times 2$ سانتی‌متر بود. در سطح مقطع، تومور دارای بافت غیریکنواخت با قوام سفت و رنگ قهوه‌ای تیره بود. نواحی متعدد خون‌ریزی نیز وجود داشت.

ظرف دوم حاوی دو عدد غده لنفاوی ژوگولار راست به اندازه $2 \times 1 \times 5$ سانتی‌متر و $4 \times 1 \times 0$ سانتی‌متر و به رنگ کرم - قهوه‌ای بود. در برش هر دو دارای سطح مقطع غیریکنواخت با قوام نرم به رنگ کرم - خاکستری بودند. در برش‌های میکروسکوپی تهیه شده؛ توموری متشکل از دسته‌های سلولی با نمای غالب nesting or zell ballen بود که طناب‌های سلولی آناستوموز دهنده و شبکه ظریفی از کانال‌های مویرگی در اطراف nest‌ها دیده می‌شد (تصویر شماره ۱).

سلول‌های توموری بیضی شکل و چندوجهی پائومورفیک حاوی سیتوپلاسم اثوزینوفیلیک گرانولر فراوان و هسته هیبریکروم گرد بودند. تجمع‌های سلول‌های تومورال توسط سلول‌های حمایت کننده احاطه شده بود. یک مورد میتوز آتیبیک هم مشاهده شد.

جهت تشخیص بیشتر nesting سلولی و شبکه رتیکولر بین آن‌ها رنگ‌آمیزی اختصاصی رتیکولین نیز انجام شد (تصویر شماره ۲). سلول‌های sastentacular رنگ‌آمیزی ایمونو‌هیستوشیمیایی از نظر ۱۰۰-۵ مثبت بودند (تصویر شماره ۳).

از خصوصیات این تومور می‌توان به سرعت رشد آهسته داشتن، بدون درد بودن و نزدیک بودن آن به زاویه فک تحتانی اشاره نمود. در تعدادی از بیماران علائمی چون فلچ عصبی و ستدرم سینوس کاروتید دیده می‌شود.


ندرتاً پاراگانگلیومای جسم کاروتید دارای عمل کرد می‌باشد^(۵) و باعث افزایش فشار خون می‌شود.^(۶) تشخیص ضایعه تومورال براساس یافته‌های هیستولوژیکی می‌باشد که به صورت تجمع‌های ارگانوئید سلول‌های تومورال است. این سلول‌ها در رنگ‌آمیزی ایمونو‌هیستوشیمیایی برای مارکرهای سلول‌های نورونوادکرین مثبت هستند.^(۷)

در بررسی‌های مختلف کمتر از ۱۰٪ پاراگانگلیوماها رفتار بدخیم دارند.^(۸) تمایز بدخیمی از تومورهای خوش‌خیم ارتباطی با بررسی‌های بافت‌شناسی، فلوسیتومتری و غیره ندارد.^(۹) وجود درگیری غدد لنفاوی اطراف تومور و تهاجم موضعی وسیع و دوردست سلول‌های تومورال معیار بدخیمی تومور می‌باشد.^(۱۰) بزرگ تومور، معیار بدخیمی نمی‌باشد.^(۱۱) تحقیقات نشان می‌دهد که در بیش از ۸۰٪ موارد شایع‌ترین محل تهاجم سلول‌های تومورال غدد لنفاوی اطراف نئوپلاسم می‌باشد.^(۱۲)


درگیری متابستاتیک ریه و استخوان و کبد در موارد کمتری ملاحظه می‌گردد که به طور مستقیم باعث کاهش بقای بیماران مبتلا می‌شود.^(۱۳) در این مقاله ۱ مورد از این بیماری گزارش شده و خلاصه‌ای از بررسی متون در مورد آن آورده شده است.

معرفی بیمار

بیمار ۶۴ ساله‌ای بود که به علت وجود یک توده در سمت راست گردن (زیر زاویه فک تحتانی) که از حدود ۴ ماه قبل رشد آن آغاز شده بود؛ مراجعه نمود. سابقه بیماری خاصی را نکر نمی‌کرد. در معاینه




تصویر شماره ۳- هسته و سیتوپلاسم سلول‌های sastentacular و s-100 مثبت هستند(IHC)




تصویر شماره ۴- کانون متاستاتیک در ناحیه زیر کپسولی غده لنفاوی

برش‌های میکروسکوپی تهیه شده از غدد لنفاوی نشان دهنده وجود یک کانون متاستاتیک تومورال در ناحیه زیر کپسولی غده لنفاوی بزرگتر بود. سلول‌های تومورال، چند وجهی و دارای هیپرکرومازیا و پلثومورفیسم بودند(تصاویر شماره ۴ و ۵).



تصویر شماره ۱- نمای zell ballen از سلول‌های تومورال رنگ‌آمیزی H&E



تصویر شماره ۲- Fram work سلول‌های تومورال رنگ‌آمیزی رتیکولین

در نهایت با توجه به یافته‌های فوق برای بیمار تشخیص پاراگانگلیومای بدخیم(درگیری غدد لنفاوی ناحیه ژوگولار) تایید شد. جهت بیمار ۳۲ جلسه رادیوتراپی انجام شد. ظرف مدت ۸ ماه بعد(۹/۵/۱۰) یعنی آخرین بار مراجعته بیمار؛ حال عمومی وی کاملاً رضایت‌بخش بوده است.

Vincent T.Devita پاراگانگلیومای گردن انجام داده بودند که فقط ۲ مورد پاراگانگلیومای بدخیم با تهاجم به غدد لنفاوی طرفی گردن گزارش نمودند.^(۱۰) Isobek و همکاران در مطالعه ۳۱ بیمار مبتلا به پاراگانگلیوما، رفتار بدخیمی را در کمتر از ۹٪ آن‌ها نشان دادند.^(۱۲)


در حال حاضر نقش مهمی برای هیستولوژی یا فلوسیتومتری در تشخیص بدخیمی و یا خوش‌خیمی پاراگانگلیوما وجود ندارد.^(۷-۹) بررسی Safford S.D. همکاران بر روی ۱۱ مورد پاراگانگلیومای بدخیم بود و متاستاز به غدد لنفاوی اطراف را به عنوان معیار بدخیمی متأثراً باعث کاهش بیان و تأکید نمودند که وجود متاستاز مستقیماً باعث کاهش بقای بیماران می‌شود.^(۱۱)

Padilla و همکاران در سال ۲۰۰۴ موردی را گزارش نمودند که به علت توده گردنبه مراجعه نموده بود. بعد از درمان جراحی و علی‌رغم اندازه کوچک و ظاهر بافت‌شناسی خوب به علت درگیری غدد لنفاوی گردنبه، تومور به عنوان پاراگانگلیومای بدخیم گزارش شد.^(۱۰) C. Sturgeon Isobek درگیری غدد لنفاوی تاحیه‌ای و تهاجم وسیع موضعی و دور دست را به عنوان بدخیمی پاراگانگلیوما مطرح نمودند.^(۱۲) در بررسی P.H. Kann در ۶۹٪ موارد پاراگانگلیومای بدخیم اندازه بزرگتری نسبت به موارد خوش‌خیم داشت.^(۲) Taieb D. و همکاران بزرگی تومور را معیار بدخیمی نمی‌دانند.^(۷)

در گزارشات Isobek, Sturgeon C., Safford S.D., Taieb D. و همکاران درگیری ریه و کبد و استخوان در موارد کمتری ملاحظه شد که دقیقاً در ارتباط با کاهش طول عمر بیماران بود.^(۷) وجود آنپی سلولی و نکروز در lanest، فعالیت میتوزی و تهاجم عروقی معیار قطعی برای رفتار بدخیم تومور نمی‌باشد.^(۱۰) بیمار معرفی شده در مطالعه حاضر مبتلا به پاراگانگلیومای بدخیم بود.

منابع

1- Steven G. Silverberg, Ronald A. Delellis, Williams J. Frable. Principles and practice of surgical pathology and



تصویر شماره ۵- کانون متاستاتیک در ناحیه زیر کپسولی غده لنفاوی با درشت‌نمایی بزرگتر

بحث و نتیجه‌گیری

اولین مورد مبتلا به پاراگانگلیومای جسم کاروتید در سال ۱۸۹۱ marchand توصیف شد.^(۱۴) به علت الگوی ارگانوئید نمای سیتولوژیکی که می‌تواند از اپی‌تیلیالی تا دوکی مقاومت باشد، پاراگانگلیومای جسم کاروتید در تشخیص افتراقی با ضایعات زیر قرار می‌گیرد: کارسینومای مدولاری و هرتل سل تیروئید؛ کارسینومای نورواندوکرین حنجره؛ کانسر متاستاتیک اپیدرموئید؛ همانژیوپری سایتوما و آنژوسارکوما.^(۱۰-۱۲)

با توجه به شرح حال بیمار؛ معاینه؛ محل تومور و نمای ماکروسکوپی و میکروسکوپی می‌توان تشخیص‌های افتراقی را کنار گذاشت. اکثر موارد پاراگانگلیوماها خوش‌خیم می‌باشند.^(۴) بررسی Neumann H.P. و همکاران بر روی ۸۳ مورد پاراگانگلیومای سر و گردن بیان‌گر رفتار بدخیمی در ۷٪ موارد می‌باشد.^(۶)

مطالعه Taieb.D. و همکاران از سال ۱۹۲۸ تا ۲۰۰۲ و نیز Williams J.Frable بر روی بیماران مبتلا به پاراگانگلیوما نشان دهنده رفتار بدخیم در کمتر از ۱۰٪ موارد می‌باشد.^(۱-۷) بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰

cytology. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1997. P. 1551, 2824-6.

2- Kann P.H., Wirkus B, Behr T. Sonographic imaging of benign and malignant paraganglioma. *J Clin Endocrinol Metab.* 2004; 89(4): 1694-7.

3- Rfique M, Bhutta R.A, Muzzafer S. Case report: intra-renal paraganglioma. *Int Urol Nephrol* 2003; 35(4): 475-8.

4- Carroll W, Stenson K, Stringer S. Malignant carotid body tumor. *Head Neck.* 2004; 26(3): 301-6.

5- Stephen S. Sterberg, Donald A. Antonioli, Darryl Carter, Stacey-5 E. Mills, Harold A. Oberman. Diagnostic surgical pathology, 4th ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. P. 628.

6- Neumann HP, Pawlu C, Peczkowska M. Distinct clinical features of paraganglioma associated with SDHB & SDHD gene mutations. *JAMA* 2004; 292(8): 943-51.

7- Taieb D, Sebag F, Hubbard JG. Does Iodine 131(MIBG) Scintigraphy have an impact on the management of sporadic & familial pheochromocytoma. *Clin Endocrinol* 2004; 61(1): 102-8.

8- Maier Woefle M, Brandle M, Komminoth P. A novel succinate dehydrogenase subunit B gene mutation, H132P, Causes familial malignant extrarenal paraganglioma. *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89(1): 362-7.

9- Lupinski RW, Shankar S, Agastian T. Primary cardiac paraganglioma. *Ann Thorac Surg* 2004; 78(3): 43-4.

10- Padilla Roero MJ, Amador Garcia JM, Santiago Moreno F. Malignant neck paraganglioma. *Acta Otorrinolaringol Esp* 2004; 55(8): 395-8.

11- Safford SD, Coleman RE, Gockerma JP. Iodine-131 is an effective treatment for malignant paraganglioma. *Surgery* 2003; 134(6): 956-62.

12- Sturgeon C, Kebebew E. Laparoscopic adrenalectomy for malignancy. *Surg Clin North AM*, 2004; 84(3): 755-74.

13- Isobe K, Yashiro T, Omura S. Expression of the human telomerase reverse transcriptase in paraganglioma. *Endocr J*, 2004; 51(1): 47-52.

14- Marchand F. Beitrage, Zur Kenntiss Der Normalen und athologischen Anatomie der Grandula Carotica and der Nebennieren. *Int Beitr Z Wissen Sch Med festschr R virchow*, 1891; 1: 535-81.

15- Vincent T. Devita, Jr. Samuel Hellman, Steven A. Rosenberg. Cancer principal & paractice of oncology, 6th ed. Philadelphia Lippincott: Williams & Wilkins; 1993. P. 600-3.

A Malignant Paraganglioma of Right Carotid Body: A Case Report

/ // ///
***F. Hashemi, MD** **F. Samiee Rad, MD** **F. Shahraki, MD**

Abstract

The present case report concerns a 64-year-old female who referred with an enlargement mass of right side of neck(submandibular angle) since 4 months ago. Mass resection specimen grossly revealed firm red-brown well-circumscribe mass. Cut sections showed nonhomogeneous tissue with multiple areas of hemorrhage associated with two regional lymph nodes. Microscopic examination mostly exhibited zell ballen pattern with pleomorphic oval to polyhedral tumoral cells which contained eosinophilic granular cytoplasm and hyperchromic nuclei surrounded by sustentacular cells. In subcapsular area of lymph node, a focus of metastatic tumoral cells was also seen. Ultimately, histopathologic diagnosis revealed a very rare malignant paraganglioma of carotid body.

Key Words: 1) Carotid Body 2) Paraganglioma 3) Malignant

I) Assistant Professor of Pathology Department. Firoozgar Hospital. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran. (*Corresponding Author)

II) Pathology Resident. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.

III) Pathologist. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.