

ارتباط مصرف استامینوفن با قند مایع نخاع در تب و تشنج

چکیده

زمینه و هدف: افزایش قند خون و مایع نخاع در تب و تشنج به طور شایع رخ می‌دهد. آزادسازی سریع کورتیزول و آدرنالین پس از تشنج، به عنوان واکنش استرس‌زا، منجر به این افزایش می‌گردد. در طی تب، آزادسازی اینترلوکین ۱ بتا، به عنوان سیتوکین اندوژن پیوژن منجر به مهار آزادسازی انسولین و کورتیزول می‌گردد. این حوادث می‌توانند همراهی میان غلظت قند مایع نخاع و مایع بدن در مطالعه حاضر را شرح دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط مصرف استامینوفن و قند مایع نخاع در تب و تشنج می‌باشد.

روش بررسی: در مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر، مایع نخاع ۶۲ کودک (۳-۱۸ ماه) دچار تب و تشنج آنالیز گردید. متوسط غلظت قند مایع نخاع در کودکانی که ۶ ساعت قبل از تشنج استامینوفن دریافت کرده بودند با گروهی که استامینوفن دریافت نکردند، با استفاده از تست‌های آماری T-student test و Mann-whitney test آنالیز و با هم مقایسه گردید.

یافته‌ها: متوسط قند مایع نخاع در کودکانی که استامینوفن دریافت نکرده اند در مقایسه با گروه دریافت‌کننده استامینوفن، به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر بود. (۸۲±۸) میلی‌گرم در دسی‌لیتر در مقایسه با (۵۳±۴) میلی‌گرم در دسی‌لیتر.

نتیجه‌گیری: غلظت قند مایع نخاع در کودکان دچار تب و تشنج، با مصرف استامینوفن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها: ۱- قند مایع نخاع ۲- استامینوفن ۳- تب و تشنج

*دکتر فهیمه احسانی پور

دکتر مریم اردلان II

تاریخ دریافت: ۱۴/۵/۸۶، تاریخ پذیرش: ۹/۷/۸۶

مقدمه

شدت تب همراهی با افزایش قند مایع نخاع دارد^(۱) از آنجاییکه کودکان تبدار اغلب موارد جهت کنترل تب استامینوفن دریافت می‌کنند، لذا تأثیر آن بر سطح قند مایع نخاع باید مورد ارزیابی قرار گیرد. تاکنون بجز یک تحقیق که آن هم در ایران انجام شده است، تحقیق دیگری در جهان انجام نشده است. مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر با هدف بررسی اثر استامینوفن بر روی قند مایع نخاع انجام گرفته است.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی-تحلیلی ۷ ساله که بر روی کودکان ۳-۱۸ ماه بستری در بخش کودکان بیمارستان

تب و تشنج در ۳-۴٪ کودکان رخ می‌دهد.^(۱) توصیه می‌گردد در این موارد بخصوص در اولین حمله تب و تشنج، بذل مایع نخاع جهت رد عفونت مغزی انجام گردد. در آنالیز مایع نخاع، وجود باکتری، گلبول سفید، کاهش قند و افزایش پروتئین حائز اهمیت می‌باشد. به طور شایع، افزایش قند خون و مایع نخاع در تب و تشنج رخ می‌دهد.^(۲) متعاقب استرس ناشی از تشنج، آزادسازی سریع کورتیزول و آدرنالین منجر به افزایش غلظت قند می‌گردد.^(۳) دلیل افزایش قند مایع نخاع در طی تب، آزادسازی اینترلوکین I می‌باشد، اینترلوکین I، سیتوکین آندوژن است که از طریق مهار انسولین^(۴) و ترشح کورتیزول^(۱) منجر به افزایش قند مایع نخاع می‌گردد. برخی تحقیقات نشان داده‌اند،

این مقاله خلاصه‌ای از پایان‌نامه خانم دکتر مریم اردلان در مقطع پزشکی عمومی به راهنمایی خانم دکتر فهیمه احسانی پور می‌باشد.

I) استادیار و فوق تحصیلی بیماری‌های عفونی کودکان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، تهران، ایران (* مولف مسؤول). II) پژوهش عمومی.

(٪۲۳/۸)، در گروه B، ۲۸ نفر (٪۴/۴) و در گروه C، ۲۰ نفر (٪۳۱/۷) بود. جدول شماره ۱ تفاوت آماری متوسط سطح قند مایع نخاع را در ۳ گروه سنی A، B و C با تست آماری Mann-whitney نشان می‌دهد.

جدول شماره ۱- متوسط قند مایع نخاع در ۳ گروه سنی

سن (ماه)	صرف استامینوفن ثبت(Y) و منفی(N) (N)	متوسط قند مایع نخاع mg/dl	Pvalue
۳-۸	Y: ۱۶ (٪۹۲/۳)	۵۶/۷	.۰/۱۳۲
	N: ۱ (٪۶/۷)	۷۲	
۹-۱۲	Y: ۱۸ (٪۶۴/۳)	۵۶/۶	.۰/۰۰۰۱
	N: ۱۰ (٪۳۵/۷)	۸۳/۲	
۱۴-۱۸	Y: ۱۲ (٪۶۰)	۵۷/۰۸	.۰/۰۰۰۱
	N: ۸ (٪۴۰)	۸۱/۷۵	

غلظت قند مایع نخاع در کل بیماران $63/4 \pm 12/5$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. اختلاف آماری معناداری از نظر سنی در سطح قند مایع نخاع در دو گروه I و II وجود نداشت. میانگین قند مایع نخاع در گروه I، 82 ± 8 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه II، 53 ± 4 میلی‌گرم در دسی‌لیتر Mann-whitney بود، این تفاوت بر اساس تست آماری معنادار بود ($P=0/0001$). البته در گروه A (۳-۸ ماه) نیز قند مایع نخاع در دریافت‌کنندگان استامینوفن پائین‌تر بود، ولیکن در این گروه این رابطه از نظر آماری معنادار نبود. که دلیل آن می‌تواند تعداد کمتر بیماران این گروه باشد. از نظر جنسی تفاوت آماری معناداری در دو گروه مشاهده نگردید. (جدول شماره ۲)

جدول شماره ۲- متوسط قند مایع نخاع بر حسب جنس

صرف استامینوفن ثبت(Y) و منفی(N) (N)	جنس	متوسط قند مایع نخاع mg/dl	Pvalue
Y	پسر: ۲۲ (٪۵۰)	۵۶/۲۷	.۰/۱۹۶
	دختر: ۲۲ (٪۵۰)	۵۴/۴	
N	پسر: ۱۴ (٪۷۳/۷)	۸۲	.۰/۸۲۳
	دختر: ۵ (٪۲۶/۳)	۸۲	

حضرت رسول اکرم(ص)، که با اولین تب و تشنج ساده در طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۲ بستری شده بودند انجام گرفت، اطلاعات تمامی کودکانی که با تب و تشنج تحت بررسی آنالیز مایع نخاع قرار گرفتند و معیارهای ورود به تحقیق را داشتند در پرسشنامه ثبت گردید؛ این اطلاعات شامل سن و جنس و میزان قند مایع نخاع به میلی‌گرم در دسی‌لیتر و سابقه مصرف استامینوفن در ۶ ساعت قبل از تشنج بود. لازم به ذکر است معیارهای خروج از تحقیق شامل وجود پلاآسیتوزیس مایع نخاع و کشت یا اسپیر مثبت مایع نخاع و سابقه ترومای اخیر، بیماری متابولیک، صرع، سابقه تشنج قبلی و سوء تغذیه و مصرف هر نوع دارو بجز استامینوفن در ۶ ساعت گذشته و تشنج کمپلکس بود. در صورت وجود هر یک از موارد ذکر شده بیمار از مطالعه حذف می‌گردید. کودکان وارد شده در مطالعه به دو گروه I و II تقسیم شدند. گروه I شامل کودکانی بودند که سابقه مصرف استامینوفن در ۶ ساعت قبل از تشنج را نداشتند و گروه II سابقه مصرف استامینوفن در ۶ ساعت قبل از تشنج را داشتند. به طور متوسط نمونه‌گیری مایع نخاع ۲ ساعت پس از تشنج انجام شد. غلظت قند مایع نخاع با متدهای *o-toluidine* اندازه‌گیری شد. سطح قند مایع نخاع در کودکان دو گروه با SPSS11/5 با استفاده از تست‌های آماری chi-square، T-test و Anova آنالیز گردید.

یافته‌ها

در مجموع ۶۳ کودک شرایط ورود به مطالعه را سنی بیماران به ۳ گروه سنی بر حسب ماه (۳-۸)، داشتند. ۲۷ کودک (٪۴۲/۹) دختر و ۳۶ کودک (٪۵۸/۱) پسر بودند. میانگین سنی بیماران 11 ± 4 ماه بود. از نظر (۹-۱۲ A)، (۱۴-۱۸ B)، (۰-۷۰) C تقسیم شدند. در مجموع ۴۴ کودک (٪۷۰) در گروه دریافت‌کننده استامینوفن (II) و ۱۹ کودک (٪۳۰) در گروه بدون سابقه استامینوفن (I) قرار گرفتند. فراوانی کودکان در گروه A، ۱۵ نفر

گروه بدون سابقه مطالعه حاضر نیز میانگین قند مایع نخاع در گروه بدون سابقه مصرف استامینوفن (گروه I)، 82 ± 8 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه با سابقه مصرف استامینوفن (گروه II)، 52 ± 4 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود، این تفاوت بر اساس تست آماری Mann-whitney معنادار بود ($P=0/0001$). بر اساس سن نیز در همه گروه‌های سنی بجز گروه A، گروه دریافت‌کننده استامینوفن سطح قند پائین‌تری داشتند، در گروه A ($3-8$ ماه) نیز قند مایع نخاع در دریافت‌کنندگان استامینوفن پائین‌تر بود، ولیکن در این گروه این رابطه از نظر آماری معنادار نبود که دلیل آن باید در تحقیقات گستردere تر مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تعداد کمتر بیماران در این گروه می‌توانند از علل آن باشد. از محدودیت‌های این مطالعه، عدم ثبت قند خون قبل از انجام بذل مایع نخاع بود که البته با توجه به اینکه قند مایع نخاع دو گروه مقایسه شده، مبتلا به تب و تشنج بودند، بنابراین بررسی قند خون الزامی نبود، ولیکن با توجه به گذشته‌نگر بودن تحقیق برخی از پرونده‌ها فاقد پاسخ قند خون بود و برخی دیگر زمان انجام آزمایش خون ثبت نگردیده بود.

نتیجه‌گیری

صرف استامینوفن با مکانیسم کنترل تب می‌تواند سطح قند مایع نخاع را کاهش دهد.

بحث

قند مایع نخاع یکی از معیارهای مهم در تفسیر و آنالیز مایع نخاع می‌باشد. گلوکز از طریق انتشار ساده و از طریق شبکه کوروئید وارد مایع مغزی نخاعی می‌گردد^(۱) در تحقیقات گوناگون مشخص شده است نه تنها تشنج منجر به افزایش قند مایع نخاع از طریق افزایش کورتیزول و آدرنالین می‌گردد^(۲) بلکه تب نیز منجر به افزایش قند مایع نخاع می‌گردد.^(۴) دلیل افزایش قند مایع نخاع در طی تب، آزادسازی اینترلوکین I می‌باشد؛ اینترلوکین I، سیتوکین آندوژنی است که از طریق مهار انسولین و ترشح کورتیزول منجر به افزایش قند مایع نخاع می‌گردد.^(۵) از آنجائیکه میزان قند مایع نخاع از اهمیت خاصی برخوردار است و اکثر این بیماران جهت کنترل تب از داروهای ضد تب بخصوص استامینوفن استفاده می‌کنند، لذا تأثیر این دارو بر روی قند مایع نخاع حائز توجه می‌باشد، متاسفانه در این زمینه جز یک تحقیق که در سال ۲۰۰۳ توسط دکتر محمودی و همکاراش در ایران انجام گرفت، تحقیق دیگری صورت نگرفته است.^(۱۰) در تحقیق دکتر محمودی 82 کودک در گروه بدون سابقه مصرف استامینوفن 6 ساعت قبل تشنج و 24 کودک در گروه با مصرف استامینوفن قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق نشان داد در کوکان بدون سابقه مصرف استامینوفن سطح قند مایع نخاع به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از

فهرست منابع

1- Bergman I. Febrile seizure. In: Behrman Kligman. Nelson Text Book of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: WB Saunders CO;2004. p. 795-9.

2- Rutter N, Smales ORC. Calcium, magnesium and glucose levels in blood and CSF of children with febrile convulsions. Arch Dis Child 1976; 51: 141-43.

3- Wallace S. Investigation at presentation. In: Wallace S, editor. The Child with Febrile Seizures. London: Wright;

1988. P. 70-80.

4- Reimers JI. Interleukin-I beta induced transient diabetes mellitus in rats. A model of the initial events in the pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus? Dan Med Bull 1998; 45: 157-80.

5- Dinarello CA. Biology of interleukin-1. FASEB J 1988; 2: 108-15.

6- Lange CH, Cooney R, Vary TC. Central interleukin-1

partially mediates endotoxin-induced changes in glucose metabolism. Am J Physiol 1996; 271: E309-16.

7- Kiviranta T, Airaksinen EM, Tuomisto L. The role of fever on cerebrospinal fluid glucose concentration of children with and without convulsions. Acta Paediatrica 1995; 84: 1276-79.

8- Fishman RA. The glucose transporter protein and glycopenic brain injury. N Engl J Med 1991; 325: 731-32.

9- De Vivo DC, Trifiletti RR, Jacobson RI, Ronen GI. Defective glucose transport across the blood-brain barrier as a cause of persistent hypoglycorrachia, seizures, and developmental delay. N Engl J Med 1991; 325: 703-9.

10- Mohammadi M, Mohebbi MR , Naderi F. CSF glucose concentration in infants with febrile convulsions and the possible effect of acetaminophen. Indian Pediatrics 2003; 40: 1183-86.

Study of the Correlation between Acetaminophen Consumption and CSF Glucose in Febrile Convulsion

*F. Ehsanipoor, MD^I M. Ardalan, MD^{II}

Abstract

Background & Aim: Hyperglycemia and hyperglycorrachia are common associations of febrile seizures. Rapid release of cortisol and adrenaline after seizures as a stress reaction induces elevated glucose concentration. During fever release of interleukin-1 beta, an endogenous pyrogenic cytokine, inhibits insulin release and stimulates the secretion of cortisol. This may explain the correlation between CSF glucose concentration and body temperature in the present report. The purpose of our study was to assess the correlation between acetaminophen consumption and CSF glucose in febrile convolution.

Patients and Method: In this cross-sectional analytic study ,we analyzed CSF samples taken from 63 children with febrile convolution whose ages ranged from 3 to18 months. Comparisons between the mean CSF glucose concentrations in the children who had taken and not taken acetaminophen within 6 hours before convolution were made using Students' t-test and Mann-whitney test.

Results: CSF glucose levels were significantly higher ($P =0. . 0001$) in children who had not taken acetaminophen ($82\pm8 \text{ mg/dL}$, $n =$) as compared with children who had taken acetaminophen ($53\pm4 \text{ mg/dL}$, $n=$).

Conclusion: The use of acetaminophen decreases CSF glucose concentration in febrile convulsive children.

Key Words: 1) CSF Glucose 2) Acetaminophen 3) Febrile Convulsion

This article is an abstract of Ms. Ardalan's thesis advised by Dr. Ehsanipoor in partial fulfillment of a medical doctor's degree.

I) Assistant Professor of Pediatric Infectious Diseases. Rasool-e-Akram Hospital. Niayesh St., Sattarkhan Ave., Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran. (*Corresponding Author)

II) General Practitioner.