

بررسی مروری اهمیت حلقه کینولون در دستیابی به داروهای ضد مالاریای جدید

صفورا کریمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی دارویی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

* آفر تحقیقی: استادیار، بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، استیتو پاستور ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول). atahghighi2009@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۱/۱۴

تاریخ دریافت: ۹۴/۸/۱۷

چکیده

بیماری عفونی حاد و مزمن مالاریا توسط انگل تک یاخته‌ی درون سلولی و اجباری از جنس پلاسمودیوم و با گرث پشه‌ی آنوفل آلوهه منتقل می‌شود. برطبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر مالاریا در ۱۰۴ کشور در حال انتقال است و به علت نقص در برنامه‌ی مبارزه با این بیماری، کنترل و حذف آن با مشکل مواجه شده است. یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه برنامه‌ی حذف مالاریا، مقاومت انگل به داروهای مالاریایی رایج و ارزان قیمت می‌باشد که لزوم دستیابی به یک داروی جایگزین با ساختار جدید و مکانیسم عمل متفاوت را اجتناب ناپذیر می‌نماید. در این راستا، گروه‌های تحقیقاتی با تمرکز بر روی حلقه‌های هتروسیکل، با هدف دستیابی به داروهای جدید و دارای مکانیسم عمل متفاوت با داروهای رایج، مشتقات گوناگونی را سنتز و فعالیت ضد مالاریایی آن‌ها را بر روی مراحل مختلف رشد انگل بررسی نموده‌اند. در این میان ترکیبات حاوی حلقه‌ی کینولون با استخلاف‌های گوناگون در موقعیت‌های متفاوت حلقه، تاثیر مناسبی بر روی مراحل خونی، کبدی و جنسی انگل نشان دادند. در تیجه با در نظر گرفتن تمایل این ترکیبات بر روی مراحل مختلف رشد انگل مالاریا، به عنوان ترکیب راهنمای دستیابی به داروهای ضد مالاریایی جدید با مکانیسم عمل متفاوت می‌توانند مورد ارزیابی‌های بیشتر قرار گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله‌ی مروری به معرفی تعدادی از مشتقات کینولون با اثر ضد مالاریا پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: پلاسمودیوم فالسیپاروم، ضد مالاریا، حلقه‌ی کینولون، اندوچین، دکوکوئنات

مقدمه

وبواکس، پلاسمودیوم اواله، پلاسمودیوم مالاریه و پلاسمودیوم ناولزی. کشنده‌ترین گونه‌ی مالاریا، پلاسمودیوم فالسیپاروم می‌باشد. مرگ و میر ناشی از مالاریای مغزی پلاسمودیوم فالسیپاروم به‌ویژه در کودکان زیر پنج سال، بالغین حساس و زنان باردار، دلیل اصلی مرگ و میر در این اقشار حساس به حساب می‌آید (۴).


مالاریا در زمرة بیماری‌های خطرناکی می‌باشد که در برنامه کنترل و ریشه‌کنی سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۵۰ قرار دارد. امروزه ابتلا به این بیماری به دلیل بروز مقاومت به داروها و حشره کش‌های موجود رو به افزایش است و دستیابی به داروهای موثر جدید که منجر به درمان رادیکال گردند یا در پیشگیری موثر باشند و منجر به کنترل اپیدمی گردند جزء برنامه‌های سازمان بهداشت جهانی در حذف و ریشه کنی مالاریا می‌باشد. متأسفانه یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت در برنامه ریشه کنی مالاریا تا به امروز، در

مالاریا بیماری عفونی حاد یا مزمنی است که توسط انگل تک یاخته‌ای از جنس پلاسمودیوم ایجاد می‌شود. این بیماری در بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکایی بومی بوده و با وجود کنترل بیماری در سال‌های اخیر، بنا به دلایل مختلف از جمله: تعدد ناقلین، مقاومت ناقلین به حشره‌کش‌ها، مقاومت انگل پلاسمودیوم به داروهای موجود، روند گرم شدن کره‌ی زمین، فصل انتقال طولانی و در نهایت عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای درگیر، همچنان این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی در سطح جهانی باقی مانده است (۱-۳). بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۹۸ میلیون نفر مورد ابتلا به بیماری مالاریا و ۵۸۴۰۰۰ مورد مرگ در سال ۲۰۱۳ رخ داده است (۴). پنج نوع انگل مالاریا در انسان ایجاد بیماری می‌کنند که عبارتند از: انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم، پلاسمودیوم


شدید گردد.

داروی موثر کلروکین به عنوان یک شیزونتیسید خونی قوی از ۱۹۴۰ میلادی در درمان و پیشگیری مalaria در تمامی انواع بیماری به کار برده شد؛ اما به دلیل بروز مقاومت در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی کاربرد آن برای پلاسمودیوم فالسیپاروم کاهش یافته است. دلیل این مقاومت زود هنگام را ناشی از مونوتراپی، فشار دارویی حاصل از استفاده مکرر و ناجای کلروکین، مدت زمان طولانی استفاده از آن و دوزهای بالای مصرفی در پروفیلاکسی می‌دانند. امروزه مقاومت به کلروکین را در پلاسمودیوم فالسیپاروم ناشی از جهش در ژن‌های ناقلین حیاتی PfCRT و PfMDRT می‌دانند که سبب کاهش غلظت کلروکین در بافت هدف می‌گردند (۵). با بروز مقاومت کراس داروهای آمودیاکین و مفلوکین با کلروکین که همگی از دسته مشتقات ضد مalaria با هسته‌ی فعال کینولین می‌باشند بر مشکلات فوق اضافه گردید (شکل ۲). از طرفی، داروی شیزونتیسید بافتی پریماکین و شیزونتیسید خونی آرتیمیزینین با اثر گامتوسیدال در کنترل اپیدمی اهداف ایده‌آلی در حذف malaria محسوب می‌گرددند (شکل ۲)؛ اما متأسفانه مقاومت نسبت به آرتیمیزینین و تولرانس نسبت به پریماکین نیز در حال افزایش است و دستیابی به داروهای موثر جدید را امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. بروز معضلات فوق، محققین را بر آن داشت تا آنالوگ‌های جدیدی را با مکانیسم عمل متفاوت


اولین قدم مقاومت انگل به داروی کلروکین به عنوان ارزانترین و بهترین داروی ضد مalaria ای و مقاومت به حشره کش‌های ارزان قیمت مانند د.د.ت می‌باشد. همچنین در طی سال‌های آتی، انگل‌ها به‌ویژه پلاسمودیوم فالسیپاروم به سایر داروهای ضد مalaria مقاوم شده‌اند و در نبود یک داروی موثر جدید، کنترل این بیماری را با مشکل جدی مواجه نموده‌اند. همین دلایل، لزوم دستیابی به یک داروی جایگزین را امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. در طی چرخه‌ی زندگی انگل، پشه‌ی آنوفل، اسپوروزوئیت‌های پلاسمودیوم را به انسان تلقیح می‌کند که آغاز کننده‌ی عفونت انسانی هستند (شکل ۱) (۳). این اسپوروزوئیت‌ها از طریق جریان خون وارد سلول‌های کبدی می‌شوند. در کبد پس از بلوغ شیزونت‌های نسجی، مروزوئیت‌ها آزاد و وارد جریان خون و پس از آن وارد گلبول قرمز می‌شوند. سپس با تشکیل حلقه، تبدیل به تروفوزوئیت و در نهایت شیزونت خونی می‌شوند. در ادامه، با پاره کردن گلبول‌های قرمز، شیزونت‌ها وارد جریان خون شده و سایر گلبول‌های قرمز را آلوده می‌کنند. تعدادی از این شیزونت‌های خونی تبدیل به گامتوسیت می‌گردند. با تغذیه‌ی پشه از خون انسان آلوده، سلول‌های جنسی به بدن پشه وارد شده و چرخه‌ی زندگی انگل آغاز می‌گردد. تنها انگل‌های داخل اریتروسیت موجب بیماری بالینی می‌شوند. چرخه‌های تکراری عفونت می‌تواند با آلوده ساختن تعداد زیادی از اریتروسیت‌ها، منجر به بیماری



شکل ۱- چرخه‌ی زندگی انگل مalaria (<http://jcb.rupress.org/content/198/6/961/F1.large.jpg>)



شکل ۲- داروهای ضد مالاریایی رایج موثر بر روی مراحل خونی و کبدی انگل مalaria




شکل ۳- ساختار کینولونو آنالوگ‌های آن

هیدروکسی کینولون (شکل ۳) به عنوان الگوی دیگری جهت سنتز آنالوگ‌های جدید کینولون مورد استفاده قرار گرفتند (۱۰). با استخلاف گروه‌های آромاتیک در ناحیه ۲ حلقه‌ی هیدروکسی کینولون به ترکیبات موثری در شرایط درون‌تنی و برون‌تنی بر علیه مalaria دست یافتند (۱۲-۱۰). در ادامه، فعالیت ضد malaria ایی ترکیباتی با ساختار ۳-کربوکسی کینولون (شکل ۳) و تحقیقات بر روی این ساختار به داروی موثر دکوکوینات (DQ) (Decoquinate) (شکل ۱۱) (۶) با فعالیت چشمگیر بر روی مراحل مختلف انگل منجر گردید (۱۷-۱۳).

معرفی ساختار کینولون
کینولون یا ۴-هیدروکسی کینولین، ساختار مشترک در آنتی‌بیوتیک‌های کینولونی می‌باشد. تعدادی از مشتق‌ات کینولون، سنتر و

طراحی و سنتز نمایند. در یکی از راهکارها، حلقه‌ی کینولین با سایر حلقه‌های هتروآروماتیک تعویض و آنالوگ‌های جدیدی سنتز و تاثیر این ترکیبات جدید بر روی انگل مalaria در شرایط درون‌تنی و برون‌تنی ارزیابی گردید. یکی از این ساختارهای هتروآروماتیک فعال حلقه کینولون می‌باشد (شکل ۳). ترکیباتی دارای حلقه‌ی کینولون مانند اندوچین (Endochin) (۱) (شکل ۴) بر روی انگل مalaria موثر نشان دادند (۶). عدم فعالیت این ترکیب در شرایط درون‌تنی محققان را بر آن داشت تا با اعمال تغییراتی در ساختار آن به مشتق‌ات موثرتری دست یابند. در این راستا جابجایی استخلاف‌های آروماتیک اندوچین در ناحیه‌ی ۳ با استخلاف‌های آروماتیک و استخلاف اتم‌های هالوژن در ناحیه‌ی ۵ یا ۶ حلقه منجر به تقویت اثر ضد malaria در این مشتق‌ات گردید (۷-۹). همچنین ترکیباتی با ساختار ساده‌ی ۱-



شکل ۴ - ساختار ترکیبات ۱ - ۴ (۹-۷)


ترکیب راهنما (Lead compound) انتخاب شد و آنالوگ‌های متنوعی از آن توسط محققین سنتز و علیه انگل مalaria ارزیابی شدند (شکل ۴). وینتر (Winter) و همکارانش برخی از آنالوگ‌های اندوچین را اپتیمایز کردند. یکی از موثرترین ترکیبات ELQ-121 (۲) با استخلاف‌های فلئور در موقعیت‌های ۵ و ۷ حلقه‌ی کینولون می‌باشد. این ترکیب با IC₅₀ = ۰/۱ nM علیه سویه‌های D6 (سویه حساس به کلروکین) و Dd2 (سویه مقاوم به کلروکین) پلاسمودیوم فالسیپاروم، از اندوچین با IC₅₀ = ۴ nM بر علیه این دو سویه موثرتر نشان داد. مزیت دیگر این ترکیب، پایداری آن در مقابل آنزیم‌های CYP450 می‌باشد (۲۳).

نیلسن (Nilsen) و همکارانش برخی از مشتقان کینولون-۳-دی‌آریل اتر را سنتز کردند و ترکیب ELQ-300 (۳) با استخلاف اتم کلر در موقعیت ۶ و استخلاف ۴-تری‌فلورو‌متوكسی دی‌فنیل اتر در موقعیت ۳ حلقه‌ی کینولون به جای زنجبیر هپتیل نرمال در اندوچین، علاوه بر پایداری متابولیکی با IC₅₀ = ۱/۷ nM علیه سویه IC₅₀ = ۱/۸ nM (سویه مقاوم به کلروکین) و W2 علیه سویه TM90-C2B (سویه مقاوم به آتواکون) در مقایسه با کلروکین (۱۲۶ nM) و TM90-IC₅₀ = ۹۶/۲ nM علیه سویه های W2 و C2B (قدرت خیلی بالاتری به نمایش گذاشت (۷)). این ترکیب همچنین قدرت بالایی را در غلظت II nM با توقف کامل توسعه‌ی مراحل I و IV گامتوسیت‌ها نشان داد. ترکیب ELQ-300 (۳) همچنین با IC₅₀ = ۷۹/۱ nM علیه مرحله IV گامتوسیت‌ها فعال می‌باشد. در مطالعات درون تنی

اثرات گوناگون ضد سرطان (۱۸)، ضد ویروس (۱۹)، ضد باکتری (۲۰) و آنتی اکسیدان (۲۱) نشان داده‌اند. تاثیر ترکیبات حاوی حلقه هتروسیکل کینولون با اثر ضد باکتری توسط تعدادی از گروه‌های تحقیقاتی بر روی انگل مalaria مورد ارزیابی قرار گرفته و بسیاری از این مشتقان تاثیر بسیار خوبی را بر علیه مراحل متفاوت خونی، کبدی و گامتوسیت انگل به نمایش گذاشته‌اند (۲۲). این طور به نظر می‌رسد که این ترکیبات دارای مکانیسم عمل متفاوتی در مقایسه با داروهای ضد مalaria می‌باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و اهمیت ارائه‌ی کارهای تحقیقاتی انجام شده به صورت مقالات مروری (۲۳)، در این مقاله به معروف تعدادی از ترکیبات حاوی حلقه‌ی کینولون و موثر بر علیه Malaria پرداخته می‌شود.

اندوچین و آنالوگ‌های آن

فعالیت اندوچین ترکیبی با ساختار کینولونی در سال ۱۹۴۸ علیه Malaria مکیان (Avian malaria) مطرح شد (۶). این ترکیب برروی هر دو مرحله خونی و کبدی انگل موثر بود. تحقیقات بیشتر نشان داد که اندوچین با مکانیسم عمل متفاوت از داروهای ضد Malaria رایج بر روی CYPbc1 انگل تاثیر می‌گذارد (۲۰). کمپلکس مطالعات درون تنی بر روی Malaria انسانی، غیر فعال بودن این ترکیب را تایید کرد. تحقیقات نشان داد که این ترکیب به آسانی توسط آنزیم‌های CYP450 متابولیزه و غیرفعال می‌شود (۲۴-۲۵). با این حال اندوچین (۱) به عنوان



شکل ۵ - ساختار ترکیبات ۵ - ۸ (۱۰ - ۱۲)

زنگیری موقعیت ۳ با بخش آروماتیک بر روی بهبود فعالیت ضدمالاریایی این مشتقان تاثیر گذاشته است (شکل ۴).


ترکیب هیدروکسی-۲-دودسیل-۴- (۱)-هیدرو)-کینولون، HDQ (۵) یک ترکیب مهارکننده‌ی چند منظوره محسوب می‌گردد که با ubiquinone NADH: فعال آنزیم اکسیدوردکتاز (Single target) مهارکننده‌ی تک منظوره شروع می‌باشد (شکل ۵). مصرف چنین ترکیباتی، شروع مقاومت دارویی را به تاخیر می‌اندازد (۱۰). با داشتن این مزایا، HDQ توسط محققین به عنوان یک ترکیب راهنمای دیگر منظور گردید. در نتیجه آنالوگ‌های گوناگونی از آن سنتز شدند که در ادامه به تعدادی از مهمترین این آنالوگ‌ها اشاره می‌شود.

با جایگزینی (تری فلورو متوكسی) بنزیل به جای دودسیل نرمال در موقعیت ۲ ترکیب HDQ به ترکیب فعال-2-68CK-2 (۶) دست یافتند. مطالعات برون تنی این ترکیب، IC₅₀ = ۳۱ nM (۷) علیه سویه 3D7 (سویه حساس به کلروکین) پلاسمودیوم فالسیپاروم و مطالعات درون تنی در غلظت ۲۰ mg/kg حذف کامل انگل‌های پلاسمودیوم برگئی در موش را نشان دادند. با توجه به فعالیت مناسب ترکیب CK-2-68، پیش داروی (۷) این ترکیب به فرم فسفاته در موقعیت ۱ حلقه کینولون نیز تهیه شد. در بررسی فعالیت

علیه پلاسمودیوم یوئلی (Plasmodium Yoelii) EC₅₀ = ۰.۰۲ mg/kg/day نشان داد و در دوز ۰/۳ mg/kg/day در مدت ۳۰ روز بعد از آلودگی طور کامل محو کرد. مهمترین نکته در مورد این ترکیب، عدم مقاومت کراس با آتوواکون و انتخاب‌پذیری بالا برای کمپلکس تنفسی انگل (Parasite respiratory bc1 complex) (bc1) با SI ≥ ۲۰۰۰ می‌باشد. با توجه به محاسن ذکر شده، این ترکیب تحت فرمولاسیون برای بررسی در فازهای کلینیکی قرار دارد (۸).

لاکرو (Lacrue) و همکارانش، برخی آنالوگ‌های کینولون را سنتز و اثر آن‌ها را بر روی مرحله‌ی کبدی در پلاسمودیوم برگئی بررسی کردند. در آنالوگ P4Q-158 (۴) در موقعیت ۶ حلقه‌ی کینولون اتم کلر و در موقعیت ۳ این حلقه استخلاف تری فلورو تولوئن، جایگزین استخلاف هپتیل نرمال در اندوچین شده است. بررسی فعالیت برون تنی این ترکیب با IC₅₀ = ۳۰/۷ nM علیه مرحله کبدی انگل پلاسمودیوم برگئی نشان دهنده‌ی فعالیت ضد مالاریایی قوی این ترکیب می‌باشد. از طرفی بررسی فعالیت درون تنی این ترکیب علیه مرحله کبدی پلاسمودیوم (Survival rate) برگئی در دوز ۱۰ mg/kg، میزان بقای در بالاتر از ۶۰٪ را در مقایسه با موش‌های درمان نشده نشان داد (۹). مشخص است که استخلاف هالوژن در موقعیت ۵ یا ۶ حلقه‌ی کینولون در اندوچین و جابجایی استخلاف

HDQ، مسئول افزایش فعالیت ضد مalaria در این ترکیبات می باشد (شکل ۵).
 ترکیب ICI56-780 (۹) دارای ساختار ۳-کربوکسی کینولون (شکل ۶) با فعالیت ضد مalaria، محققین را بر آن داشت تا بر روی مشتقان کربوکسیل کینولون‌ها به عنوان داروهای جدید ضد Malaria متمرکز شوند (۱۳). Zhang (Zhang) و همکارانش با مشتق سازی از این ترکیب به آنالوگ (۱۰) با استخلاف متوكسی فنیل در موقعیت دو در حلقه‌ی کینولون دست یافتند. این ترکیب IC50 = ۰/۳۱ μM علیه سویه K1 (سویه مقاوم به کلروکین) و IC50 = ۰/۱۰ μM علیه سویه 3D7 پلاسمودیوم فالسیپاروم را به نمایش گذاشت (۱۴). Dacruz (Dacruz) و همکارانش با روش غربالگری screening (به داروی آنتی کوکسیدی دکوکوینات DQ (۱۱) به عنوان ماده موثر بر روی مراحل کبدی پلاسمودیوم فالسیپاروم دست یافتند. نکته جالب توجه این ترکیب، تاثیر آن بر روی مراحل مختلف انگل Malaria در شرایط برون تنی (با nM IC50 = ۲/۶) بر روی مرحل کبدی، IC50 = ۱۰ nM بر روی مرحله خونی و IC50 = ۳۶ nM بر روی مرحله جنسی) می باشد (۱۵). با چنین اثر بخشی، ترکیب DQ ابزارهای لازم بنیاد MMV را برای دستیابی به داروهای نسل بعدی جهت ریشه کنی Malaria دارا می باشد (۱۶). از محسن دیگر این ترکیب می توان به تاثیر آن بر روی کمپلکس bc1



شکل ۶- ساختار ترکیبات ۹- ۱۳ و ۱۵-۲۶

برعلیه میکروگامتوسیت‌های پلاسمودیوم فالسیپاروم، هر دوی این ترکیبات IC50 ~ ۱۰ nM را به نمایش گذاشتند (۱۰-۱۲). این ترکیبات همچنین به صورت موثری آنزیم اکسیدورکتاز NADH:ubiquinone پلاسمودیوم فالسیپاروم را با IC50 = ۱۶ nM مهار می کنند. Nixon (Nixon) و همکارانش آنالوگ‌های دیگری از HDQ را معرفی کردند. ترکیب SL-2-64 (۸) با استخلاف ((۴-تری فلورو متوكسی) فنیل) پیریدین در موقعیت ۲ حلقه‌ی کینولون فعالیتی مشابه با برخی داروهای ضد Malaria را راچ علیه سویه 3D7 پلاسمودیوم فالسیپاروم نشان داد. مطالعات درون تنی این ترکیب در مدل موشی با سویه 3D7 ED50 = ۳/۳ mg/kg و مشابه با ED50 = ۳/۱ mg/kg فعالیت درون تنی آرتمنیتر با ED50 در بر روی همان سویه را نشان داد. حضور حلقه پیریدین در SL-2-64 منجر به افزایش حلایت آبی و کاهش لیپوفیلیسیتی در این ترکیب در مقایسه با آنالوگ‌های CK-2-68 (۶) و پیش داروی آن (۷) می گردد. با توجه به نتایج مناسب حاصل شده برای ترکیب ۶-64، این آنالوگ در Medicines for Malaria Venture (MMV) (لیست شده است (۱۰). مطمئناً استخلاف متیل در موقعیت ۳ حلقه‌ی هیدروکسی کینولین و جابجایی استخلاف آلیفاتیک موقعیت ۲ با گروه آروماتیک در مقایسه با داروی اصلی

معرفی ترکیبات جدید موثر بر علیه مالاریا بعضاً با مکانیسم عمل متفاوت با داروهای رایج پرداخته می شود. اهمیت حضور حلقه های کینولون در ترکیبات ضد میکروب فلورو کینولونی بر کسی پوشیده نیست. به کارگیری هسته کینولون توسط گروه های تحقیقاتی در سنتز ترکیبات گوناگون نیز مورد استفاده قرار گرفت و فعالیت های ضد باکتری، ضد سرطان، ضد ویروس، ضد انگل و ... آن به اثبات رسید. تحقیقات اخیر بر روی فعالیت ضد مالاریایی هسته کینولون نشان داد که برخی از مشتقات آن تاثیر قوی بر روی مراحل مختلف انگل مالاریا، شامل مراحل خونی، کبدی و جنسی دارند. برخی از این ترکیبات موثر، مکانیسم عمل متفاوتی در مقایسه با داروهای رایج دارند. با توجه به معضل مقاومت دارویی، محاسن هسته کینولون و نتایج مثبت حاصل، می توان به دستیابی یک داروی موثر جدید در برنامه ریشه کنی مالاریا امیدوار بود. البته به شرط اینکه بر روی حلالیت پایین مشتقات کینولون و ناپایداری متابولیکی آن متمن کر شده و این مشکل را رفع کرد.

منابع

- WHO: World Malaria Report 2013. Geneva: World Health Organization; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/report/en/). Date of access: 19.03.2014).
- Shetty P. The numbers game. *Nature*, 2012;484: 14–15.
- Na-Bangchang K, Karbwang J. Current status of malaria chemotherapy and the role of pharmacology in antimalarial drug research and development. *FundamClinPharmacol*; 2009.23: 387–409.
- Guerra CA, Howes RE, Patil AP, Gething PW, Van Boeckel TP, Temperley WH, et al. The international limits and population at risk of Plasmodium vivax transmission in 2009. *PLoS Negl Trop Dis*; 2009.4: e774.
- Djimde A, Doumbo OK, Cortese JF, Kayentao K, Doumbo S, Diourte Y, et al. Amolecular marker for chloroquine-resistant falciparum malaria. *N Eng J Med*; 2001.344: 257–263.
- Salzer W, Timmler H, Andersag H. A new type of compound active against avian malaria. *Eur J InorgChem*; 1948.81: 12–19.
- Nilsen A, Miley GP, Forquer IP, Mather MW, Katneni K, Li Y, et al. Discovery, synthesis and optimization of antimalarial 4(1H)-quinolone-3-diarylethers. *J Med Chem*; 2014.57: 3818–3834.

پلاسمودیوم فالسیپاروم اشاره کرد. ضمن اینکه این ترکیب با آتوکون مقاومت کراس نشان نداد (۱۵، ۱۷). فعالیت ویژه ترکیب DQ بر روی مراحل مختلف انگل را ناشی از استخلاف گروه های اتری آلیفاتیک در موقعیت های ۶ و ۷ حلقه ۳-کربوکسی کینولون می دانند. علیرغم تمامی این محاسن ذکر شده برای این ترکیب، حلالیت آبی ضعیف و متابولیز سریع، از معایب آن به شمار می آیند. با رفع این معایب، در طراحی و ساخت مشتقات جدید با الهام از این ترکیب می توان به ساخت نسل جدید داروهای ضد مالاریا امیدوار بود.

ووبه (Wube) و همکارانش مشتقات جدیدی از ۴-کینولون ها با استخلاف های متفاوت در موقعیت ۱ و ۲ حلقه را سنتز کردند. مشتقانی با استخلاف فنیل آلکیل در موقعیت ۲ حلقه به طرز قابل ملاحظه ای قدرت ضد مالاریایی بر علیه پلاسمودیوم فالسیپاروم را افزایش دادند (۲۶). از طرفی استخلاف برم بر روی بخش انتهایی در سر زنجیر آلکیل سبب بهبود فعالیت های ضد مالاریایی در این مشتقات گردید. ترکیب (۱۲) دارای این استخلاف ها با $IC_{50} = ۰.۰۹ \mu M$ و $SI = ۷۳/۳۳$ (L-6/NF54) قویترین مشتق سنتز شده توسط این گروه بود. البته ترکیب (۱۳) با $۰.۴۷ \mu M$ در $IC_{50} = ۳۴۲/۸۹$ و $SI (L-6/NF54) = ۱۲$ انتخاب پذیری بالاتری را نسبت به سویه حساس به کلروکین NF54 در پلاسمودیوم فالسیپاروم نشان داد. این ترکیبات با داشتن ساختار ساده می توانند به عنوان ترکیبات راهنمای جدید مورد استفاده قرار گیرند.

نتیجه گیری

مقاومت انگل به داروهای موجود، بزرگترین معضل در پیشگیری، کنترل، حذف و در نهایت ریشه کنی مالاریا می باشد و در نبود یک داروی جایگزین مناسب، دستیابی به داروی جدید، اینم، مقرر به صرفه، با سمتی پایین و موثر بر روی سویه های مقاوم به داروهای رایج چالش بزرگی فراروی بیماری مالاریا می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله مروری به

22. Winter RW, Kelly JX, Smilkstein MJ, Dodean R, Hinrichs D, Riscoe MK. Antimalarial quinolones: synthesis, potency, and mechanistic studies. *ExpParasitol*; 2008.118: 487–497.
23. Tahghighi A. Importance of metal complexes for development of potential leishmanicidal agents. *JOrganometChem*; 2014. 770: 51-60.
24. Casey AC. Synthesis of some 4-quinolones and related structures for evaluation as potential antimalarial agent. *NTIS*; 1974.2: 1–45.
25. Winter RW, Kelly JX, Smilkstein MJ, Hinrichs D, Koop MK. Optimization of endochin-like quinolones for antimalarial activity. *ExpParasito*; 2011.127: 545–551.
26. Wube A, Hüfner A, Seebacher W, Kaiser M, Brun R, Bauer R, et al. 1,2-substituted 4-(1H)-uinolones: synthesis, antimalarial and anti-trypanosomal activities in vitro. *Molecules*; 2014.19: 14204-20.
8. MMV: Defeating malaria together. Geneva: Medicines for Malaria Venture; (<http://www.mmv.org/research-development/project-portfolio/elq300>)
9. Lacle AN, Sáenz FE, Cross RM, Udenze KO, Monastyrsky A, Stein S, et al. 4(1H)-Quinolones with liver stage activity against *Plasmodium berghei*. *Antimicrob Agents Chemother*; 2013.57: 417–424.
10. Nixon GL, Pidathala C, Shone AE, Antoine T, Fisher N, O'Neill PM, et al. Targeting the mitochondrial electron transport chain of *Plasmodium falciparum*: new strategies towards the development of improved anti-malarials for the elimination era. *Future Med Chem*; 2013.5: 1573–1591.
11. Leung SC, Gibbons P, Amewu R, Nixon GL, Pidathala C, Hong DW, et al. Identification, design and biological evaluation of heterocyclic quinolones targeting *Plasmodium falciparum* type II NADH:quinoneoxidoreductase (PfNDH2). *J Med Chem*; 2012.55: 1844–1847.
12. Biagini GA, Fisher N, Shone EA, Mubaraki MA, Srivastava A, Hill A, et al. Generation of quinolone antimalarials targeting the *Plasmodium falciparum* mitochondrial respiratory chain for the treatment an prophylaxis of malaria. *PNAS*; 2012.109: 8298–8303.
13. Ryley JF, Peters W. The antimalarial activity of some quinolone esters. *Ann Trop Med Parasitol*; 1970.64: 209–222.
14. Zhang Y, Guiguemde WA, Sigal M, Zhu F, Connelly MC, Nwaka S, et al. Synthesis and structure–activity relationships of antimalarial 4-oxo-3-carboxyl quinolones. *Bioorg Med Chem*; 2010.18: 2756–2766.
15. Da Cruz FP, Martin C, Buchholz K, Lafuente-Monasterio MJ, Rodrigues T, Sönnichsen B, et al. Drug screen targeted at plasmodium liver stages identify a potent multistage antimalarial drug. *J Infect Dis*; 2012.205: 1278–1286.
16. Burrows JN, van Huijsdijnen RH, Möhrle JJ, Oeuveray C, Wells TNC. Designing the next generation of medicines for malaria control and eradication. *Malar J*; 2013.12: 187.
17. Meister S, Plouffe DM, Kuhen KL, Bonamy GM, Wu T, Barnes SW, et al. Imaging of *Plasmodium* liver stages to drive next-generation antimalarial drug discovery. *Science*; 2011.334: 1372–1377.
18. Rajabalian S, Foroumadi A, Shafiee A, Emami S. Functionalized N-(2-xyiminoethyl) piperazinyl quinolones as new cytotoxic agents. *J Pharm PharmSci*; 2007.10: 153–158.
19. Tabarrini O, Massari S, Daelemans D, Stevens M, Manfroni G, Sabatini S, et al. Structure-activity relationship study on anti-HIV 6-desfluoroquinolones. *J Med Chem*; 2008.51: 5454–5458.
20. Cheng G, Hao H, Dai M, Liu Z, Yuan Z. Antibacterial action of quinolones: from target to network. *Eur J Med Chem*; 2013.66:555 – 562.
21. Greeff J, Joubert J, Malan SF, Van Dyk S. Antioxidant properties of 4-quinolones and structurally related flavones. *Bioorg Med Chem*; 2012.20: 809–818.

A review to theimportance of quinolone ring in achieving new anti-malarial drugs

Safora Karimi, MSc student, Department of Medical Chemistry, Pharmaceutical Sciences Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.

***Azar Tahghighi**, Assistant Professor, Malaria and Vector Research Group (MVRG), Biotechnology Research Center (BRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran (*Corresponding author). atahghighi2009@gmail.com

Abstract

Malaria is an acute and chronic disease caused by obligate intracellular protozoan parasites of the genus plasmodium, transmitted through the bite of female anopheles mosquitoes. According to the World Health Organization (WHO) report, currently malaria transmits in 104 countries and due to a failure in the fight against this disease, their control and elimination is difficult. The parasite resistance to current and inexpensive drugs is one of the difficulties in the way of the elimination of malaria. Furthermore, achievement to a new drug with different mechanism of action is inevitable. In this respect, research groups focused on heterocyclic rings to find new drugs with different mechanism of action compared to current drugs. So, they synthesized various derivatives and evaluated their antimalarial activity on different stages of the parasite's life cycle. The compounds containing quinolone ring with diverse substituents on ring presented suitable activity on blood, liver and gametocyte stages. Furthermore, according to the tendency of these compounds on the different stages of the malaria parasite, they canbe considered as lead compound to achieve new antimalarial drugs with different mechanisms of action and evaluated further. Due to theimportance of the subject, in this review article are introduced some quinolone derivatives with antimalarial activity.

Keywords: *Plasmodium falciparum*, Antimalarial, Quinolone ring, Endochin, Decoquinate