

تأثیر پیش آماده سازی ناشی از محدودیت جریان خون - خون رسانی مجدد همراه با مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر تولید نیروی زیربیشینه پویا

علیرضا رمضانی: استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران.

*سارا نصیری سمنانی: دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، sara.nasiri64@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۶/۶/۴

تاریخ دریافت: ۹۶/۴/۱۰

چکیده

زمینه و هدف: بی کربنات سدیم مکملی است که جهت کاهش خستگی و افزایش بروز ده توان در تمرینات کوتاه مدت استفاده می شود. از طرفی، پیش آماده سازی ناشی از کم خونی و بازتریق (IRPC) محرك مناسبی برای افزایش پاسخهای انقباضی زیربیشینه می باشد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر پیش آماده سازی ناشی از کم خونی - بازتریق همراه با مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر تولید نیروی زیربیشینه پویا می باشد.

روش کار: نه دانشجوی دختر ورزشکار بطور تصادفی در طرح مقاطع دوسوکور در سه حالت بی کربنات سدیم + IRPC، بی کربنات سدیم + IRPC+IRPC قرار گرفتند. شرکت کنندگان، حرکت جلو بازو دمبل لاری تک دست با وزنه ۲ کیلوگرمی با بیشترین تکرار ممکن را انجام دادند. رکوردهای هر سه شرایط تمرینی جمع آوری شد. غلظت لاكتات پلاسمای بعد از اجرای تست در هر سه شرایط اندازه گیری شد. در گروه IRPC، قبل از اجرای تست، دست برتر فرد به مدت ۳ دقیقه تحت محدودیت نسبی جریان خون (BFR) قرار می گرفت و پس از ۱ دقیقه بازتریق، حرکت اجرا می شد. داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ولیک، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بونفرونی در سطح معناداری $p \leq 0.05$ تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد، غلظت لاكتات پلاسمای و رکوردهای شرایط بی کربنات سدیم + IRPC و بی کربنات سدیم، نسبت به شرایط دارونما + IRPC+IRPC تفاوت معناداری داشت ($p < 0.05$).

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از مکمل بی کربنات در شرایط تمرینی IRPC موجب افزایش نیرو و به تعویق انداختن خستگی در انقباض های زیربیشینه پویا می شود.

کلیدواژه ها: پیش آماده سازی، محدودیت جریان خون - خون رسانی مجدد، بی کربنات سدیم، نیروی زیربیشینه پویا

اختلال در سازو کار انقباضی متمرکز شده است

(۴).

با فرها از جمله مکمل هایی هستند که امروزه مصرف آن ها در بین ورزشکاران به منظور حفظ انقباض عضلانی و به تأخیر انداختن خستگی رایج شده است (۵،۶). بی کربنات سدیم به عنوان یکی از این مکمل ها معرفی شده است که عمل آن، خنثی کردن یون های هیدروژن برای تشکیل دی اکسید کربن و آب است (۷). که در این راستا، برخی تحقیقات افزایش در توان بی هوازی و مدت زمان اجرا را بعد از مصرف این مکمل گزارش کرده اند (۸،۹). به عنوان مثال، درباره اثر این مکمل بر لاكتات خون بعد از یک جلسه فعالیت تناوبی شدید، گزارش ها نشان می دهد که به دنبال بهبود عملکرد، میزان تجمع این شاخص نیز به طور معناداری زیاد می شود (۱۰). همچنین، نتایج پژوهشی نشان دادند که بازگیری این مکمل سبب

افراد شرکت کننده در رویدادهای ورزشی به دنبال کسب بهترین نتایج و رتبه های عالی در مسابقات می باشند. این افراد سعی می کنند که بهترین اجرای خود را به نمایش بگذارند و در این میان عوامل متعددی از بروز عملکرد آبد آل آن ها جلوگیری می کند. از جمله سازو کاری که عملکرد ورزشی افراد را کاهش داده و از ادامه آن جلوگیری می کند، افزایش عوامل خستگی در بدن است که این سازو کار سبب ایجاد خستگی و کوفتگی بدن و عضلات در گیر در ورزش می شود (۱). خستگی به عنوان ((ناتوانی در حفظ بروز ده توانی معین یا مورد انتظار)) تعریف شده است (۲،۳). اغلب یافته ها در بیان علل خستگی و محل بروز آن، به مواردی نظیر دستگاه های انرژی (ATP-PC)، گلیک-ولیز و اکسیداسیون هوازی)، تجمع فرآورده های جانبی متابولیسم، سیستم عصبی و

پژوهش ها به بررسی پاسخ های پیش آماده سازی (PC) (Preconditioning) محدودیت جریان خون عضله پرداخته اند. نشان داده شده است، پیش آماده سازی ناشی از کم خونی- بازتریق (Reperfusion) Ischemic Reperfusion (IRPC) (Preconditioning) عملکرد عضلانی را بهبود می بخشد (۲۹). یک مکانیسم پیشنهادی، افزایش جریان خون عضله می باشد که از طریق عمل رگ گشایی کانال های پاتاسیمی وابسته به ATP و سطوح آدنوزین رخ می دهد (۳۰). بازتریق خون، بستر مویرگی را پر خون می کند و از این طریق پاسخ عضله به مقاومت را افزایش می دهد. نشان داده شده است که IRPC، مصرف اکسیژن و برون ده توان را هنگام رکاب زدن شدید افزایش می دهد. اعمال این محرک، خون رسانی و عملکرد اندوتلیومی را بهبود می بخشد (۳۱). لیبوناتی و دیگران (۳۲)، تاثیر بازتریق خون پس از ایسکمیک ناشی از انسداد بازو با فشار ۲۰۰ میلی متر جیوه به مدت ۲ دقیقه را بر روی برون ده توان ایستای تاکننده مج دست ۱۱ مرد و زن جوان اندازه گیری کردند. مقایسه ها نشان داد، برون ده توان با IRPC به صورت معنی داری نسبت به زمانی که شرکت کنندگان بدون پروتکل پیش آماده سازی حرکت را انجام می دادند بیشتر بود.

با توجه به اینکه، روش تمرین قدرتی با شدت پایین زمانی که با BFR همراه می شود (از طریق فشردگی خارجی شریان در حین فعالیت)، توانایی بهبود سطوح سازگاری عضلانی را دارند. این بهبودها علاوه بر ظرفیت تولید نیرو مشابه با تمرین قدرتی با شدت بالا در افزایش سطح مقطع عضله نیز مشاهده شده است (۲۵). با این حال، محرک ایسکمی (عدم خون رسانی) در فعالیت، موجب وضعیت اسیدی بین عضلانی بیشتری می شود (کاهش PH از طریق افزایش متابولیت‌ها)، قادر به ایجاد خستگی است که منجر به ناتوانی در مکانیسم انقباض عضلانی شده، عملکرد را در حین جلسه تمرین کاهش می دهد (۲۶). خستگی حاد، از طریق کاهش در توانایی تولید نیرو و عدم توانایی انجام کار مشخص می شود و عموماً با اسیدی شدن محیط درون عضلانی مرتبط است،

افزایش کار انجام شده از ۹ به ۲۱ درصد و افزایش توان اوج عملکردی از ۵/۳ به ۸/۷ درصد می شود (۱۱، ۱۲).

از طرفی، اعمال نیرو لازمه بسیاری از ورزش‌ها و نیز برنامه‌های درمانی و بازتوانی است. از این‌رو، کاربرد نیرو و افزایش قدرت بسیار مورد توجه قرار گرفته است و متغیرهای مختلفی جهت بهینه کردن برنامه‌های تمرینی برای افزایش پاسخ و سازگاری‌های آن دست کاری شده‌اند. محرک تمرینی با بار زیاد و تکرار کم برای افزایش قدرت عضلانی اثبات شده و نشان داده شده است که اجرای ۶ تا ۱۲ تکرار با شدت ۷۰ تا ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه بر افزایش قدرت و هایپرتروفی عضله موثر است (۱۳). در دو دهه اخیر کاatsu (Kaatsu) که برای اولین بار در ژاپن رایج شد و به معنی تحمیل بار اضافی است، جهت بهینه کردن تاثیر محرک تمرینی به کار رفته است (۱۴). این روش از طریق ایجاد استرس متابولیک به وسیله Blood flow restriction (BFR)، تاثیر محرک تمرینی را بیشتر می کند (۱۵، ۱۶). لذا در شرایطی مثل آسیب و بازتوانی که اعمال بار زیاد میسر نباشد این روش می تواند جایگزین مناسبی باشد (۱۷). در مجموع پژوهش‌های زیادی به بررسی آثار انسداد سرخرگی و سیاهرگی به همراه تمرینات مقاومتی پرداخته اند و نتایج مثبتی گزارش کرده‌اند (۱۸، ۱۹، ۲۱). در واقع نشان داده شده است که جریان خون ناکافی به همراه تمرینات مقاومتی برای ایجاد سازگاری عضلانی ضرورت دارد (۲۲). برخی شواهد نشان داده اند که تمرینات کم شدت ۲۰ درجه (Low intensity training) (LIT) با تقریبا ۲۰ درصد یک تکرار بیشینه همراه با High intensity (HIT) برابر با تمرینات شدید (HIT) (training) با حدود ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه، بر روی افزایش قدرت و هایپرتروفی دارد (۲۲-۲۵). تاثیر مثبت LIT همراه با BFR می تواند ناشی از فراخوانی بیشتر تارهای عضلانی تبدیل نقباض (۱۵)، پاسخ‌های هورمونی (۲۶)، عوامل رشد محلی (۲۷)، افزایش مسیرهای سیگنالینگ درون سلولی و سنتز پروتئین‌های جدید (۲۸) باشد. همچنین برخی

زمان، مکان و شرایط اجرای آزمون برای همه آزمودنی‌ها یکسان بود به منظور آشنا کردن آزمودنی‌ها با نحوه اجرای آزمون، کاهش اثر پیش آزمون و تاثیر هماهنگی عصبی عضلانی بر افزایش نیرو، یک هفته قبل از اجرای آزمون، شرکت کنندگان با نحوه اجرای حرکت پویای جلو بازوی تک دست لاری با دمبل ۲ کیلوگرمی آشنا شدند. در این شیوه اجرا، اثر تداخلی اعمال نیروی سایر عضلات مثل شانه، تنه و اندام تحتانی به حداقل می‌رسد. این مقدار وزنه بیشترین باری بود که در تمرینات، ضعیف‌ترین شرکت کننده می‌توانست حداقل ۱۰ بار حرکت جلو بازوی پویا را با آن به درستی اجرا کند. مکمل بی‌کربنات سدیم در پت‌های یک لیتری و به مقدار مورد نیاز برای شرایط تمرینی بی‌کربنات سدیم^{IRPC+}، بی‌کربنات سدیم (۳ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تهیه شد^(۳۴). و محلول آب خالص برای شرایط تمرینی دارونما^{IRPC+} در پت‌های یک لیتری در نظر گرفته شد که باید ۹۰ دقیقه قبل از اجرای تست مصرف می‌شد. سپس، آزمودنی‌ها ۵ دقیقه گرم می‌کردند و بعد از آن، تحت تاثیر BFR قرار گرفتند. که شامل بستن بازوی دست برتر با فشاری معادل ۲۰ میلی‌متر جیوه کمتر از فشار خون سیستولی استراحت هر آزمودنی به مدت ۳ دقیقه بود^(۳۵). پس از باز کردن کاف فشار، یک دقیقه ماساژ و نرمش برای همان دست انجام شد و افراد، آزمون جلو بازو دمبل لاری را اجرا می‌کردند. و رکوردها ثبت می‌شد. همچنین بلافالسله بعد از اجرای تست، که به صورت متقطع و با فاصله ۵ روز از یکدیگر و در سه شرایط تمرینی (بی‌کربنات سدیم^{IRPC+}، بی‌کربنات سدیم به تنها یک و دارونما^{IRPC+}) انجام شد، ۵ سی سی خون به منظور اندازه گیری لاكتات سرم گرفته می‌شد. لاكتات سرم با استفاده از روش الایزا و توسط کیت آزمایشگاهی ساخت شرکت پارس اندازه گیری شد.

پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ولیک (به علت تعداد کم نمونه از این آزمون استفاده شد)، برای محاسبه‌ی شاخص‌های مرکزی و پراکنده‌ی از آمار توصیفی

که باعث ناتوانی در مکانیسم اتصال عصبی عضلانی می‌شود^(۳۳). بنابراین یک کاهش در بزرگی سیگنال‌های الکتروموگرافی در حین یک سری فعالیت، به نظر می‌رسد نشان دهنده شروع خستگی باشد که با کمبود در ظرفیت تولید قدرت عضلانی همراه است. برای افزایش قدرت از طریق تمرینات مقاومتی، تمرین باید با شدت نسبتاً زیاد انجام گیرد که پذیرش این گونه تمرینات برای زنان مطلوب و رضایت‌بخش نیست. از این‌رو چنانچه بتوان با طراحی یک برنامه تمرینات قدرتی با شدت کم به همان نتایج تمرین با شدت زیاد دست یافت، می‌توان از آن به عنوان توصیه کاربردی برای گروه‌های تمرینی بهره برد. از این‌رو، با توجه به نقش بافری بی‌کربنات سدیم در به تعویق انداختن خستگی ناشی از افزایش یون هیدروژن (کاهش PH) و اثرات مثبت IRPC در افزایش قدرت و توده عضلانی، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر پیش آماده سازی ناشی از کم خونی- بازتریق همراه با مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم بر تولید نیروی زیربیشینه پویا را در دختران جوان ورزشکار بررسی کند.

روش کار

روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بود و در قالب طرح متقاطع دوسوکور اجرا شد. ۹ دختر سالم ورزشکار به شکل تصادفی از بین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه مازندران انتخاب شدند. همه آزمودنی‌ها طی یک جلسه آشنایی که چند روز قبل از شروع اجرای تحقیق برگزار شد از شیوه انجام آزمون و نحوه مصرف مکمل آگاهی کامل پیدا کرده و فرم رضایت نامه را آگاهانه امضا کردند. سوابق فعالیت و سلامت شرکت کنندگان از طریق پرسش نامه محقق ساخته کنترل شد. در زمان اجرای آزمون هیچ کدام از آزمودنی‌ها آسیب درمان نشده و یا ناهنجاری خاصی به طوری که نتایج را تحت تاثیر قرار دهد در هیچ عضوی نداشتند. در روزهای آزمون و یک روز قبل از آن، نوع تغذیه افراد یکسان تعیین شد. ضمناً آزمودنی‌ها حداقل ۸ ساعت خواب شبانه داشتند.

جدول ۱- شاخص های آنتروپومتریکی آزمودنی ها

متغیر	شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)	میانگین \pm انحراف معیار
سن (سال)	۲۳/۵ \pm ۰/۵۷	
وزن (کیلوگرم)	۵۰ \pm ۱/۷۷	
قد (سانتی متر)	۱۵۹/۸۷ \pm ۶/۵۶	
	۱۹/۴۷ \pm ۱/۱۴	

جدول ۲- میانگین رکوردها و مقادیر لاكتات پلاسمای آزمودنی ها در شرایط مختلف تمرينی

گروه ها	میانگین تکرارها	مقدار احتمال	غلظت لاكتات پلاسما(mg/dl)	مقدار احتمال
بی کربنات سدیم + IRPC	* ۱۷۳ \pm ۳/۵۸	*	۲۴/۵ \pm ۴/۰۵	
دارونما IRPC+	۱۳۷/۷۵ \pm ۱/۳۱		۸۷ \pm ۴/۵۲	
بی کربنات سدیم	* ۱۶۹/۷۵ \pm ۶/۴۳	*	* ۳۱/۵ \pm ۲/۲۵	<۰/۰۰۱

تفاوت معنادار نسبت به شرایط دارونما + IRPC*

بعد از تمرين، در شرایط بی کربنات سدیم IRPC+ و بی کربنات سدیم نسبت به دارونما IRPC+ بطور معناداری کمتر بود ($P < 0/05$). جدول ۲، غلظت های لاكتات خون و رکوردهای افراد را در سه شرایط مختلف تمرين و جدول ۳، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی به منظور مقایسه تغیيرات بین گروهی نشان می دهد.

استفاده شد. تفاوت بین گروهی از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (RM ANOVA) مورد آزمون قرار گرفت. در صورت معناداری برای مقایسه جفت میانگین ها از آزمون بونفرونی استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد و سطح معناداری $p < 0/05$ در نظر گرفته شد.

بحث و نتیجه گیری

بهینه کردن نتایج تمرين و بهبود پاسخ، از اهداف هر برنامه تمرينی و نیازمند انتخاب محرك مناسب است. اخیرا پیش آماده سازی ناشی از کم خونی- بازتریق به عنوان محركی برای افزایش پاسخ و سازگاری عضلانی موردنوجه قرار گرفته و برخی پژوهش ها آثار مثبتی گزارش کرده‌اند. علاوه براین، تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور، در مورد تاثیر مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد ورزشی انجام گرفته است و تاثیر مثبت آن در به تأخیر اندختن خستگی و افزایش مدت زمان اجرا ثابت شده است. تحقیق حاضر نیز

یافته ها

ارزیابی های اولیه مانند اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک مانند قد (سانتی متر) وزن (کیلوگرم)، توده بدنی (قد/وزن - BMI)، کیلوگرم بر متر مربع) با استفاده از دستگاه دیجیتالی GS49 (آلمان) انجام شد (جدول ۱).

نتایج تحقیق حاضر نشان داد، رکوردهای افراد در حرکت جلو بازو دمبل لاری در شرایط بی کربنات سدیم IRPC+ و بی کربنات سدیم نسبت به شرایط دارونما IRPC+ افزایش معناداری داشت ($p < 0/05$). همچنین غلظت های لاكتات خون افراد

جدول ۳- نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه تغیيرات بین گروهی متغیرهای تحقیق

متغیر	بی کربنات سدیم	گروه های مورد مقایسه	تفاوت میانگین ها	مقدار احتمال
تعداد تکرارها	IRPC+ دارونما	بی کربنات سدیم + IRPC	۳۵/۲۵	.۰/۰۱
غلظت لاكتات	دارونما	بی کربنات سدیم	۳/۲۵	.۰/۶
(خون mg/dl)	IRPC+ دارونما	بی کربنات سدیم	۳۲	.۰/۰۲
	IRPC+ دارونما	بی کربنات سدیم	-۶۲/۵	.۰/۰۰
	دارونما	بی کربنات سدیم	-۷	.۰/۲
	IRPC+ دارونما	بی کربنات سدیم	-۵۵/۵	.۰/۰۰

غلظت لاكتات پلاسمای بین دو شرایط تمرینی بی کربنات سدیم و دارونما⁺ IRPC⁺، ممکن است به دلیل استفاده از ابزار فشار خارجی (کاف) حین کم خونی باشد، که در افراد شرایط دارونما⁺ IRPC⁺ منجر به محرك های ایسکمی مرتبط با کاهش اکسیژن در دسترس و تجمع متabolit ها (P_i , H^+) شده باشد (۳۹). از این رو موجب غلظت های بالاتر لاكتات پلاسمای در گروه دارونما⁺ IRPC⁺ در مقایسه با گروه بی کربنات سدیم شده و افزایش غلظت لاكتات (به صورت H^+) از طریق تاثیر منفی بر مکانیسم های درگیر در انقباض عضلانی (ATPase)، پمپ کلسیم، کاهش میل ترکیبی تروپونین C با کلسیم (۴۰) خستگی عضلانی زود هنگام را موجب شده و در نتیجه رکوردهای افراد گروه دارونما⁺ IRPC⁺ بطور معناداری در مقایسه با گروه بی کربنات سدیم کاهش یافته است.

همانطور که در پیشینه ذکر شده، تمرینات BFR منجر به فراخوانی بیشتر تارهای تن انقباض شده (۱۵)، که برای تولید انرژی به گلیکولیز بی هوازی متکی بوده و محصول نهایی آن لاكتات می باشد (۴). لاكتات می تواند باعث ناتوانی در حفظ برون ده توانی معین شود. از این رو ممکن است، مصرف مکمل بافری بی کربنات سدیم، در شرایط تمرینی IRPC در مقایسه با دارونما⁺ IRPC⁺، موجب بهبود عملکرد انقباض زیربیشینه پویا از طریق کاهش مقادیر لاكتات پلاسمای شده باشد. بی کربنات، تامپون قوی یون های هیدروژن تولیدی است و از اسیدی شدن بیشتر خون و خستگی زود هنگام، جلوگیری می کند (۶). در نتیجه، از این طریق می تواند موجب بهبود عملکرد، به ویژه در وهله های تمرین شود.

در مورد تاثیر بی کربنات سدیم⁺ IRPC⁺ بر روی تکرار انقباض پویای زیربیشینه در مقایسه با شرایط بی کربنات سدیم، نتایج تفاوت معناداری را نشان نداد. از آنجایی که در انقباض های پویا، تلمبه عضلانی از کار نمی افتد و فشار ممتد بر روی عروق مشروب کننده عضله وارد نمی شود تا کم خونی موقت حادث شود، به نظر می رسد در اینجا راهبرد مذکور نمی تواند تاثیر برجسته ای در جهت تحریک عضله یا رفع محدودیت داشته باشد.

اثر این دو محرك (کم خونی- بازتریق و بی کربنات سدیم) را بر روی تولید نیروی زیربیشینه پویای اندام فوقانی بررسی کرد. نتایج نشان داد، پیش آماده سازی عضله از راه ۳ دقیقه کم خونی نسبی با فشاری معادل ۲۰ میلی متر جیوه کمتر از فشار خون سیستولی فرد و سپس ۱ دقیقه بازتریق همراه با مصرف مکمل بی کربنات سدیم، نیروی زیربیشینه پویا را به موازات مقادیر لاكتات کمتر پلاسمای، بطور معناداری افزایش می دهد.

همانطور که پیشتر ذکر شد پژوهش های زیادی در مورد تاثیر پیش آماده سازی ناشی از BFR و مکمل گیری بی کربنات سدیم به طور جداگانه، بر روی عملکرد ورزشی صورت گرفته ولی تحقیقی که تاثیر BFR با مکمل های ورزشی را بررسی کند، دیده نشده است. کوک و دیگران (۳۶)، نشان دادند که پروتکل های BFR حداقل خستگی به اندازه بار زیاد، حتی زمانی که بار کم استفاده شد را موجب می شود و پروتکل ۲۰٪ یک تکرار بیشینه خستگی بیشتری از بار بالا ایجاد کرد. که از طریق کاهش گشتاور ایزومتریک مشاهده شد. علاوه بر این، تحقیقاتی که با استفاده از الکترومیوگرافی، خستگی عضلانی را اندازه گرفتند گزارش کردند که کاهش در بزرگی سیگنال با شروع خستگی مرکزی مرتبط است که اختلال در هدایت عصبی را موجب می شود (۳۷). این فرآیند خستگی مرکزی با تغییرات در دستور واپر ان حرکتی که از طریق افزایش در تجمع H^+ , P_i تحت تاثیر قرار می گیرد، مرتبط است (۳۸). بنابراین، با توجه با اثر بی کربنات سدیم در خنثی سازی H^+ ، می توان گفت، محیط خارج سلولی را قلیایی کرده و PH را افزایش می دهد (۳۳) و این امر می تواند کاهش معنادار غلظت لاكتات پلاسمای در شرایط بی کربنات سدیم⁺ IRPC⁺ و بی کربنات سدیم، نبست به شرایط دارونما⁺ IRPC⁺ شده باشد. علاوه بر این، مصرف این مکمل، از اختلالات در تعادل اسیدی- بازی جلوگیری می کند (۶) و در نهایت افت کمتر PH ممکن است منجر به افزایش معنادار رکوردهای افراد در شرایط بی کربنات سدیم⁺ IRPC⁺ و بی کربنات سدیم نبست به شرایط دارونما⁺ IRPC⁺ شده باشد. همچنین اختلاف رکوردها و

توصیه می شود ورزشکاران به منظور بهبود عملکرد ورزشی خود از این روش تمرینی همراه با مکمل بی کربنات سدیم (۳ میلی گرم / کیلوگرم وزن بدن) استفاده کنند. هر چند با توجه به دیگر مارکرهای خستگی هنگام تمرین با BFR (P_i, هایپوکسی) تحقیقات بیشتری به منظور تعیین نقش دیگر مکمل ها به منظور افزایش سطوح عملکرد ورزشی همراه با BFR نیاز می باشد.

تقدیر و تشکر

از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران، که امکان اجرای این تحقیق را فراهم ساختند و دانشجویانی که به عنوان آزمودنی در این پژوهش ما را یاری نمودند، کمال تشکر را داریم.

منابع

1. Jourkesh M, Ahmadi S, Mehdipoor Keikha B, Sadri I, Ojagi A. Effects of six weeks sodium bicarbonate supplementation and high-intensity interval training on endurance performance and body composition. Ann Biol Res. 2011; 2: 403-13.
2. McNaughton LR, Thompson D. Acute versus chronic sodium bicarbonate ingestion and anaerobic work and power output. J Sports Exerc Med. 2001; 41: 436-62.
3. Boyd JH, Walley KR. Is there a role for sodium bicarbonate in treating lactic acidosis from shock? Curr Opin Crit Care. 2008; 14: 379-83.
4. Linderman J, Fahey TD. Sodium bicarbonate ingestion and exercise performance. An update Sports Med. 2009; 11: 71-80.
5. Raymer GH, Marsh GD, Kowalchuk JM, Thompson RT. Metabolic effects of induced alkalosis during progressive forearm exercise to fatigue. J Appl Physiol. 2004; 96: 2050-6.
6. Maughan R, Depiesse F, Geyer H. The use of dietary supplements by athletes. J Sports Sci. 2007; 25: 103-13.
7. Stephens TJ, McKenna MJ, Canny BJ, Snow RJ, McConell GK. Effect of sodium bicarbonate on muscle metabolism during intense endurance cycling. Med Sci Sports Exerc. 2002; 34: 614-21.
8. McNaughton LR, Siegler J, Midgley A. Ergogenic effects of sodium bicarbonate. Curr Sports Med Rep. 2008; 7: 230-6.
9. Artioli GG, Gualano B, Coelho DF, Benatti FB, Gailey AW, Lancha AH Jr. Does sodium-bicarbonate ingestion improve simulated judo performance? Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2007; 17: 206-17.
13. Yasuda T, Brechue W, Fujita T, Shrikawa J,

این نتیجه با نتایج پژوهش های دی گروت و دیگران (۳۱) و جین اس تی و دیگران (۴۱) و بیون و دیگران (۴۲) هم خوانی ندارد. جین اس تی و دیگران (۴۱)، بهبود رکورد شنای ۱۰۰ متر IRPC به میزان ۷/۰ ثانیه را بعد از ۵×۴ دقیقه گزارش کردند. IRPC ۴۵ دقیقه قبل از آزمون، با فشاری حدود ۱۵ میلی متر جیوه بیش از فشار خون سیستولی استراحتی روی اندام فوقانی انجام شده بود. بیون و دیگران (۴۲)، نیز تاثیر BFR بر پاسخ و بازیافت پس از فعالیت ورزشی شدید را بررسی کردند. آنها از پروتکل BFR با فشار ۲۲۰ میلی متر جیوه (۲ تا ۳ دقیقه برای هر پا) و باز تزریق قبل از انقباض های توانی و شدید درون گرا و برون گرای اندام تحتانی استفاده کردند. نتایج نشان داد در این گروه، روش پیش آماده سازی سبب بروز ده توان بیشتر بلا فاصله و پس از ۲۴ ساعت بازیافت نسبت به گروه کنترل شد. دلیل ناهم خوانی نتایج می تواند تفاوت پروتکل های IRPC، شامل مدت BFR و میزان فشار جهت ایجاد محدودیت و همچنین نوع فعالیت ورزشی انجام شده باشد. همچنین در این پژوهش هیچ کدام از شرکت کنندگان، درد و کوفتگی عضلانی را پس از آزمون و تا ۴۸ ساعت پس از آن گزارش نکردند. این امر نشان می دهد پروتکل مورد استفاده در این پژوهش از سلامت و ایمنی لازم برخوردار است و ظاهرا تغییرات فیزیولوژیک نامطلوب گذار و ماندگاری به دنبال ندارد. این نتیجه برخلاف گزارش ورن بوم و دیگران (۴۳)، در مورد این شیوه پیش آماده سازی است. البته تفاوت مذکور می تواند ناشی از پروتکل های گوناگون مورد استفاده در این پژوهش ها باشد.

از آنجاییکه BFR همراه با ورزش مقاومتی باشد کم (۲۰٪) یک تکرار بیشینه، به عنوان یک پروتکل ورزشی مفید برای به دست آوردن قدرت و توده عضلانی مشابه با تمرین قدرتی سنتی باشد متوسط و بالا (۷۰٪) یک تکرار بیشینه پیشنهاد شده است و با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مبنی بر اثر مثبت پیش آماده سازی ناشی از کم خونی- باز تزریق همراه با مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر تولید نیروی زیر بیشینه پویا،

- Juliana BC, Sousa Adenilson TA, Júnior Joamira P, Araújo Rodrigo R, et al. Effects of High-Intensity Blood Flow Restriction Exercise on Muscle Fatigue. *J Hum Kinet.* 2014; 41: 163-172.
25. Park Song-Young, Yi Sub K, Andrew H, Joshua CW, Kook ES. Low Intensity Resistance Exercise Training with Blood Flow Restriction: Insight into Cardiovascular Function, and Skeletal Muscle Hypertrophy in Humans, *Korean J Physiol Pharmacol.* 2015; 19: 191-196.
26. Loenneke JP, Fahs CA, Wilson JM, Bemben MG. Blood flow restriction: The metabolite/volume threshold theory. *Med Hypo.* 2011; 77: 748-52.
27. Kawada S. What phenomena do occur in blood flow-restricted muscle? *Int J Kaatsu Training Res.* 200; 1: 37-44.
28. Drummond M, Fujita S, Abe T, Dreyer H, Volpi E, Rasmussen B. Human muscle gene expression following resistance exercise and blood flow restriction. *Med Sci Sports Exerc.* 2007; 40: 691-698.
29. Patterson SD, Leggate M, Nimmo MA, Ferguson RA. Circulating hormone and cytokine response to low-load resistance training with blood flow restriction in older men. *Eur J Appl Physiol.* 2013; 113: 713-719.
30. Kilduff LP, Finn CV, Baker JS, Cook CJ, West DJ. Preconditioning Strategies to Enhance Physical Performance on the Day of Competition. *Int J Sports Physiol Perform.* 2013; 8: 677-681.
31. DeGroot P, Thijssen D, Sanchez M, Ellenkamp R, Hopman M. Ischemic preconditioning improves maximal performance in humans. *Eur J Appl Physiol.* 2010; 108: 141-146.
32. Libonati JR, Cox M, Incanno N, Melville SK, Musante FC, Glassberg HL, et al. Brief periods of occlusion and reperfusion increase skeletal muscle force output in humans. *Cardiologia.* 1998; 43: 1355-1360.
33. Minasian V, Eslami M, Sabbagh M. Effect of Sodium Bicarbonate supplementation on anaerobic power and lactate level in Futsal players. *Sport Biosci.* 2013; 16: 5-19[Persian].
34. The American college of sports medicine. "Sodium bicarbonate (NHCO₃) ingestion may prevent exercise – induced perturbations in acid – base balance, thus resulting in performance enhancement" 2006; PP: 124-134.
35. Fahs CA, Loenneke JP, Rossow LM, Thiebaud RS, Bemben MG. Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise. *J. Trainol.* 2012; 1:14-22.
36. Cook S, Clark B, Ploutz-Snyder L. Effects of exercise load and blood-flow restriction on skeletal muscle function. *Med Sci Sports Exerc.* 2007; 39: 1708-1713.
37. Karabulut M, Cramer JT, Abe T, Sato Y, Bemben, G. Neuromuscular fatigue following low-intensity dynamic exercise with externally applied Sato Y, Abe Takashi. Muscle activation during low-intensity muscle contractions with restricted blood flow. *J Sport Sci.* 2009; 27: 479-489.
10. Price M, Moss P, Rance S. Effects of sodium bicarbonate ingestion on prolonged intermittent exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2003; 35: 1303-8.
11. Mckenzie DC, Moutte KD, Mtirling DR, Hhoebe HH, Kuzara G. Maximal work production following two levels of artificially induced metabolic alkalosis. *J Sport Sci.* 1986; 4: 35-8.
12. McNaughton L, Back K, Palmer G, Strange N. Effects of chronic bicarbonate ingestion on the performance of high intensity work. *Eur J Appl Physiol.* 1999; 80: 333-6.
13. Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of low-intensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size. *Eur J Appl Physiol.* 2011; 111: 2525-2533.
14. Sato y. The history and future of KAATSU Training. *Int J Kaatsu Training Res* 2005; 1: 1-5.
15. Loenneke J, Wilson G, Wilson J.A Mechanistic Approach to Blood Flow Occlusion. *Int J Sports Med.* 2010; 31: 1– 4.
16. Okita K, Takada S. Application of Blood Flow Restriction in Resistance Exercise Assessed by Intramuscular Metabolic Stress. *J Nov Phys.* 2013; 3: 6.
17. Lejkowski PM, Pajaczkowski JA. Utilization of Vascular Restriction Training in post-surgical knee rehabilitation: a case report and introduction to an under-reported training technique. *J Can Chiropr Assoc.* 2011; 55: 280–287.
18. Fujita S, Abe T, Drummond MJ, Cadenas JG, Dreyer HC, Sato Y, et al. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. *J Appl Physiol.* 2007; 103: 903-910.
19. Manini TM, Clark BC. Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health. *Exerc Sport Sci Rev.* 2009; 37: 78-85.
20. Takarada Y, Sato Y, Ishii N. Effects of resistance exercise combined with vascular occlusion on muscle function in athletes. *Eur J Appl Physiol.* 2002; 86: 308-314.
21. Weatherholt A, Beekley M, Greer S, Urtel M, Mikesky A. Modified Kaatsu Training: Adaptations and Subject Perceptions. *Med Sci Sports Exerc.* 2013; 45: 952–961.
22. Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of low-intensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size. *Eur J Appl Physiol.* 2011; 111: 2525-2533.
23. Nishimura A, Masaaki S, Kato K, Fukuda A, Sudo A, Uchida A. Hypoxia increases muscle hypertrophy induced by resistance training. *Int J Sports Physiol Perform.* 2010; 5: 497-508.
24. Neto Heleodório H, Gabriel R, Santos

vascular restriction. *J Electromyogr Kinesiol.* 2010; 20: 440-447.

38. Place N, Yamada T, Bruton JD, Westerblad H. Muscle fatigue: from observations in humans to underlying mechanisms studied in intact single muscle fibres. *Eur J Appl Physiol.* 2010; 110: 1-15.

39. Wernbom M, Järrebring R, Andreasson MA, Augustsson J. Acute effects of blood flow restriction on muscle activity and endurance during fatiguing dynamic knee extensions at low load. *J Strength Cond Res.* 2009; 23: 2389-2395.

40. Walker S, Davis L, Avela J, Häkkinen K. Neuromuscular fatigue during dynamic maximal strength and hypertrophic resistance loadings. *J Electromyogr Kinesiol.* 2012; 22: 356-362.

41. Jean-St-Michel E, Manhilot C, Li J. Remote preconditioning improves maximal performance in highly trained athletes. *Med Sci Sports Exerc.* 2011; 43: 1280–1286.

42. Beaven C. Intermittent lower-limb occlusion enhances recovery after strenuous exercise. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2007; 37: 1132-1139.

43. Wernbom M, Paulsen G, Nilsen TS, Hisdal J, Raastad T. Contractile function and sarcolemmal permeability after acute low-load resistance exercise with blood flow restriction. *Eur J Appl Physiol.* 2012; 112: 2051–2063.

Effects of preparation caused by ischemic-reperfusion along with sodium bicarbonate supplementation on submaximal dynamic force production

Alireza Ramzani, Assistant professor of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
ar0Ramezani@gmail.com

***Sara Nasiri Semnani**, PhD student of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
(*Corresponding author). sara.nasiri64@gmail.com

Abstract

Background: Sodium bicarbonate is a supplementation that used to reduce fatigue and increase power output in short-term training. On the other hand, the Ischemic Reperfusion Preconditioning (IRPC) is appropriate stimulus to increase the submaximal contractile response. The aim of this study was to investigate the effect of Ischemic Reperfusion Precondition in along with sodium bicarbonate supplementation on submaximal dynamic force generation.

Methods: Nine female student-athlete in double-blind randomized crossover design were three mode, sodium bicarbonate + IRPC, sodium bicarbonate and placebo+ IRPC. Participants move forward single arm dumbbell hand with a weight of 2 kg can be carried out most frequently. Every three training conditions records were collected. Plasma lactate concentration after the test was measured in all three conditions. In group IRPC, before testing the upper hand was under partial restriction of blood flow (BFR) for three minutes and after 1 minute reperfusion, motion carried. Data were analyzed using the Shapiro-Wilk test, analysis of variance with repeated measures and Bonferroni test at a significance level of $p \leq 0.05$.

Results: The results showed that plasma lactate concentration and records of sodium bicarbonate + IRPC and sodium bicarbonate conditions were significantly difference compared to placebo + IRPC ($p=0.001$, $p=0.02$, respectively).

Conclusion: According to the research findings, bicarbonate supplementation in IRPC training condition increased force and delay fatigue in submaximal dynamic contraction.

Keywords: Preconditioning, Ischemic Reperfusion, Sodium bicarbonate, Submaximal dynamic force