

بررسی شیوع اختلالات آلرژیک در سینوزیت مزمن کودکان مراجعه کننده به درمانگاه‌های عفونی، ایمونولوژی و آلرژی بیمارستان کودکان امیرکلا در سال ۹۱-۱۳۹۰

علی محمدپورمیر: فوق تخصص عفونی کودکان، بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. mohammadpor200@yahoo.com
 محسن محمدی: دستیار فوق تخصصی عفونی کودکان، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. dr.mohamadi61@yahoo.com
 اناهید دهستانی: پزشک عمومی، بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. dehestani656@yahoo.com
 ایرج محمدزاده: دانشیار، فوق تخصص اسم والرژی، بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (*نویسنده مسئول). irjmoh2000@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۵/۹/۲ | تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۳۰

چکیده

زمینه و هدف: سینوزیت مزمن از بیماری‌های شایع و مزمن دوران کودکی بوده که می‌تواند عوارض زیادی بر جای بگذارد. ریسک فاکتورهای زیادی برای آن در نظر گرفته شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اختلالات آلرژیک می‌باشد. نقش اختلالات آلرژیک در سینوزیت مزمن در حال حاضر به طور کامل مشخص نیست. همچنین تا کنون مطالعه جامعی در این باب در کشورمان انجام نشده است. لذا، در این مطالعه سعی شده است که شیوع اختلالات آلرژیک در کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن بررسی شود.

روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی کودکان ۱۴-۳ ساله (میانگین سنی $2/9 - 6/98$) که با علائم و نشانه‌های سینوزیت مزمن به درمانگاه‌های عفونی و ایمونولوژی بیمارستان کودکان امیرکلا در سال ۹۱-۱۳۹۰ مراجعه نمودند، انجام شده است. حجم نمونه ۱۲۰ نفر در نظر گرفته شده بود و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. افراد بر حسب سن به سه گروه (الف: ۱-۴ سال، ب: ۵-۹ سال، ج: ۱۰-۱۴ سال) تقسیم شدند. اطلاعات توسط پرسش نامه جمع‌آوری شد و توسط نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون‌های آماری مناسب (T-test, Chi square) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: فراوانی کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن در هر گروه سنی مشخص گردید که به ترتیب: گروه الف فراوانی ۳۱ (۲۵/۸٪)، گروه ب فراوانی ۶۷ (۵۵/۸٪) و گروه ج فراوانی ۲۲ نفر (۱۸/۳٪) داشته است. در کل بیماران ۷۹ پسر (۶۵/۸٪) و ۴۱ نفر دختر (۳۴/۲٪) بوده‌اند. توزیع فصل در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب: فصل بهار ۳۱ (۲۵/۸٪)، فصل تابستان ۱۶ (۱۳/۳٪)، پاییز ۳۷ (۳۰/۸٪) و زمستان ۳۶ (۳۰٪) بوده است. شیوع رینیت آلرژیک در کل جمعیت ۳۰٪، شیوع آسم ۱۷/۵٪ و شیوع درمانیت آتوپیک ۰٪ بوده است. شیوع کلی اختلالات آلرژیک ۳۶/۶۶٪ بوده است که در این میان ۱۰/۸۳٪ از کل جمعیت همزمان مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک و ۲۵/۸۳٪ یک اختلال آلرژیک داشته‌اند. ارتباط معناداری بین آسم و سن، جنس و فصل وجود نداشته است. ($P > 0/05$) به دست آمد. رابطه بین رینیت آلرژیک و فاکتورهای نام برده نیز بی‌معنی بوده است.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی سینوزیت مزمن در گروه سنی ۵-۹ سال، جنس مذکر و فصل پاییز بیشتر بوده است. همچنین در میان اختلالات آلرژیک، رینیت آلرژیک بیشترین شیوع را داشته است و مقام دوم مربوط به آسم بوده است. به نظر می‌رسد تشخیص و درمان این بیماری‌ها می‌تواند در پیش‌گیری از ایجاد سینوزیت مزمن مفید باشد.

کلیدواژه‌ها: سینوزیت مزمن، رینیت آلرژیک، آسم، درمانیت آتوپیک، شیوع، طب اطفال

مقدمه

سینوزیت به معنای التهاب سینوس‌های اطراف بینی از بیماری‌های شایع دوران کودکی و نوجوانی است که با مشکلات حاد و مزمن همراه بوده و می‌تواند عوارض جدی ایجاد کند. هم سینوس اتموئیدال و هم سینوس ماگزیلاری در زمان تولد به وجود آمده‌اند ولی فقط سینوس اتموئیدال هوادار می‌شود. سینوس اسفنوئید در ۵ سالگی

ظاهر می‌گردد، درحالی‌که سینوس فرونتال از ۸-۷ سالگی تکامل خود را شروع کرده و تا دوران نوجوانی کامل می‌شود. دهانه خروجی سینوس‌ها باریک است (۳-۱ میلی‌متر) که ترشحات را به واحد استئومئاتال در مئاتوس میانی تخلیه می‌کنند. سینوس‌های پارانازال در حالت نرمال استریل می‌باشند و به کمک سیستم پاک‌سازی موکوسیلیاری، حفظ می‌شوند. برخی از کودکان با

را نمی‌توان نادیده گرفت (۶). سینوزیت حاد و مزمن باکتریال می‌تواند عوارض زیاد و غیرقابل جبرانی را ایجاد نماید. به علت نزدیکی سینوس‌های پارانازال به مغز و چشم‌ها، عوارض جدی داخل مغزی و یا حفره چشم به دنبال سینوزیت حاد باکتریال ممکن است رخ دهد که سیر پیش‌رونده‌ای نیز دارد (۱، ۲، ۷، ۸). از طرفی نقش سینوزیت مزمن در کاهش کیفیت زندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. در مطالعه‌ای ۱۵ فرد بزرگسال مبتلا به سینوزیت مزمن با بیماران مبتلا به دیگر بیماری‌های مزمن مقایسه گشته‌اند که نشان داده شد میزان دردهای بدن و نیز اختلال در عملکردهای اجتماعی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن بیشتر از سایر بیماران مبتلا به دیگر بیماری‌هایی مزمن مانند بیماری احتقانی قلب، آئزین، بیماری‌های مزمن انسدادی ریه یا کمردرد بوده است (۶ و ۹).

ریسک فاکتورهای ایجاد سینوزیت مزمن عبارتند از: رینیت آلرژیک، آسم، انسداد بینی در اثر پولیپ یا جسم خارجی یا تومور، سرکوب ایمنی در اثر بیماری‌هایی چون آگاماگلوبولینمی، ایدز و بیماری گرانولوماتوز مزمن، نقایص ساختاری همچون شکاف کام و نقایص عملکرد سیستم موکوسیلیاری مانند دیس کنزی سیلیاری و سیستمیک فیبروزیس و در نهایت رفلاکس گاستروازوفازیال (۸، ۱۰-۶، ۱۰ و ۱۱). اختلالات آلرژیک ریسک فاکتور مهمی در ایجاد سینوزیت مزمن تلقی می‌شود اما نقش اختلالات آلرژیک در سینوزیت مزمن هنوز به طور دقیق مشخص نمی‌باشد و نتایج متضادی از مطالعات در دسترس می‌باشد. به‌عنوان مثال در مطالعه‌ای تحت عنوان شیوع رینیت آلرژیک در کودکان مبتلا به رینوسینوزیت مزمن که توسط A.R.Sedaghat و همکارانش در بیمارستان کودکان بوستون انجام شده شیوع رینیت آلرژیک حدود ۲۷٪ بوده است (۱۲). در مطالعه‌ای دیگر با عنوان رینوسینوزیت مزمن و آلرژی که توسط Leo و همکارانش در سال ۲۰۰۷ انجام شد میزان شیوع آلرژی ۲۹/۹٪ بوده است اما آن‌ها در اثبات رابطه معنادار بین اختلالات آلرژیک و سینوزیت مزمن ناتوان بوده‌اند

شرایط و استعداد زمینه‌ای خاص دچار سینوزیت مزمن شده که لزوماً عفونی هم نمی‌باشد. هنوز در مورد راه‌های تشخیص و درمان مناسب این بیماری اختلاف نظر وجود دارد (۱).

دو نوع سینوزیت حاد وجود دارد: ویروسی و باکتریال. عفونت‌های ویروسی مجاری تنفسی فوقانی در ۲-۵٪ از بالغین و ۱۳-۶٪ از اطفال منجر به عفونت باکتریال سینوس می‌گردند (۱) که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، منجر به سینوزیت مزمن می‌گردند. علائم سینوزیت اطفال و نوجوانان غیراختصاصی بوده و می‌تواند به صورت احتقان بینی، ترشحات چرکی بینی (یک طرفه یا دو طرفه)، تب و سرفه بروز پیدا کند. طبق نظریه AAP و کمیته سینوزیت، حضور علائم تنفسی فوقانی به صورت ترشح چرکی مداوم، گرفتگی بینی، خلط پشت حلق، درد گلو و مخاط بینی ملتهب از علائم سینوزیت بوده که ادامه آن پس از ۱۰ هفته نشانه سینوزیت مزمن چرکی است (۲) که باید از نظر علل زمینه‌ای و اختلالات همراه احتمالی بررسی شود (۳-۵).

در ایالات متحده اپیدمیولوژی سینوزیت را موازی با اپیدمیولوژی سرماخوردگی تلقی می‌کنند. بروز سرماخوردگی در ایالات متحده ۲-۳ person/year در بالغین و ۶-۸ person/year در اطفال می‌باشد که در ۲-۵٪ از بالغین و ۱۳-۶٪ از اطفال منجر به عفونت باکتریال سینوس می‌گردد که این امر سینوزیت را به یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در بیماران مراجعه‌کننده به پزشکان مراقبت‌های اولیه تبدیل کرده است. در نظرسنجی بهداشت ملی ایالات متحده گزارش شده است که در سال ۲۰۰۹، ۱۱٪ از بزرگسالان مراجعه‌کننده به پزشکان مراقبت‌های اولیه مبتلا به سینوزیت بوده‌اند. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۶ در ایالات متحده انجام گشته بود، برآورد شده بود که میزان ۵/۸ میلیارد دلار از هزینه‌های سلامت سالانه صرف سینوزیت می‌گردد. همچنین سینوزیت و عوارض آن مسئول مراجعه سالانه ۲۳ میلیون نفر به پزشکان مراقبت‌های اولیه و در نتیجه ۲۰ میلیون نسخه آنتی‌بیوتیک بوده است. همچنین نقش سینوزیت در کاهش کیفیت زندگی

شدید پرده تیمپان، بیرون زدگی پرده تیمپان، ترشح چرک واضح در اثر پارگی پرده گوش و یا درد گوش همان طرف)، ۳-پنومونی (تاکی پنه و تب همراه با درگیری ریه در نمای رادیولوژی ساده)، ۴-بیمارانی که در حال مصرف آنتی بیوتیک، داروهای آنتی هیستامین یا داروهای کورتیکواستروئید بودند، می شد. حجم نمونه ۱۲۰ نفر بوده است که نمونه برداری به روش تصادفی ساده انجام شد. در این روش کلیه افراد مراجعه کننده شماره گذاری شده و از بین آنها با روش قرعه کشی انتخاب شدند. اطلاعات در چک لیست جمع آوری و کدگذاری شده و پس از ثبت در جداول طراحی شده وارد نرم افزار آماری SPSS20 شده و توسط آزمون های آماری مناسب (T-test, Chi square) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس توصیف اطلاعات به دست آمده از طریق ارائه جداول فراوانی مربوطه انجام شد. مقادیر $p < 0.05$ از نظر آماری با اهمیت تلقی شده است. میزان هزینه آزمایش های غیر روتین جهت شاخص های افتراقی اضافی در هزینه طرح محاسبه شده و به بیمار تحمیل نشده است. شایان ذکر است اصول بیانیه هلسینکی در مورد حقوق بیمار به طور کامل در اجرای این طرح رعایت شده است.

یافته ها

میانگین سنی کودکان تحت بررسی $2/9 \pm$ (۶/۹۸) (حداقل سن ۳ سال و حداکثر ۱۴ سال) بوده است. افراد برحسب سن به سه گروه (۴-۱ سال، ۵-۹ سال و ۱۰-۱۴ سال) تقسیم شدند که یافته های حاصل از آن را در جدول ۱ مشاهده می نمایید.

با توجه به جدول فوق درصد فراوانی گروه سنی (۵-۹ سال) بیشتر از گروه های سنی دیگر بوده است. در این مطالعه درصد فراوانی پسران مبتلا به

جدول ۱- توزیع سن کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن

گروه سنی	فراوانی	درصد
۱-۴ سال	۳۱	۲۵/۸٪
۵-۹ سال	۶۷	۵۵/۸٪
۱۰-۱۴ سال	۲۲	۱۸/۳٪

(۱۳).

همچنین نتایج حاصله از مطالعه Leo G و همکارانش با نتایج حاصله از مطالعات مشابه دیگر متفاوت بود. به عنوان مثال در مطالعه ای که توسط Richards و همکارانش در سال ۱۹۹۱ در لوس آنجلس انجام شد، شیوع آتوپی در کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن ۶۲٪ بوده است (۱۴).

علی رغم عوارض جدی و متعدد سینوزیت، به نظر می رسد سینوزیت مزمن یک موضوع فراموش شده در طب اطفال باشد و تحقیقات در جهت اتیولوژی و پاتوژنز آن ضعیف و روش های درمانی آن کافی نیست. در بسیاری از موارد علائم تنفسی به علت سینوزیت مزمن علت عفونی نداشته و نیاز به درمان آنتی بیوتیکی ندارد و باید علت زمینه ای بررسی و درمان شود. همان طوری که ذکر شده یکی از علت های زمینه ای مهم در ایجاد سینوزیت مزمن اختلالات آلرژیک می باشد (۱، ۲، ۶ و ۱۵). متأسفانه تاکنون مطالعات جامعی در مورد علل زمینه ای سینوزیت مزمن در کودکان کشور ما صورت نگرفته است. از این رو تصمیم گرفته شد تا با انجام این مطالعه و نتایج آن، راه کاری برای کاربردهای بالینی ارائه گردد.

روش کار

این مطالعه مقطعی بر روی کودکان ۱۴-۳ ساله ای که طبق معیارهای AAP (American Academy of Pediatrics) و کمیته سینوزیت، مبتلا به سینوزیت مزمن بوده و به علت علائم تنفسی فوقانی به مدت بیش از ۱۰ هفته شامل گرفتگی و ترشح چرکی از بینی و خلط پشت حلق و سرفه، به درمانگاه های عفونی و ایمونولوژی بیمارستان کودکان امیرکلا در سال ۹۰-۱۳۸۹ مراجعه کرده و در معاینه ترشح چرکی بینی و قرمزی مخاط بینی داشته و یکی از علائم تب، سردرد، درد گلو و تنفس بدبو در آنها مثبت بود، انجام شد (۱ و ۲). تعدادی از کودکان با توجه به معیارهای خروج از مطالعه خارج گشتند که این معیارها شامل: ۱-لوزه سوم هایپرتروفی (با تایید رادیولوژیست در گزارش)، ۲-اوتیت میانی (تغییر رنگ پرده تیمپان همراه با یک علامت قرمزی

جدول ۲- فراوانی و درصد فراوانی اختلالات آلرژیک بر حسب سن، جنس، فصل

فاکتورهای زمینه ای	اختلال آلرژیک	آسم	مقدار احتمال	رینیت آلرژیک	مقدار احتمال
جنس	پسر	۱۶-٪۲۰/۳	۰/۲۷۱	۲۸-٪۳۵/۴	۰/۷۱
	دختر	۵-٪۱۲/۲		۸-٪۱۹/۵	
فصل	بهار	۵-٪۱۶/۱	۰/۹۷۹	۱۰-٪۳۲/۳	۰/۳۰۷
	تابستان	۳-٪۱۸/۸		۵-٪۳۱/۲	
	پاییز	۶-٪۱۶/۲		۷-٪۱۸/۹	
	زمستان	۷-٪۱۹/۴		۱۴-٪۳۸/۹	
سن	۴-۱	۳۰-٪۹/۷	۰/۳۸۵	۸-٪۲۵/۸	۰/۴۹۴
	۹-۵	۱۴-٪۲۰/۹		۲۳-٪۳۴/۳	
	۱۴-۱۰	۴-٪۱۸/۲		۵-٪۲۲/۷	

بی معنی بوده است. بیشترین مراجعه‌ی جنسیت پسر در بهار ۲۷ نفر (٪۳۳/۸) و بیشترین مراجعه جنسیت زن با ۱۴ نفر (٪۳۵) بود که رابطه‌ی معنی داری بین جنسیت و فصل مراجعه مشخص شد ($p < 0/001$). مراجعه‌ی پسران بیشتر در بهار و دختران بیشتر در پاییز بود.

جدول بالا نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین شیوع رینیت آلرژیک و جنس در این مطالعه مشهود نبود. شیوع رینیت آلرژیک ارتباط بین آن دو بی معنی بوده است. با مشاهده فراوانی رینیت آلرژیک بر حسب فصل، ارتباط بین رینیت آلرژیک و فصل بی معنی بوده است. در مورد درماتیت آتوپیک با توجه به شیوع ٪۰ آن در جامعه تحت مطالعه حاضر، ارزیابی امکان‌پذیر نبوده است.

بحث و نتیجه‌گیری

در این مطالعه شیوع سینوزیت مزمن در فصل پاییز بیشتر از سایر فصل‌ها بوده و زمستان در مقام دوم قرار داشته است. با توجه به این که در منابع مرجع نیز ذکر شده اپیدمیولوژی سینوزیت مزمن موازی است با اپیدمیولوژی سرماخوردگی (۶) و در فصول سرد سال شیوع سرماخوردگی بیشتر است، این نتیجه با منابع موجود هم‌خوانی دارد. در این مطالعه شیوع سینوزیت مزمن در جنس مذکر بیشتر بوده (نزدیک به دو برابر). در مطالعه دیگری که توسط Hamdy El- Hakima و همکارانش در آلتای کانادا انجام شد نیز شیوع سینوزیت مزمن در جنس مذکر بیشتر بوده است (۱۶). همچنین در مطالعه Nguyen و همکارانش نیز شیوع

سینوزیت مزمن با میزان ٪۶۵/۸ بیش از دختران با درصد فراوانی ٪۳۴/۲ بوده است.

ارزیابی سوم بررسی توزیع فصل بیماران مراجعه‌کننده بوده است که بیشترین درصد فراوانی مربوط به فصل پاییز (٪۳۰/۸) بوده و زمستان با درصد فراوانی (٪۳۰) در مقام دوم، بهار با درصد فراوانی (٪۲۵/۸) در مقام سوم و در نهایت تابستان با درصد فراوانی (٪۱۳/۳) در رتبه چهارم قرار گرفت.

درصد فراوانی هر یک از اختلالات آلرژیک مورد بررسی (آسم، رینیت آلرژیک و درماتیت آتوپیک)، در این مطالعه به شرح زیر بوده است. رینیت آلرژیک با درصد فراوانی ٪۳۰ بیش‌ترین شیوع را در کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن داشته است. آسم با درصد فراوانی ٪۱۷/۵ در مقام دوم بوده است. هیچ‌یک از بیماران تحت بررسی، مبتلا به درماتیت آتوپیک نبوده‌اند و شیوع آن در مطالعه حاضر ٪۰ بوده است.

جهت بررسی دقیق‌تر داده‌ها جدول ۲ طراحی شده است تا بتوان در یک نگاه، فراوانی هر یک از اختلالات آلرژیک بر حسب سن، جنس و فصل را مشاهده کرد.

با توجه به نتایج جدول ۲ ارتباط معنی‌داری بین شیوع آسم و جنس در مطالعه حاضر به دست نیامد. همچنین ارتباط معنی‌داری بین شیوع آسم و فصل وجود نداشته است. با مشاهده درصد فراوانی‌های به دست آمده بر حسب گروه‌های سنی و $p = 0/385$ نیز درمی‌یابیم در مطالعه حاضر ارتباط بین شیوع آسم و گروه‌های سنی نیز

در حالی که مطالعه حاضر بررسی شیوع آسم در سینوزیت مزمن می‌باشد که باعث تفاوت در نتایج می‌گردد. در مورد شیوع درماتیت آتوپیک با توجه به اینکه هیچ‌یک از افراد تحت مطالعه حاضر مبتلا به آن نبوده‌اند، ارزیابی غیرممکن بوده است. شیوع کلی اختلالات آلرژیک در این مطالعه ۳۶/۶۶٪ بوده است که در این میان ۱۰/۸۳٪ از کل جمعیت مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک هم‌زمان و ۲۵/۸۳٪ تنها یک اختلال آلرژیک داشته‌اند. در مطالعه‌ای با عنوان رینوسینوزیت مزمن و آلرژی که توسط Leo و همکارانش در میلان ایتالیا انجام شده بود شیوع حساسیت ۲۹/۹٪ بوده است که به نتایج حاصل از مطالعه حاضر نزدیک می‌باشد.

با توجه به یافته‌های فوق نقش اختلالات آلرژیک در سینوزیت مزمن قابل توجه بوده و درمان به موقع و مناسب رینیت آلرژیک و آسم گام مهمی در پیش‌گیری از ایجاد سینوزیت مزمن می‌باشد و ارزیابی کودکان مبتلا به سینوزیت مقاوم از نظر اختلالات آلرژیک زمینه‌ای می‌تواند در درمان کمک‌کننده باشد. در مورد درماتیت آتوپیک به تحقیقات جامع‌تر با جمعیت آماری بزرگ‌تر و طی بازه زمانی طولانی‌تری نیاز است. در مطالعه حاضر شیوع سینوزیت مزمن در فصل پاییز، جنس مذکر و گروه سنی ۵-۹ سال بیشتر بوده است. شایان‌ذکر است برای مشخص کردن ارتباط معنی‌دار بین شیوع سینوزیت مزمن و فاکتورهای سن، جنس و فصل (که جزء اهداف طرح نبوده است) لزوم انجام مطالعه‌ای جامع‌تر با وجود گروه کنترل توصیه می‌گردد.

تقدیر و تشکر

بدین‌وسیله از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان امیرکلا و سرکار خانم فائزه آقاجانیپور که در نگارش این مقاله همکاری صمیمانه‌ای داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

1. Diane E. Pappas, J. Owen Hendley. nusicit nelson textbook of pediatrics, 19th edition, 2011.
2. James D. cherry, Nina L. Shapiro, sinusitis,

سینوزیت در جنس مذکر بیشتر و برابر ۶۲٪ بوده است (۲۹). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع سینوزیت مزمن در گروه سنی ۵-۹ سال بیشتر بوده است که در مطالعه انجام شده توسط Nguyen و همکارانش نیز شیوع سینوزیت مزمن در گروه سنی ۱۰-۶ سال ۷۴٪ و بیش از سایر گروه‌های سنی بوده است (۱۷).

در این مطالعه شیوع رینیت آلرژیک در کودکان مبتلا به سینوزیت مزمن ۳۰,۰٪ بوده است. در مطالعه‌ای تحت همین عنوان که توسط Sedaghat و همکارانش در بیمارستان کودکان بوستون انجام شد این میزان ۲۷٪ بوده است که با نتیجه این مطالعه همخوانی داشته است (۱۲). در این مطالعه شیوع آسم ۱۷/۵٪ بوده است. در مطالعه دیگر که توسط Yoshimura و همکاران در دانشکده پزشکی اوساکای ژاپن انجام شد شیوع آسم در سینوزیت مزمن ۲۳/۱٪ بوده است (۱۸) که به میزان حاصل از مطالعه حاضر نزدیک می‌باشد؛ در عین حال با نتایج حاصله از برخی مطالعات مشابه دیگر که در ایران و دیگر نقاط جهان انجام شد، متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال در مطالعه‌ای تحت عنوان شیوع سینوزیت مزمن در کودکان مبتلا به آسم که توسط Huang و همکارانش در بیمارستان کودکانی در تایوان انجام گرفت شیوع سینوزیت مزمن ۵۴/۷٪ بوده است (۱۹).

در مطالعه دیگری که توسط دکتر احسانی پور و همکارانش در بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران انجام گرفت، شیوع سینوزیت مزمن در کودکان مبتلا به آسم ۷۵٪ بوده است (۲۰). این اختلاف می‌تواند نتیجه اثر فاکتورهای محیطی و منطقه‌ای در شیوع کلی آسم باشد (۶). به طور مثال مطالعه دکتر احسانی پور در شهر تهران انجام شده است که آلاینده‌های موجود در هوای آن (مونواکسید کربن، اکسیدهای ازت، تمامی هیدروکربن‌ها یا ترکیبات آلی فرار، اکسیدهای گوگرد و به طور عمده SO_2)، سرب و اُزن) بسیار بیشتر از هوای منطقه تحت مطالعه حاضر می‌باشد و مسلماً شیوع کلی آسم در تهران بیشتر است.

همچنین در دو مطالعه اول شیوع سینوزیت مزمن در کودکان مبتلا به آسم بررسی شده است

epidemiological study of 553 patients with chronic rhinosinusitis in Japan. *Allergol Int*; 2011 Dec.60(4):491-6.

18. Huang JL, Lin TY, Wang KF. Sinusitis and bronchial asthma in children. Department of Pediatrics, Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan *Zhonghua Min Guo Xiao ErKe Yi XueHuiZaZhi*; 1995 Jan-Feb.36(1):20-320.

19. Ehsani Pour F, Javaher Tarash N, Pir Dehghan A. The prevalence of sinusitis in young Asthmatic patients (2-16y) referred to RasoulAkram Hospital during 1993-2003. *RJMS*; 2005.45(12):31-6.

feigin: Textbook of pediatric in infectious disease, 2009.

3. Leo G, Incorvaia C. The clinical spectrum of rhinosinusitis in children. *International journal of immunopathology and pharmacology*; 2009.23(1 Suppl):24-8.

4. Furukawa CT. The role of allergy in sinusitis in children. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*; 1992.90(3):515-7.

5. Sih T, Mion O. Allergic rhinitis in the child and associated comorbidities. *Pediatric Allergy and Immunology*; 2010.21(1-Part-II):e107-e13.

6. Gwaltney JR. chronic sinusitis, mandell, principles and practice of infectious disease; 2005. v1:683-5.

7. Fisher RG, Boyce TG, Correa AG. *Moffet's Pediatric Infectious Diseases: A Problem-Oriented Approach*. Fifth Edition. 2005

8. Blaiss MS. Pediatric allergic rhinitis: physical and mental complications. *Allergy Asthma Proc*; 2008.29(1):1-6.

9. Hamilos DL. Chronic rhinosinusitis: epidemiology and medical management. *J Allergy ClinImmunol*; 2011 Oct.128(4):693-707.

10. Tan BK, Chandra RK, Pollak J, Kato A, Conley DB, Peters AT, et al. Incidence and associated premorbid diagnoses of patients with chronic rhinosinusitis. *J Allergy ClinImmunol*; 2013 May. 131(5):1350-60.

11. Sedaghat AR, Phipatanakul W, Cunningham MJ. Prevalence of and associations with allergic rhinitis in children with chronic rhinosinusitis. *American Society of Pediatric Otolaryngology Spring Meeting*. Arlington, VA. April 27, 2013.

12. Richards W, Roth RM, Church JA. Under diagnosis and under treatment of chronic sinusitis in children. *ClinPediatr (Phila)*; 1991 Feb.30(2):88-92.

13. Leo G, Piacentini E, Incorvaia C, Consonni D, Frati F. Chronic rhinosinusitis and allergy. *Pediatric Allergy and Respiratory Physiopathology Unit, Istituti Clinici di Perfezionamento, Milan, Italy. Pediatr Allergy Immunol*; 2007 Nov.18Suppl 18:19-21.

14. Milgrom H, Leung DYM. Chapter 137 – Allergic Rhinitis. *Nelson textbook of pediatrics*, 19th edition, 2011.

15. El-Hakima H, Malika AC, Aronykc K, Ledib E, Bhargavad R. The prevalence of intracranial complications in pediatric frontal sinusitis. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*; 2006 Aug.70(8):1383-7.

16. Nguyen KL, Corbett ML, Garcia DP, Eberly SM, Massey EN, Le HT, et al. Chronic sinusitis among pediatric patients with chronic respiratory complaints. *J Allergy Clin Immunol*; 1993 Dec. 92(6):824-30.

17. Yoshimura K, Kawata R, Haruna S, Moriyama H, Hirakawa K, Fujieda S, et al. *Clinical*

The survey of prevalence of allergic disorders in chronic sinusitis of children referred to infectious, immunologic and allergic diseases' clinic of Amirkola children's hospital in 2011-2012

Ali Mohammadpour-Mir, MD, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. mohammadpor200@yahoo.com

Mohsen Mohammadi, MD, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. dr.mohamadi61@yahoo.com

Anahid Dehestani, MD, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. dehestani656@yahoo.com

***Iraj Mohammadzadeh**, MD, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran (*Corresponding author). irjmoh2000@yahoo.com

Abstract

Background: Chronic sinusitis is one of the most common diseases in childhood that can lead to a lot of complications. Many risk factors are considered to be responsible for the disease. An allergic disorder seems to be one of the most important risk factors. The role of allergic disorders in chronic sinusitis is currently unclear. Also no comprehensive study has been done yet in our country. Therefore in this study the prevalence of allergic disorders in children with chronic sinusitis had been evaluated.

Methods: This cross-sectional study was done in children between 3-14 years old (mean age 6.98 +/- 2.9) with signs and symptoms of chronic sinusitis, who had referred to infectious & immunologic clinics of pediatric Hospital of Amir Kola in years of 2011-2012. 120 individuals were considered for our study, the sampling was done randomly. Population was divided by age into three groups (1-4 years, 5-9 and, 10-14 years old). The data were collected by Questionnaire and check list and analyzed by SPSS 20 software and the appropriate statistical tests (T-test, Chi square).

Results: The prevalence of children with chronic sinusitis were identified in each age group as following: (1-4) 31 (25.8%), (5-9) 67 (55.8%) and (10-14) was 22 (18.3%). There were 79 males (65.8%) and 41 females (34.2%) in the total population. Seasonal distribution was evaluated in this study as following: spring 31 (25.8%), summer 16 (13.3%), fall 37 (30.8%) and winter 36 (30%). Prevalence of allergic rhinitis in the general population was 30.0%, Asthma's prevalence was 17.5% and the prevalence of atopic dermatitis was 0% in our study. The overall prevalence of allergic disorders was 36.66%, among which 10.83% of the total population had both asthma and allergic rhinitis and 25.83% had just one of them. There was no significant association between asthma and the age, sex or season ($p < 0.05$). Relationship between allergic rhinitis and the mentioned factors was irrelevant as well.

Conclusion: Our study showed that the prevalence of chronic sinusitis in the (5-9 years) age group, males and the fall season is more. Allergic rhinitis had the most prevalence among allergic disorders; asthma was the second most common. It seems diagnosis and treatment of these diseases can be helpful in prevention and the development of chronic sinusitis.

Keywords: Chronic sinusitis, Allergic rhinitis, Asthma, Atopic dermatitis, Prevalence, Pediatrics