



تأثیر فعالیت ورزشی هوازی در طی بارداری بر بیان ژن *BCL-2*, *BAX* و *eNOS* در عروق فرزندان نر بالغ موش

اعظم عبداله پور: دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

حمدیجی: استاد و متخصص فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) hrajabi@knu.ac.ir

گانیانی: استاد و متخصص فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد صوفی آبادی: دانشیار و متخصص فیزیولوژی، مرکز تحقیقات سالوی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

ندا خالدی: استادیار و متخصص فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

کلیدواژه‌ها

فعالیت ورزشی هوازی،
بارداری،
آپوپتوzu،
عملکرد اندوتیال

تاریخ دریافت: ۹۸/۰۱/۲۵
تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۴/۲۲

زمینه و هدف: تغییر در عملکرد عروق به عنوان شاخصی برای بیماری‌های عروقی در نظر گرفته می‌شود. از عوامل موثر بر عملکرد عروق آنزیم *eNOS* و فاکتورهای تنظیم کننده آپوپتوzu عروق شامل *BCL-2* و *BAX* می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات هوازی در دوران بارداری بر بیان ژن *eNOS* و *BCL-2* و *BAX* عروق فرزندان نر موش بود.

روش کار: در این پژوهش مداخله‌ای و روش تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل ۱۰ سر موش ماده هفت‌ماهی نژاد اسپراگ داولی به طور تصادفی به دو گروه تمرینی (*T*) ($8/9 \pm 221 \text{ گرم}$) و کنترل (*C*) ($12/8 \pm 223 \text{ گرم}$) تقسیم شدند. فعالیت ورزشی هوازی بارداری بلافضلله بعد از مشاهده پلاک واژی به مدت ۲۱ روز و ۵ جلسه در هفته با شدت متوسط (۳۵–۴۵ درصد $\text{VO}_{2\text{max}}$) روی نوارگردان انجام شد، و ۲ روز قبل از زایمان خاتمه یافت. بافت برداری از شریان فمور یچه موش‌های نر در سن ۸ هفته‌گی انجام شد. آزمون *t* مستقل جهت مقایسه بین گروه‌ها در سطح معنی‌داری $P \leq 0.05$ با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.

یافته‌ها: فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط در حین بارداری باعث افزایش معنی‌دار در بیان ژن *BCL-2* ($p=0.004$) و کاهش معنی‌دار در بیان ژن *BAX* ($p=0.000$) در بجه موش‌های نر شد، ولی تفاوت معنی‌داری در بیان ژن *eNOS* ($p=0.494$) ایجاد نکرد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد فعالیت ورزشی هوازی در دوران بارداری می‌تواند میزان آپوپتوzu و در نتیجه احتمال اختلال عملکرد عروق را در فرزندان بالغ موش کاهش دهد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.
منبع حمایت کننده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شیوه استناد به این مقاله:

Abdolahpour A, Rajabi H, Gaeini A, Sofiabadi M, Khaledi N. The effect of aerobic exercise during pregnancy on vascular *BCL-2*, *BAX* and *eNOS* Gene expression in adult male offspring rat. Razi J Med Sci. 2019;26(5):56-66.

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با [CC BY-NC-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/) صورت گرفته است.



Original Article

The effect of aerobic exercise during pregnancy on vascular *BCL-2*, *BAX* and *eNOS* gene expression in adult male offspring rat

Azam Abdolahpour, PhD Student in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

✉ Hamid Rajabi, PhD, Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran (*Corresponding author) hrabaj@knu.ac.ir

Abbasali Gaeini, PhD, Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Tehran University, Tehran, Iran

Mohammad Sofiabadi, PhD, Associate Professor of Physiology, Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

Neda Khaledi, PhD, Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

Abstract

Background: Change in vascular function is considered to be an indicator for vascular disease. Effective factors on vascular function are enzyme eNOS and apoptotic regulator factors including *BCL-2* and *BAX*. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise during pregnancy on vascular gene expression of *BCL-2*, *BAX*, and *eNOS* in Sprague Dawley rats offspring.

Methods: Ten 8-week-old female Sprague Dawley rats were randomly divided into two groups of exercise during pregnancy (T) (221 ± 9.9) and sedentary (C) (223.8 ± 8). The aerobic exercise training was performed immediately after observation of the vaginal plaque for 21 days and 5 sessions per week with moderate intensity (35-45% $\text{VO}_{2 \text{ max}}$). About 2 days before delivery, their training program was terminated. Femoral artery samples were collected at 8 weeks of male offspring age. Data was analyzed with independent t-test for between group comparisons. The level of significance was set at $p<0.05$. Statistical analyses were carried out using the SPSS software (version 16).

Results: The results of the study showed that 21 days of aerobic exercise training with moderate intensity during pregnancy increased significantly mRNA of the *BCL-2* gene ($P=0.004$), decreased significantly mRNA of the *BAX* gene in male offspring ($p=0.000$), but there was no significant change in mRNA of the *eNOS* gene ($p=0.494$).

Conclusion: It seems that moderate aerobic exercise during pregnancy can reduce apoptosis as a result of vascular dysfunction in adult offspring.

Conflicts of interest: None

Funding: Qazvin University of Medical Sciences

Keywords

Aerobic exercise,
Pregnancy,
Apoptosis,
Endothelial function

Received: 13/04/2019

Accepted: 13/07/2019

Cite this article as:

Abdolahpour A, Rajabi H, Gaeini A, Sofiabadi M, Khaledi N. The effect of aerobic exercise during pregnancy on vascular *BCL-2*, *BAX* and *eNOS* gene expression in adult male offspring rat. Razi J Med Sci. 2019;26(5):56-66.

This work is published under CC BY-NC-SA 3.0 licence.



مقاله پژوهشی

مقدمه


می شود. سیگنالینگ آپوپتوزی، مسیرهای سیگنالینگ اختصاصی به راه می اندازد که شامل فعالیت پروتئازها می باشد، که با تغییرات ویژگی های مورفولوژیکی دنبال می شود. این تغییرات شامل تغییض هسته و سیتوپلاسم، تورم غشاء سیتوپلاسمی، تخریب DNA و در نهایت تکه تکه شدن سلول به اجسام آپوپتوزی که در انتهای این اجسام فاگوسیتوز می شوند. شروع آپوپتوز در اثر القاء سیگنالینگ مرگ شامل Fas، TNF- α و گونه های فعال اکسیژن می باشد (۱۸).

مطالعات نشان می دهد که NO در غلظت های فیزیولوژیکی از مرگ سلول های اندوتیال که به وسیله محرك های گوناگون شامل TNF- α و گونه های فعال اکسیژن تحریک می شوند، جلوگیری می کند (۱۹). پروتئین ضد آپوپتوزی BCL-2 تنظیم کننده بالا دستی فعالیت BAX می باشد. در سلول های سالم، BAX به صورت مونومر هایی در سیتوزول و غشاء بیرونی BAX مرتبط شده و فعالیت آن را سرکوب می کند و به این شکل از انتشار ستوکروم C از میتوکندری به سیتوپلاسم و شروع آپوپتوز جلوگیری می کند (شكل ۲۰).

در حال حاضر مهم ترین علت مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، بیماری های قلبی و عروقی (CAD=Coronary artery disease) است (۲۱). نظر به اینکه خطر گسترش بیماری های قلبی - عروقی از محیط رحم شروع می شود، تعیین نقش فعالیت ورزشی در جلوگیری از گسترش بیماری های قلبی - عروقی فرزند حیاتی است (۲۲). در همین راستا به نظر می رسد رفتار مادران در دوران بارداری سلامت فرزند را در دوران بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات نشان داده است که در پاسخ به فعالیت ورزشی مادر طی دوران بارداری، خطر بیماری های قلبی - عروقی و سرطان در فرزندان کاهش یافته است (۲۳). مشخص شده است که انجام فعالیت ورزشی طولانی بیان ژن NOS3 را در سلول های اندوتیال آثورت موش افزایش می دهد (۲۴). از طرفی به خوبی مشخص شده است که افزایش

دوران بارداری از بخش های مهم زندگی زنان به حساب می آید که می تواند از جوانب مختلف از جمله فعالیت بدنی (۱) بر سلامت نوزاد موثر باشد (۲-۳). تحقیقات نشان داده اند که می توان با تغذیه مطلوب و فعالیت زنان در دوران بارداری و قبل از آن از ابتلای نوزادان به بسیاری از بیماری های متابولیکی (۲-۴) و قلبی عروقی (۵) به میزان زیادی جلوگیری کرد. به نظر می رسد فعالیت بدنی می تواند در دوران بارداری بدون دخالت ترکیبات شیمیایی، موجب تغییرات بلندمدت در فنوتیپ و در نتیجه سلامت دوران جنینی و بزرگسالی شود (۲-۴). در مطالعه ای تغییرات استئوژنیک و نیمرخ لیپیدی فرزندان در پی فعالیت ورزشی ارادی مادر حین بارداری مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج مثبتی را نشان داد (۶). همچنین بهبود هموستاز گلوكز و حساسیت به انسولین (۷ و ۸) بهبود عملکرد شناختی و جلوگیری از اختلال متابولیک در پیه رتها در پی فعالیت ورزشی دوران بارداری مشخص شده است (۹-۱۰). برخی تحقیقات تیز نشان داده اند که فعالیت ورزشی در زمان بارداری بر شاخص های مختلف سلامت جنین، شامل رشد، استرس، وزن هنگام تولد، موثر است (۱۰-۱۲). همچنین مشاهده شده است که فعالیت بدنی بر تعداد سلول های خونی بندناف که در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود اثرگذار می باشد (۹).

مطالعات زیادی ارتباط حیاتی بین سلامت عروق و استعداد ابتلا به بیماری های گرفتگی عروق را نشان می دهد (۱۳ و ۱۴). در حقیقت تغییر در عملکرد عروق به عنوان یک شاخص برای بیماری های عروقی در نظر گرفته می شود (۱۵ و ۱۶). در این راستا اسید نیتریک (Nitric Oxide-NO) یکی از عواملی است که برای عملکرد طبیعی انوتولیوم عروق، حیاتی است (۱۷). زیرا تعداد زیادی از مطالعات نقش ضد آپوپتوزی و محافظت کننده NO در سلول های اندوتیال را نشان داده است. آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول، با حوادث بیوشیمیایی و ساختاری متفاوتی از نکروز مشخص



شکل ۱- مسیر سیگنالینگ آپوپتوز و نقش ضدآپوپتوزی NO

همچنین سطوح پروتئین *BCL-2* در گروه آزمایشی بالاتر و سطوح پروتئین *BAX* پایین تر از گروه کنترل بوده است (۲۸). تحقیقات اخیر نشان می دهد که نسبت *BAX/BCL-2* بطور معنی داری با افزایش سن تنظیم مثبت می شود و به طور مشخصی انجام تمرینات ورزشی باعث کاهش این نسبت در بطن چپ می شود (۲۹). این اطلاعات اشاره می کند که قلب مسن نسبت به قلب جوان مستعد آپوپتوز می باشد و تمرینات ورزشی دراز مدت فعالیت ضد آپوپتوزی را در قلب مسن ایجاد می کند (۳۰). همچنین در مطالعه ای مشخص شد شش هفته فعالیت بدنسازی در آب منجر به کاهش معنی دار در بیان ژن کاسپاز ۳ در بافت میوکاردی موش ها شد که نشان دهنده کاهش آپوپتوز در بیماری های قلبی می باشد (۳۱).

با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی بر سلامت قلب - عروق، توجه به فعالیت ورزشی در دوران بارداری و بررسی اثرات آن بر فرزندان یکی از عنوانیون بحث برانگیز و پیچیده می باشد. بنابراین نیاز به تحقیقات مناسب در زمینه اثر تمرینات هوازی مادر بر سلامت قلب و عروق فرزندان به عنوان مکانیزم احتمالی کاهش آپوپتوز درسلول های اندوتیال و حفظ یکپارچگی سلول ها و

در جریان خون در حین فعالیت ورزشی منجر به تغییرات اصطکاکی در اندوتیلیوم می شود که فراهمی زیستی NO را از طریق تنظیم مثبت ژن آنزیم *eNOS* افزایش می دهد که منجر به عملکرد بهتر اندوتیال شده و اثرات محافظت کننده در برابر گرفتگی عروق در فرزندان پس از تولد داشته است (۲۵). در مجموع، تغییرات ناشی از فعالیت ورزشی در ساختار اندوتیال و زیست شیمی آن به وسیله افزایش در استرس برشی ایجاد می شود که اجازه می دهد مکانیزم های محافظتی از قبیل آنزیم های آنتی اکسیدان و فاکتورهای ضد آپوپتوز تنظیم مثبت شده و فاکتورهای پیش آپوپتوز تنظیم منفی شوند (۲۶).

در پژوهشی اثر تمرینات استقامتی بر بیان ژن *BCL-2* و *BAX* در قلب موش ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیان ژن *BAX* و نسبت *BAX/BCL-2* در گروه تمرین پایین تر بود اما مقدار *BCL-2* تفاوت معنی داری نداشت (۲۷). در مطالعه دیگری اثر تمرینات هوازی بر میزان آپوپتوز در قلب هایپرتروفی شده مرضی مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که انجام فعالیت هوازی در موش های پرقشار خون در مقایسه با گروه کنترل منجر به افزایش بیان ژن *eNOS* شده و

کردن، و در انتهای هر جلسه نیز به مدت ۱ دقیقه و با سرعت ۸ متر بر دقیقه به منظور سرد کردن، بر روی تردیل دویدند. پروتکل اصلی تمرین هفته اول با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه شروع شد، و در هفته سوم به ۱۲ متر بر دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه رسید. به منظور جلوگیری از اعمال فشار ناگهانی ابتدای هر هفته به مقدار یک متر بر دقیقه به سرعت، و هر دو تا سه روز نیز به مقدار دو تا سه دقیقه به زمان دویدن اضافه شد (جدول ۱). در تمام دوران تمرین سعی بر این بود که هیچ گونه استرسی به رتهای باردار وارد نشود و حیوانات تنها با تیمار دم تحریک به دویدن می‌شدند. در انتهای نیز با توجه به شرایط ظاهری موش‌ها، دو روز قبل از زایمان از پروتکل خارج شدند تا آماده زایمان شوند (۲۶). گروه کنترل هم مشابه گروه تمرین در طول مدت بارداری هر هفته ۵ جلسه برروی تردیل خاموش در ساعتهاي مشخص قرار می‌گرفتند تا در شرایط مشابه گروه تمرینی قرار بگیرند. به طور میانگین از هر مادر حدود ۱۲ موش متولد شد. ابتدای هر هفته وزن موش‌ها و غذای مصرفی آن‌ها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقیقه ۰/۰۱ گرم (A&D) از ترازوی EK5100i Japan (PND = ۲۱) نوزادان از شیر گرفته و بچه موش‌های نر و ماده هر مادر از هم جدا شدند و تا هشت هفتگی (PND = ۵۶) مراقبت شدند. سپس بچه موش‌های نر با ترکیب کتامین-زایلازین (۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و ۵ میلی گرم بر کیلوگرم) بیهوده شده (۳۴) و شربان فمور موش‌ها در شرایط استریل جدا، داخل میکروتیوب‌های RNS/DNS free و سپس داخل تانک نیتروژن مایع قرار گرفته و برای آزمایش‌های بعدی به فریزر با دمای -۸۰ درجه سانتی‌گراد انتقال یافتند.

اطلاعات مربوط به توالی ژن‌های مورد مطالعه با استفاده از بانک اطلاعاتی Primer3 و NCBI و جستجوی بهترین پرایمر فروارد و ریورس، سپس ارزیابی کیفیت و اختصاصی بودن پرایمرهای طراحی شده با استفاده از پرایمر بلاست، و در نهایت بررسی احتمال تشکیل دایمر توسط نرم افزار ژن رائز انجام شد. بعد از طراحی پرایمر، از روش Real Time PCR برای بررسی بیان ژن‌های eNOS و BAX با استفاده

در نتیجه بهبود عملکرد اندوتیال و کاهش احتمال ابتلاء به گرفتگی عروق احساس می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با توجه به نبود پژوهش‌های کافی در این زمینه، با هدف بررسی تاثیر فعالیت هوایی مادر به عنوان مداخله‌ای ایمن و پیشگیری کننده در دوران بارداری بر مقادیر بیان ژن eNOS و Bax در عروق فرزندان موش نر انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع مداخله‌ای و روش تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل بود. ۱۰ سر موش صحرایی ماده نژاد اسپراغدولی با ۶ هفته سن و میانگین وزنی ۱۶۰ گرم، از مرکز انسستیتو پاستور رازی (کرج) خریداری و بعد از انتقال به حیوان‌خانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دوره‌های ۱۲:۱۲ ساعت روشناختی و تاریکی، دسترسی آزاد به آب و غذا، درجه حرارت محیط 23 ± 1 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 50 ± 10 درصد نگهداری شدند. تمام آزمایش‌ها بر اساس دستورالعمل کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طراحی گردید (کد اخلاق: IR.QUMS.REC.1396.288). حیوانات بعد از رسیدن به وزن مطلوب برای بارداری (۸ هفته سن و وزن تقریبی 222 ± 10 گرم) به طور تصادفی به گروه‌های تمرین حین بارداری (T) و کنترل (C) تقسیم گردیدند. یک هفته قبل از بارداری موش‌ها به مدت ۳ دقیقه با سرعت ۸ متر بر دقیقه با انجام فعالیت دو روی دستگاه تردیل با نحوه انجام کار آشنا شدند. بعد از یک هفته آشناشی با تردیل، موش‌های ماده هر گروه به صورت جداگانه برای جفت‌گیری در کنار موش‌های نر قرار گرفتند. روز مشاهده پلاک واژیتال بعنوان روز اول بارداری در نظر گرفته شد (۳۲) و بالاصله موش‌های باردار وارد پروتکل تمرین هوایی به مدت ۲۱ روز شدند. برنامه فعالیت هوایی حین بارداری موش‌ها بر روی تردیل و بدون شبی اجرا شد. شدت فعالیت متوسط (۳۵ تا ۴۵ درصد VO_{2max}) بر اساس سرعت دویدن روی تردیل مشخص شد (۳۳). فعالیت هوایی به مدت تقریبی ۲۱ روز، ۵ روز در هفته و روزانه یک جلسه انجام شد. در ابتدای هر جلسه موش‌ها به مدت ۳ دقیقه و با سرعت ۸ متر بر دقیقه به منظور گرم

جدول ۱- جدول پروتکل تمرين هوایی در حین بارداری

هفته سوم بارداری	هفته دوم بارداری	هفته اول بارداری
زمان دویدن: ۳۰ دقیقه	زمان دویدن: ۲۰ دقیقه	زمان دویدن = ۱۰ دقیقه
سرعت دویدن: ۱۲ متر بر دقیقه	سرعت دویدن: ۱۱ متر بر دقیقه	سرعت: ۱۰ متر بر دقیقه

جدول ۲- پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش

Factors	Primer forward and reverse	Size(bp)
BCL-2	FW5'- GGGAGAGTCACACAGGGAGA-3' Rv5- CTTCAGAGACAGCCAGGAGA-3'	177
BAX	FW5'- GCAAACACTGGTGCTCAAGG-3' Rv5'- CAGCCACAAAGATGGTCA-3'	183
eNOS	FW5'- ACAGCCAACACACCAAGTC-3 Rv5- CTGGGTCATGGATTGCTTG-3	196
GAPDH	FW5'- AAGTTAACCGGCACAGTCAGG-3 Rv5' – CATACTCAGCACCAGCATCACC	121

گرفتند (۳۶). کارایی پرایمرهای بعد از تهیه رقتها ۱ به ۱۰ از ژن ها و با استفاده از منحنی استاندارد، همان گونه که در فرمول مشخص شده است، ارزیابی شد.

(مرجع) - $\Delta Ct = Ct$ (ژن هدف) - Ct (ژن کنترل)
 $\Delta\Delta Ct = \Delta Ct - (\text{نمونه تجربی} - \Delta Ct)$
 میزان تغییرات بیان ژن نسبت به گروه کنترل = $2^{-\Delta\Delta Ct}$

جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو-ولیک استفاده شد و برای مقایسه تفاوت گروه ها از آزمون t مستقل استفاده شد. سطح معنی داری برای تمامی گروه ها $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 16 (IBM Crop., Armonk, NY, USA) انجام شد.

یافته ها

نتایج آزمون شاپیرو-ولیک طبیعی بودن توزیع داده ها را در دو گروه آزمایشی و کنترل نشان داد (جدول ۳). در ادامه از آزمون t مستقل جهت بررسی موارد مورد نظر استفاده شد. با توجه به عدم معنی داری آزمون لوین از آزمون t مستقل با فرض تساوی واریانس ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر *BCL-2 mRNA* در شریان فمور فرزندان نر گروه تمرين حین بارداری (0.00023 ± 0.0001) بیشتر از میانگین گروه کنترل (0.0002 ± 0.00073) می باشد ($p < 0.004$). لذا، به نظر می رسد فعالیت هوایی

از محلول کیازول (۱ میلی لیتر) (ترایزول ساخت شرکت کیاژن) (Cat # ۷۹۳۰۶)، و به صورت دستی هموژن شدند. سپس طبق دستور العمل شرکت کیاژن، و با شستشو توسط کیازول (ترکیب فنولی)، RNA کل از بافت های هموژن شده استخراج گردید. به منظور بررسی درجه خلوص RNA استخراج شده، از دستگاه نانودرایپ استفاده شد، و مشخص شد که A_{260}/A_{280} که نزدیک به ۲ می باشد.

در مرحله بعد، سنتز cDNA از روی RNA های استخراج شده با استفاده از دستورالعمل کیت Aid First Strand Revert cDNA Synthesis Kit (Cat# K1622) (Thermo scientific)، انجام شد. سپس cDNA سنتز شده جهت انجام واکنش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار گرفت. ژن های *BCL-2*, *eNOS* و *BAX* به روش quantitative Real time PCR و با استفاده از ژن کنترل GAPDH مورد بررسی قرار گرفتند (۳۵). جفت بازه های موجود در پرایمرهای استفاده شده در جدول ۲ آورده شده است. فرایند تکثیر شامل یک چرخه با ۹۵ درجه سانتی گراد برای ۱۰ دقیقه جهت واسرشتنگی اولیه cDNA ساخته شده، و ۴۰ چرخه دو مرحله ای برای هر چرخه Real-Time PCR می باشد که به صورت ۹۵ درجه سانتی گراد برای ۱۵ ثانیه، و ۶۰ درجه سانتی گراد برای ۶۰ ثانیه تنظیم شدند. نسبت بیان ژن های مورد بررسی در این مطالعه، با روش مقایسه ای چرخه آستانه و با استفاده از فرمول $(\Delta\Delta Ct)^{-2}$ مورد ارزیابی قرار


جدول ۳- بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها

Shapiro-Wilk			گروه‌ها	متغیرها
Sig.	Df	Statistic		
0.117	6	0.185	تمرین	BCL-2
0.170	5	0.194		
0.050	6	0.192	تمرین	BAX
0.141	5	0.190		
0.146	6	0.191	تمرین	eNOS
0.167	5	0.194		

جدول ۴- مقایسه mRNA ژن‌های eNOS, BAX, BCL-2 در بافت عروق دو گروه کنترل و تمرین

*P	Df	t	انحراف استاندارد	میانگین	گروه	متغیر
*0.004	10	3.797	0.00010	0.00023	تمرین	BCL-2
*0.000	10	5.467	0.00020	0.00073	کنترل	BAX
0.494	9	0.710	0.00011	0.00028	تمرین	eNOS

*شاندهنده تفاوت معنی‌دار با گروه کنترل




نمودار ۳- تفاوت eNOS mRNA بین گروه تمرین و کنترل

از طرفی مقایسه میانگین مقادیر بیان mRNA eNOS بین گروه تمرین حین بارداری $\pm 0.00028 \pm 0.00011$ و گروه کنترل ($p < 0.00027$) با سطح معنی‌داری $p < 0.05$ نشان داد که میانگین‌ها با هم تفاوت معنی‌داری ندارند ($p < 0.494$). (نمودار ۳).


بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر که به دنبال بررسی تغییرات بیان برخی ژن‌های مرتبط با گرفتگی عروق فرزندان موشاهی نر مادران فعال در دوران بارداری بود، نشان داد که یک دوره فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط در دوران بارداری موجب افزایش معنی‌دار بیان ژن BCL-2 و کاهش معنی‌دار بیان ژن BAX در گروه تمرین حین بارداری و عدم تفاوت معنی‌دار در بیان ژن eNOS بین دو گروه تمرین حین بارداری و گروه کنترل

با شدت متوسط حین بارداری می‌تواند بیان ژن BCL-2 را بطور معنی‌داری افزایش دهد (جدول ۴) (نمودار ۱). همچنین نتایج تحقیق با سطح معنی‌داری $p < 0.05$ نشان داد که میانگین مقادیر BAX mRNA در شریان فمور فرزندان نر گروه تمرین حین بارداری (0.1606 ± 0.0495) کمتر از میانگین گروه کنترل (0.3090 ± 0.0443) است ($p < 0.001$). لذا، انجام فعالیت هوازی با شدت متوسط حین بارداری بیان ژن BAX را بطور معنی‌داری کاهش می‌دهد (جدول ۴) (نمودار ۲).



نمودار ۱- تفاوت BCL-2 mRNA بین گروه تمرین و کنترل



نمودار ۲- تفاوت BAX mRNA بین گروه تمرین و کنترل

معنی دار ضربان فشار همراه است. این موضوع در سراسر سیکل قلبی یک افزایش کشش ریتمیک اندوتیال و عضلات صاف عروقی را ایجاد می کند و مطالعات پیشنهاد می کند که این کشش ریتمیک یک فوتیب سلول اندوتیال ضد آتروزئنیک را از طریق تنظیم مثبت eNOS mRNA، پروتئین و فعالیت ذاتی آنزیمی ایجاد می کند (۱۴). در خصوص بررسی اثر فعالیت ورزشی در دوران بارداری بر عملکرد اندوتیال بچه ها مشخص شد در نوزادان ماده خوک مادران فعال پاسخ استراحتی وابسته به اندوتیلیوم (برادی کینین) در زمان تولد بیشتر از گروه بی تحرک بود (۱۶) و شل شدن سلول های عضلات صاف عروق در واکنش به نیترو پروسید سدیم کاهش یافت (۲۲). انجام فعالیت ورزشی در دوران بارداری باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون جنین می شود. روشن است که تغییر در محرك همودینامیک می تواند منجر به تنظیم تغییرات اپی ژنتیکی شامل متیلاسیون DNA و تغییرات هیستون ها شود. افزایش نیروی برشی اریتروسیت های در حال حرکت در مواجهه با اندوتیلیوم، میزان فعالیت زیستی NO را از طریق تنظیم مثبت و افزایش فعالیت ذاتی eNOS، افزایش می دهد (۱۶).

یکی دیگر از یافته های مشاهده شده در پژوهش حاضر افزایش معنی دار در بیان ژن BCL-2 و کاهش معنی دار در بیان ژن BAX در شریان فمور بچه موش - های نر بود. همان طور که اشاره شد فعالیت ورزشی با زیاد کردن جریان خون و استرس برشی منجر به افزایش تولید NO و تنظیم مثبت ذاتی فعالیت آنزیم eNOS می شود (۳۹). یکی از اثرات NO تاثیر بر میزان BCL-2 و BAX می باشد. پروتئین های خانواده BCL-2 مسیر آپوپتوز درونی را تنظیم می کنند. این پروتئین ها به دو زیر گروه تقسیم می شوند شامل پروتئین های ضد آپوپتوز مثل BCL-x ، BCL-2 و پروتئین های پیش آپوپتوزی مثل BAX. در سلول های سالم، BAX به صورت مونومرها یی در سیتوزول و غشاء بیرونی میتوکندری قرار دارد. پروتئین های ضد آپوپتوز BCL-2 و BCL-xl تنظیم کننده های بالادستی فعالیت BAX هستند. در سلول های سالم، پروتئین های ضد آپوپتوز، با BAX و BAK مرتبط شده و فعالیت آنها را سرکوب می کنند

در بافت رگ فمور فرزندان نر موش ها شد. تاکنون مطالعه ای یافت نشده است که به بررسی تاثیر فعالیت ورزشی هوازی دوران بارداری بر بیان ژن BCL-2، eNOS و BAX پرداخته باشد ولی در مطالعات جداگانه ای تاثیر فعالیت ورزشی در زمان بارداری بر عملکرد سلول های اندوتیال و عضلات صاف عروق فرزندان موش ها مورد بررسی قرار گرفته است (۱۶ و ۲۲). بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیان ژن eNOS در رگ فمور بچه موش های نر گروه مادران فعال در دوره بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نداشت. نتایج حاصل از تحقیق در رابطه با اثر فعالیت ورزشی بر بیان ژن eNOS در موش های غیر باردار نشان می دهد که ۴ هفته تمرین ورزشی موش ها سطوح پروتئین eNOS را در بافت آئورتی افزایش داده است (۳۷). همچنین در پژوهش دیگری که بر روی موش ها انجام شد پس از ۳ هفته فعالیت ورزشی مقدار eNOS mRNA در بافت بطן چپ قلب افزایش یافت (۳۸). در پژوهش حاضر در ظاهر بیان ژن eNOS افزایش معنی داری نداشت اما می توان احتمال داد که یا توجه به پژوهش های مرتبط، افزایش در فعالیت ذاتی eNOS فعال اتفاق افتاده باشد، بدون اینکه نیاز به افزایش در مقدار آن باشد. در نتیجه میزان NO غیر فعال را کاهش داده و میزان قابلیت زیستی NO را افزایش می دهد (۳۹).

سطح eNOS در سلول های اندوتیال به طور موثری بوسیله تغییر در ثبات eNOS mRNA تنظیم می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که فعالیت eNOS از طریق فسفوریلاسیون آن تنظیم می شود. جایگاه های متفاوتی در eNOS می تواند فسفوریله شود که جایگاه مهم آن ser1177 در eNOS در انسان می باشد. این جایگاه به سرعت در اثر استرس برشی فسفوریله می شود (۴۰). فسفوریله شدن این جایگاه بر اثر استرس برشی به وسیله فعال شدن مسیر AKT و PKA (۴۱) اتفاق می افتد. فعالیت ورزشی افزایش قدرتمندی در جریان خون به قلب و عضلات ایجاد می کند. این افزایش ها در جریان خون در طی فعالیت ورزشی نیروی استرس برشی را ایجاد کرده و همان طور که اشاره شد منجر به افزایش فعالیت ذاتی آنزیم eNOS می شود (۱۴). افزایش جریان خون در طی ورزش همچنین با افزایش

پیش زمینه شروع گرفتگی عروق می‌باشد، جلوگیری می‌کند.

با استناد به نتایج به دست آمده از این پژوهش و توجه به نتایج مطالعات پیشین می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت هوایی مادر در دوران بارداری احتمال ابتلا به گرفتگی عروق و در نتیجه اختلال عملکرد عروق فرزندان را در دوران بزرگسالی کاهش دهد.

با توجه به وجود محدودیت در زمینه مالی، امکان استفاده از نمونه‌های بیشتر و اندازه‌گیری سایر ژن‌های مرتبط با آپوپتوz امکان‌پذیر نبود.

البته جهت نتیجه‌گیری بهتر پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های دیگری با القاء گرفتگی عروق در بچه موش‌های نر انجام شده و در آن عوامل دیگری که بر میزان آپوپتوz اثرگذار است بررسی شود (اندازه گیری افزایش نمونه‌های شوک حرارتی، اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانتی، اندازه گیری فعالیت کاسپاز^(۳)).

تقدیر و تشکر

این پژوهش برگفته از طرح تحقیقاتی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌باشد که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶، با کد ۱۵۱۰۷ تصویب شده است. در این راستا از تمام عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش همیاری کردند کمال تشکر را دارم. از جناب آقای دکتر پیمانی، معاون پژوهشی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جناب آقای دکتر رجایی و دکتر فروغی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین، و خانم ریحانه زرباف دکتری فیزیولوژی ورزشی که شرایط تسهیل انجام این پژوهه را فراهم کردند بسیار سپاسگزارم.

References

- Eclarinal JD, Zhu S, Baker MS, Piyarathna DB, Coarfa C, Fiorotto ML, et al. Maternal exercise during pregnancy promotes physical activity in adult offspring. The Federation of American Societies for Experimental Biology. FASEB J; 2016.30(7):2541-8.
- Zhang J, Zhou X, Yuan H, Niu Y, Di F, Fu L. Paternal lifestyle influence susceptibility to high-fat diet-induced metabolic disorders among male offspring of C57BL/6 mice. Int J Clin Exp Med; 2017.10(1):1715-24.
- Laker RC, Wlodek ME, Connelly JJ, Yan Z.

(۴۲). در خصوص تاثیر فعالیت ورزشی در زمان غیربارداری

بر بیان ژن‌های BCL-2 و BAX مطالعاتی موجود است. در مطالعه اشار جعفری مشخص شد که انجام سه ماه فعالیت ورزشی هوایی توسط موش‌ها بیان ژن پروتئین پروآپوپتوz BAX در میوسیت‌های قلبی را کاهش داد که همراستا با تحقیق حاضر است اما تغییری در بیان ژن BCL-2 ایجاد نشد (۲۷). در مطالعه دیگری اثر تمرینات هوایی بر میزان آپوپتوz در قلب هایپرتروفی شده مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد بیان ژن eNOS و سطوح پروتئین BCL-2 افزایش داشته و سطوح پروتئین BAX کاهش را نشان می‌دهد که با نتایج این پژوهش همراستا می‌باشد (۲۸).

NO از چند مسیر منجر به کاهش آپوپتوz سلول‌های اندوتیال می‌شود. بر اساس مطالعات مشخص شده است که NO از طریق اس-نیتروزیله کردن کاسپاز ۳ و ۱۳ در سلول‌های اندوتیال مانع از فعالیت بخش پروتئاز کاسپازها شده و از بروز آپوپتوz جلوگیری می‌کند (۴۳). همچنین NO سطوح بیان ژن BCL-2 را افزایش داده و مانع از قابلیت نفوذ پذیری منافذ غشاء میتوکندری شده و از رهایش سیتوکروم C داخل سیتوزول ممانعت می‌کند، در نتیجه از تشکیل آپوپتوzوم و فعال شدن کاسپاز ۹ جلوگیری می‌کند (۴۴). همچنین مشخص شده کاهش مقدار BAX می‌تواند آپوپتوz را به وسیله کوچک کردن منافذ قابل نفوذ میتوکندری کاهش دهد (۲۸).

عملکرد بد اندوتیال عروق که به وسیله کاهش فراهمی زیستی و فعالیت زیستی NO آشکار می‌شود به عنوان اولین اتفاق در فرآیند گرفتگی عروق در نظر گرفته می‌شود (۴۵). فعالیت ورزشی میزان جریان خون و در نتیجه استرس برشی را تقویت کرده و فعالیت عناصر سازنده eNOS را تنظیم مثبت می‌کند و در نتیجه هم مقدار تولید و هم فعالیت زیستی NO را افزایش می‌دهد (۴۶). از این رو NO اثرات ضد آپوپتوزی را در درون عروق تقویت می‌کند. در پژوهش حاضر به نظر می‌رسد فعالیت زیستی آنزیم بدون افزایش در مقدار آن باعث افزایش بیان ژن BCL-2 و کاهش بیان ژن BAX شده و در نتیجه از ایجاد آپوپتوz که

- Epigenetic origins of metabolic disease: the impact of the maternal condition to the offspring epigenome and later health consequences. *Food Sci Hum Wellness*; 2013.2(1):1-11.
4. Mathias PC, Elmhiri G, de Oliveira JC, Delayre-Orthez C, Barella LF, Tófolo LP, et al. Maternal diet, bioactive molecules, and exercising as reprogramming tools of metabolic programming. *Eur J Nutr*; 2014.53(3):711-22.
5. Chung E, Joiner HE, Skelton T, Looten KD, Manczak M, Reddy PH. Maternal exercise upregulates mitochondrial gene expression and increases enzyme activity of fetal mouse hearts. *Physiol Rep*; 2017.5(5):e13184.
6. Gaeini AA, Shafiei Neek L, Choobineh S, Baghaban Eslaminejad M, Satarifard S, Sayahpour FA, et al. Preconception endurance training with voluntary exercise during pregnancy positively influences on remodeling markers in female offspring bone. *J Matern-Fetal Neo M*; 2016.29(22):3634-40.
7. Stanford KI, Lee M-Y, Getchell KM, So K, Hirshman MF, Goodyear LJ. Exercise before and during pregnancy prevents the deleterious effects of maternal high-fat feeding on metabolic health of male offspring. *Diabetes*; 2015.64(2):427-33.
8. Carter LG, Qi NR, De Cabo R, Pearson KJ. Maternal exercise improves insulin sensitivity in mature rat offspring. *Med Sci Sport Exerc*; 2013.45(5):832.
9. Onoyama S, Qiu L, Low HP, Chang C-I, Strohsnitter WC, Norwitz ER, et al. Prenatal maternal physical activity and stem cells in umbilical cord blood. *Med Sci Sports Exerc*; 2016.48(1):82.
10. Clapp JF. Exercise in pregnancy: a brief clinical review. *Fetal Matern Med Rev*. 1990;2(1):89-101.
11. Rosa BV, Firth EC, Blair HT, Vickers MH, Morel PC. Voluntary exercise in pregnant rats positively influences fetal growth without initiating a maternal physiological stress response. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*; 2011.300(5):R1134-R41.
12. Ferraro ZM, Gaudet L, Adamo KB. The potential impact of physical activity during pregnancy on maternal and neonatal outcomes. *Obstet Gynecol Surv*; 2012.67(2):99-110.
13. Williams SJ, Hemmings DG, Mitchell JM, McMillen IC, Davidge ST. Effects of maternal hypoxia or nutrient restriction during pregnancy on endothelial function in adult male rat offspring. *J Physiol*; 2005.565(1):125-35.
14. Newcomer SC, Thijssen DH, Green DJ. Effects of exercise on endothelium and endothelium/smooth muscle cross talk: role of exercise-induced hemodynamics. *J Appl Physiol*; 2011.111(1):311-20.
15. Poston L. Influences of maternal nutritional status on vascular function in the offspring. *Curr Drug Targets*; 2007.8(8):914-22.
16. Newcomer S, Taheripour P, Bahls M, Sheldon R, Foust K, Bidwell C, et al. Impact of porcine maternal aerobic exercise training during pregnancy on endothelial cell function of offspring at birth. *J Dev Orig Health Dis*; 2012.3(1):04-9.
17. Zeiher AM. Endothelial vasodilator dysfunction: pathogenetic link to myocardial ischaemia or epiphénoménon? *The Lancet*; 1996.348:S10-S2.
18. Kim Y-M, Talanian RV, Billiar TR. Nitric oxide inhibits apoptosis by preventing increases in caspase-3-like activity via two distinct mechanisms. *J Biol Chem*; 1997.272(49):31138-48.
19. Dommeler S, Haendeler J, Nehls M, Zeiher AM. Suppression of apoptosis by nitric oxide via inhibition of interleukin-1 β -converting enzyme (ice)-like and cysteine protease protein (cpp)-32-like proteases. *J Exp Med*; 1997.185(4):601-8.
20. Lee SJ, Kim KM, Namkoong S, Kim CK, Kang YC, Lee H, et al. Nitric oxide inhibition of homocysteine-induced human endothelial cell apoptosis by down-regulation of p53-dependent Noxa expression through the formation of S-nitrosohomocysteine. *J Biol Chem*; 2005.280(7):5781-8.
21. Firoozraei M, Sharifi AM, Najafi M, Hosseini Gohari L. Angiotensin converting enzyme(ACE) activity, levels of lipids and apolipoproteins in patients with coronary artery disease. *Razi J Med Sci*; 2008.14(57):151-6.
22. Clifford KA. The effects of maternal exercise during pregnancy on the vascular smooth muscle cell function of offspring. *Coll Health Hum Sci*; 2012.
23. Blaize AN, Pearson KJ, Newcomer S. Impact of maternal exercise during pregnancy on offspring chronic disease susceptibility. *Exerc Sport Sci Rev*; 2015.43(4):19.
24. Yang AL, Tsai SJ, Jiang MJ, Jen CJ, Chen HI. Chronic exercise increases both inducible and endothelial nitric oxide synthase gene expression in endothelial cells of rat aorta. *J Biol Sci*; 2002.9(2):149-55.
25. Laughlin MH, Newcomer SC, Bender SB. Importance of hemodynamic forces as signals for exercise-induced changes in endothelial cell phenotype. *J Appl Physiol*; 2008.104(3):588-600.
26. Marsh SA, Coombes JS. Exercise and the endothelial cell. *Int J Cardiol*. 2005;99(2):165-9.
27. Jafari A, Pourrazi H, Nikookheslat S, Baradaran B. Effect of exercise training on Bcl-2 and Bax gene expression in the rat heart. *Gene Cell Tissue*; 2015.2(4).
28. Lee YI, Cho JY, Kim MH, Kim KB, Lee DJ, Lee KS. Effects of exercise training on pathological cardiac hypertrophy related gene expression and apoptosis. *Eur J Appl Physiol*; 2006.97(2):216-24.
29. Kwak HB, Song W, Lawler JM. Exercise training attenuates age-induced elevation in Bax/Bcl-2 ratio, apoptosis, and remodeling in the rat heart.

- Federation of American Societies for Experimental Biology. FASEB J; 2006.20(6):791-3.
30. Sonfi FG, Farajnia S, Aslanabadi N, Ahmadiasl N, Alipour M, Alipour M, et al. Long-term exercise training affects age-induced changes in HSP70 and apoptosis in rat heart. Gen Physiol Biophys; 2008.27(4):263.
31. Akbari M, Shahidi F, Rajabi H, Kashef M, Mazaheri Z. The simultaneous effect of six weeks forced swimming and crocin supplementation on the expression of 3-cardiomyocyte genesase 3 in male rats infected with hydrogen peroxide. Razi J Med Sci; 2018.25(9):0.
32. da Silva SG, de Almeida AA, Fernandes J, Lopim GM, Cabral FR, Scerni DA, et al. Maternal exercise during pregnancy increases BDNF levels and cell numbers in the hippocampal formation but not in the cerebral cortex of adult rat offspring. PloS One; 2016.11(1):e0147200.
33. Høydal MA, Wisloff U, Kemi OJ, Ellingsen Ø. Running speed and maximal oxygen uptake in rats and mice: practical implications for exercise training. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.; 2007.14(6):753-60.
34. Jemiolo B, Trappe S. Single muscle fiber gene expression in human skeletal muscle: validation of internal control with exercise. Biochem Biophys Res Commun; 2004.320(3):1043-50.
35. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the $2^{-\Delta\Delta CT}$ method. Methods; 2001.25(4):402-8.
36. Camarillo I, Clah L, Zheng W, Zhou X, Lerrick B, Blaize N, et al. Maternal exercise during pregnancy reduces risk of mammary tumorigenesis in rat offspring. Eur J Cancer Prev; 2014.23(6):502.
37. Green DJ, Maiorana A, O'driscoll G, Taylor R. Effect of exercise training on endothelium-derived nitric oxide function in humans. J Physiol; 2004.561(1):1-25.
38. Kojda G, Cheng YC, Burchfield J, Harrison DG. Dysfunctional regulation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression in response to exercise in mice lacking one eNOS gene. Circulation; 2001.103(23):2839-44.
39. Wang J, Wolin MS, Hintze TH. Chronic exercise enhances endothelium-mediated dilation of epicardial coronary artery in conscious dogs. Circ Res; 1993.73(5):829-38.
40. Fleming I, Busse R. Molecular mechanisms involved in the regulation of the endothelial nitric oxide synthase. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol; 2003.284(1):R1-R12.
41. Boo YC, Sorescu G, Boyd N, Shiojima I, Walsh K, Du J, et al. Shear stress stimulates phosphorylation of endothelial nitric-oxide synthase at Ser1179 by Akt-independent mechanisms role of protein kinase A. J Biol Chem; 2002.277(5):3388-96.
42. Snyder CM, Shroff EH, Liu J, Chandel NS. Nitric oxide induces cell death by regulating anti-apoptotic BCL-2 family members. PloS One; 2009.4(9):e7059.
43. Chung HT, Pae HO, Choi BM, Billiar TR, Kim YM. Nitric oxide as a bioregulator of apoptosis. Biochem Biophys Res Commun; 2001.282(5):1075-9.
44. Choi BM, Pae HO, Jang SI, Kim YM, Chung HT. Nitric oxide as a pro-apoptotic as well as anti-apoptotic modulator. BMB Rep; 2002.35(1):116-26.
45. Bahls M, Sheldon RD, Taheripour P, Clifford KA, Foust KB, Breslin ED, et al. Mother's exercise during pregnancy programmes vasomotor function in adult offspring. Int J Clin Exp Physiol; 2014.99(1):205-19.
46. Di Francescomarino S, Sciartilli A, Di Valerio V, Di Baldassarre A, Gallina S. The effect of physical exercise on endothelial function. Sports Med; 2009.39(10):797-812.