



تغییرات بیان mir-96 و ژن igf4 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محيطی بیماران مبتلا به سرطان پستان

فاطمه پارپری بر جسته: کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (* نویسنده مسئول) ID afsuonbarjasteh@gmail.com

چکیده

کلیدواژه‌ها

سرطان پستان
igf4
mir-96
سلول‌های تک‌هسته‌ای خون
محیطی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

زمینه و هدف: سرطان پستان (Breast cancer) یک بیماری پیچیده ژنتیکی می‌باشد. عوامل مختلفی در بروز و یا حتی شناسایی این بیماری نقش دارند که از انواع آن‌ها می‌توان به RNA‌های غیر کد کننده به عنوان بیومارکر تشخیصی و پیش‌آگه‌ی سرطان اشاره نمود. یکی از این عوامل mir(MicroRNA)‌ها می‌باشند و از جمله mir-96 باشد. این mir باشد. از آنجا که ممکن است ژن igf4 به عنوان ژن هدف در mir-96 تغییرات بیان ژن igf4 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محيطی (PBMC) بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

روش کار: در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، ۳۰ نمونه خون بیمار و ۳۰ نمونه خون افراد سالم در بیماران مبتلا به سرطان پستان به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش Real-time PCR جهت بررسی تغییرات بیان ژن igf4 و mir-96 در نهایت به کمک SPSS ویرایش ۲۲ آنالیز آماری داده‌ها با $P \leq 0.05$ انجام شد.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان‌دهنده افزایش بیان mir-96 در بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌باشد. از طرف دیگر تغییرات معنی‌داری در بیان ژن igf4 در این بیماران مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به مشاهدات و نتایج به دست آمده می‌توان گفت که در بیماران مبتلا به سرطان پستان افزایش mir-96 دیده می‌شود و ارتباط مستقیمی با این بیماری دارد ولی تغییراتی در ارتباط با سطح بیان igf4 در این بیماران مشاهده نمی‌شود که می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین بیان mir-96 و ژن igf4 مشاهده نشد. پیشنهاد می‌شود این ژن‌ها از جهات دیگر نیز مورد بررسی، ارزیابی و مطالعه بیشتر قرار گیرند.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت کننده: حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Papari Barjasteh F. Mir-96 and igf4 gene expression changes in peripheral blood mononuclear cells obtained from breast cancer patients. Razi J Med Sci. 2021;28(6):50-59.

* انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است.



Original Article

Mir-96 and igf4 gene expression changes in peripheral blood mononuclear cells obtained from breast cancer patients

 **Fatemeh Papari Barjasteh:** MSc of molecular genetics, Department of Genetic, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran (* Corresponding author) afsuonbarjasteh@gmail.com

Abstract

Background & Aims: Breast cancer is a complex genetic disease. All types of cancer at the cellular level are called genetic disorders, and the implication is that mutations in genes that control cell proliferation can cause cancer. Among the various types of cancer, breast cancer is the most common cancer and the deadliest malignancy among women and is one of the most important health concerns in the world. According to the statistics of the whole country in Iran, breast cancer is the most common cancer in women and every year, about 6160 new cases are found, of which 1063 die from this disease. Breast cancer in man is about 1% reported in women. Breast cancer in men appears to be associated with disorders that increase estrogen. Factors influencing breast cancer include gender, age, race and ethnicity, family history, genetic factors, hormonal factors, childbirth, abortion, etc. Symptoms of breast cancer include deformity in the nipple. Discharge from the nipple, breast mass or tumor, changes in the skin of the breast, change in the size of the breast, etc. The increasing number of cancer patients, especially breast cancer in the world and in our country, has raised it as a health problem and has made combating it a health priority. The following common methods can be used to treat breast cancer according to the stage of the disease: Surgery, Radiotherapy, Chemotherapy, Hormone therapies, Gene Therapy, etc. Various factors are involved in the occurrence or even identification of the disease, including noncoding RNAs as diagnostic biomarkers and prognosis of cancer. MicroRNAs are a group of non-coding RNAs that are about 18-25 nucleotides in length and affect gene expression after transcription. Recent studies have shown very important roles in many biological functions of these RNAs, including their role in differentiation, evolution, metabolism, cancer-related processes and even in diseases such as diabetes and Alzheimer's. Cardiac, autism and fragile X Syndrome One of these factors is mir, and mir-96 is one of the MIRs that seems to be important in this disease. The igf4 gene has also been investigated as a target gene in mir-96. The aim of this study was to investigate the changes in the expression of mir-96 and igf4 gene in peripheral blood samples of peripheral blood mononuclear cell (PBMCs) of patients with breast cancer.

Methods: The present study is a case-control study, 30 blood samples of patients and 30 blood samples of healthy individuals of breast cancer patients were evaluated as controls. Taking into account the mentioned cases and after obtaining written consent and provided that the personal and confidential information of the patients remain confidential, a sample of the mentioned individuals was taken and the subjects entered the testing stage. After sampling, white cells should be isolated from the sample. The next step is to extract RNA, After RNA extraction, the next

Keywords

Breast cancer,
igf4 gene,
mir-96,
Peripheral Blood
Mononuclear (PBMCs)

Received: 05/06/2021

Published: 05/09/2021

step is DNA synthesis. Next we have to do PCR for all the sections and genesAnd analysis them. In this study, real time-PCR method was used to study to changes of igsf4 gene expression and The relationship between the results of statistical analysis of data related to NFAT5 and miR-490 gene expression was investigated using SPSS software version 16. Significant level. Finally, statistical analysis of data with $P \leq 0.05$.

Results: the results showed an increase in the expression of mir-96 in patients with breast cancer, on the other hand, no significant changes in igsf4 gene expression were observed in these patients. Another goal of this experiment was the relationship between the expression level of mir-96 and igsf4 gene. From the results of these experiments, it can be concluded that there is a significant relationship between mir-96 and igsf4 gene in mononuclear cells. There is no peripheral blood in PBMC of patients with breast cancer.

Conclusion: According to the observation and results, it can be concluded that in patients with breast cancer, there is an increase in mir-96 and is directly related to this disease, but there was no significant relationship between mir-96 expression and igsf4 gene. This data has been reviewed with SPSS software. The studies are not final studies Due to the limitations of this experiment, it is suggested that in future experiments, this research be re-examined by considering other patients or more diverse patients, using other techniques. and it is suggested that they be reviewed, evaluated and re-studied in other ways as well.


Conflicts of interest: None

Funding: None

Cite this article as:

Papari Barjasteh F. Mir-96 and igsf4 gene expression changes in peripheral blood mononuclear cells obtained from breast cancer patients. Razi J Med Sci. 2021;28(6):50-59.

*This work is published under CC BY-NC-SA 3.0 licence.



جنس، سن، نژاد و قومیت، سابقه فامیلی، عوامل ژنتیکی، عوامل هورمونی، زایمان، سقط جنین و... اشاره نمود. از علائم نشان‌دهنده سرطان پستان می‌توان به تغییر شکل در نوک پستان، ترشح از نوک پستان، توode یا تومور پستان، تغییرات پوست پستان و تغییر اندازه پستان اشاره نمود (۱۶). microRNA گروهی از RNA های غیر کدکننده هستند که حدود ۲۵-۱۸ نوکلئوتید طول دارند و پس از رونویسی روی بیان ژن اثر می‌گذارند (۱۷). مطالعات اخیر نقش‌های بسیار مهمی در بسیاری از عملکردهای بیولوژیکی برای این دسته از RNA ها نشان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به نقش آن‌ها در تمایز، تکامل، متابولیسم، فرآیندهای مربوط به سرطان و حتی در بیماری‌های مثل دیابت، آزالایمر، قلبی، اوتیسم و سندروم X شکننده اشاره نمود (۱۷). مطالعات نشان داده‌اند که miRNA ها می‌توانند هر دو نقش انکوژنی و سرکوبگر توموری را داشته باشند که در این صورت به ترتیب Ts-mir goncomir و Ts-mir oncomir شناخته شده می‌شوند (۱۸، ۱۹). اولین miR-17-92 است که در ۱۳۹۳۱ قرار دارد و از mir ۳۴a هایی که به طور مکرر در سرطان پستان از دست می‌رود می‌توان به miR-96-3p در سرطان مطالعات صورت گرفته بر روی miR-96-3p در سرطان پستان مشخص کرده که این microRNA به عنوان یک Ts-mir می‌باشد که از تومورزائی و تمایز آن جلوگیری می‌کند و نقش مهارکننده‌گی را دارد. دیگر ویژگی آن جلوگیری از تکثیر سلولی و متاستاز می‌باشد و چرخه سلولی را در مرحله G₁ متوقف می‌کند. MiR-96 با توجه به نوع هدف و محل فعالیت می‌تواند افزون بر سرطان پستان در سایر سرطان‌ها نقش ایفا کند. با استفاده از پایگاه داده‌ای مربوط به microRNA (mirbase) از بین اهداف پیشنهادی برای mir-96، ژن igfSF4 را جهت انجام تحقیقات، پیرامون سرطان پستان انتخاب نمودیم. موقعیت این ژن بر روی کروموزوم ۱۱ می‌باشد. خانواده igfSF4 با ایزوفرم‌های مختلف در فعال کردن و بیان بیش از حد، در چندین نوع سرطان، در رونویسی مناطق پایین دست ژن و نقش اساسی را در گسترش و پیشرفت سرطان ایفا می‌کند. igfSF4 در پیشرفت سرطان مؤثر می‌باشد اما ایزوفرم‌های مختلف آن در سلول‌های مختلف، نقش‌های متفاوتی را ایفا

مقدمه

سرطان یک بیماری پیچیده چندعاملی و یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی است. امروزه سرطان به عنوان یک معضل عمده‌ی بهداشتی و تأثیرگذار بر سلامت جامعه (۱) از مهم‌ترین نگرانی‌های سیستم بهداشت و درمان در تمام جوامع بشری می‌باشد (۲) که بار درمانی سنگینی دارد و هزینه‌های زیادی را به جامعه و خانواده‌ی فرد مبتلا تحمیل می‌کند (۳). سرطان در تقسیم‌بندی بیماری‌ها، در ردی بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرد که شامل طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها است و مانند سایر بیماری‌های مزمن، احتمال ابتلا به آن در تمام افراد، در هر گروه سنی و هر نژادی می‌باشد (۱). مطالعات و شواهد فیزیولوژیکی نشان می‌دهد تکثیر سلول‌های بدن در حالت طبیعی تحت کنترل دقیق سازوکارهای مرتبط با چرخه تقسیم سلولی است. این سازوکارها توسط ژن‌های متعددی کنترل می‌شود (۴). در اثر بروز اختلال در ژن‌های کنترل کننده‌ی چرخه تقسیم سلولی، این سازوکارها از مسیر طبیعی خود خارج می‌شوند، به همین دلیل تمامی انواع سرطان‌ها را در سطح سلولی، اختلال ژنتیکی می‌نامند و مفهوم آن این است که ایجاد جهش در ژن‌های کنترل کننده‌ی تکثیر سلولی باعث به وجود آمدن سرطان می‌شود (۵). در بین انواع مختلف سرطان، سرطان پستان که ۲۳ درصد همه سرطان‌ها در زنان را شامل می‌شود، شایع‌ترین سرطان و کشنده‌ترین بدخیمی در بین زنان محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده سلامتی زنان در جهان می‌باشد (۶، ۷). سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان است که ۳۲٪ از موارد سرطان زنان را شامل می‌شود. این بدخیمی دومین علت مرگ‌ومیر ناشی از سرطان، در زنان پس از سرطان ریه است (۸، ۹) و به عنوان یک بیماری چندعاملی (۱۰)، شایع‌ترین سرطان در بین زنان (۱۱-۱۳) به‌ویژه زنان آسیایی است که بروز آن با شبیه شدیدی رو به افزایش است (۱۴). طبق آمار کل کشور در ایران نیز سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان محسوب شده و در هر سال قریب به ۶۱۶۰ مورد جدید پیدا می‌شوند که ۱۰۶۳ نیز از این بیماری فوت می‌کنند. از عوامل مؤثر در سرطان پستان می‌توان به

مرتبه سلول‌ها شسته شدند تا اثر سمی فایکول از بین برود. در مرحله بعد RNA از PBMC‌ها استخراج شد. برای استخراج RNA در این مرحله به ویال‌های حاوی PBMC‌های جداسازی شده، ۵۰۰ ml riboex ۵۰۰ اضافه شد و محتویات ویال چندین بار پیپتاژ شد. ویال‌ها را به مدت ۵ min در دمای اتاق قرار داده و سپس به آن‌ها ۲۰۰ میکرولیتر کلروفرم اضافه شد و با دست به شدت تکان داده شد. ویال‌ها را به مدت ۱۰ min و دور ۱۲۰۰۰ rpm درون سانترفیوژ قرار داده تا سه فاز در ویال تشکیل شود سپس فاز رویی جدا شده و به ویال جدیدی انتقال داده شد و به آن ۲۰۰ ml ایزوپروپیل اضافه کرده و شب تا صبح (Overnight) در دمای ۲۰-۲۵ درجه قرار داده شد. روز بعد ویال‌ها را با دور ۱۲۰۰۰ سانترفیوژ کرده و کل محتویات رویی از ویال‌ها خارج شدند و سپس به ویال‌ها کل ۷۵٪ افزوده و دوباره با دور ۷۵۰ rpm به مدت ۵ min ۵ سانترفیوژ شدند و در نهایت الكل را از ویال‌ها خارج نموده و اجازه داده شد ویال‌ها خشک شوند. به میزان ۴۰ ml آب دیونیزه به ویال‌ها اضافه کرده و داخل دستگاه هات پلیت با دمای ۵۶ درجه به مدت ۱۵ min قرار داده شدند. بعد از اتمام کار RNA استخراج شده در دمای ۷۰-درجه نگهداری شد.

مرحله بعد سنتز DNA مکمل (cDNA) می‌باشد که از پرایمر Oligo(dT) استفاده شده است. در مرحله‌ی PCR برای تمامی ژن‌ها انجام شد طراحی پرایمر برای ژن بتا اکتین و سایر ژن‌ها ابتدا توالی نوکلئوتیدی ژن‌های مورد نظر را از پایگاه داده مربوط به نوکلئیک اسید (www.ncbi.nlm.nih.gov) به دست آمد. سپس از نرم‌افزارهای بعد از به دست آوردن توالی رونوشت ژن مورد نظر، به کمک برنامه طراحی پرایمر ۵ Oligo پرایمروها طراحی و به صورت آنلاین جهت بررسی اختصاصیت آن‌ها در پایگاه اطلاعات داده مربوط به نوکلئیک اسید (www.ncbi.nlm.nih.gov) مجدداً blast شدند. در مرحله بعدی بتا اکتین، ۹۶ igsf4 و mir-blast را با توجه به برنامه زمانی و دمایی طراحی شده‌ی مناسب، با استفاده از real-time PCR مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برنامه‌ی real-time PCR برای ژن β-اکتین دارای سه مرحله و یا چرخه می‌باشد. در مرحله اول دمای

۲۱). هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات بیان mir96، بررسی تغییرات بیان igsf4 و بررسی ارتباط بین تغییرات بیان mir96 و igsf4 در بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌باشد.

روش کار

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی-شاهدی است. بیماران از میان افرادی انتخاب شده‌اند که در مرحله ۱ و ۲ بیماری قرار دارند که این به آن معنی است که هنوز وارد مرحله شیمی‌درمانی نشده‌اند و یا دارویی مصرف نمی‌کنند. در این آزمایش ۳۰ نمونه بیمار و ۳۰ نمونه از افراد سالم گرفته‌ایم که به عنوان مورد کنترل در این آزمایش هستند. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و بعد از اخذ رضایت‌نامه کتبی و به شرط محramانه ماندن اطلاعات شخصی و محramانه بیماران، نمونه از افراد مذکور گرفته شد و افراد وارد مرحله آزمایش شدند. در ادامه ۵ ml خون وریدی از افراد گرفته شده و در یک فالکون ۱۵ ml استریل که حاوی EDTA ۵۰۰ ml است ریخته و به آرامی تکان داده شد. سپس ویال را در فریزر -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد تا برای PCR آماده شود.

تمامی آزمایشات صورت گرفته در این تحقیق و نمونه‌گیری، توسط دستورالعمل کار کمیته اخلاق دانشگاه آزاد واحد قم تایید گردیده است (کد اخلاق: IR.IAU.QOM.REC.1397.010). در مرحله بعد گلبول‌های سفید خون محیطی جدا شدند. برای این کار ابتدا ۴ ml از خون را با ۴ ml PBS رقیق و به آرامی مخلوط شد. سپس ۲ ml فایکول را به دو فالکون ۱۵ ml استریل وارد نموده و نیمی از خون رقیق شده توسط PBS به آرامی توسط پیپت پاستور روی ۲ ml فایکول موجود در هر کدام از فالکون‌ها اضافه شد. سپس دو فالکون را درون سانترفیوژ قرار داده و برای ۲۰ min در دور ۲۵۰۰ rpm با شتاب اولیه ۲ سانترفیوژ شد. نتیجه کار در هر فالکون ۴ فاز کاملاً مشخص شد که به ترتیب شامل: ۱- گلبول قرمز خون (RBC) و هموگلوبین و نوتروفیل‌ها ۲- فایکول ۳- لایه ابری حاوی WBC و پلاکت‌ها ۴- Buffy coat (پلاسمای می‌باشد). سپس پلاسمای خارج نموده، لایه ابری حاوی لکوسیت‌ها را درون یک فالکون ۱۵ ml ریخته و دو

می‌کند: REST-RG Mode: روش جدید وارد کردن داده‌ها معرفی شده است، به کاربر اجازه می‌دهد تا با Comparative Rotor-Gene نرم‌افزار Quantization analysis software اطلاعات را پردازش کند. در نسخه‌های قبلی این نرم‌افزار به طور تصادفی دو نقطه از منحنی استاندارد را انتخاب و محاسبه Efficiency (کارایی) بر اساس آن انجام می‌شد، ولی در حال حاضر با تعیین بهترین خط برای منحنی استاندارد میزان Efficiency محاسبه می‌شود.

یافته‌ها

با توجه به تحقیقات صورت گرفته و آزمایشاتی که بر روی سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی (PBMC) ۳۰ فرد مبتلا به سرطان پستان صورت گرفت، در مرحله استخراج RNA بر روی ژل آگارز باندهای ۱۸srRNA و 28srRNA پس از آنالیز داده‌ها real time-PCR، آنچه به دست آمد نشان‌دهنده آن بود که در PBMC های بیماران مبتلا به سرطان پستان شاهد افزایش چشم‌گیر و قابل توجهی در بیان ژن mir-96 در مقایسه با گروه افراد سالم بودیم (شکل ۱).


از طرف دیگر بررسی‌هایی که بر روی ژن igsf4 صورت گرفت نشان داد که ژن igsf4 در PBMC های گروه افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با گروه افراد سالم تفاوت معنی‌داری نشان نداد (شکل ۲).
[۲]

بحث و نتیجه‌گیری


علی‌رغم پیشرفت‌های بسیاری که امروزه در علوم متفاوت پزشکی شاهد هستیم، همچنان سرطان یکی از بزرگ‌ترین معضل‌های جامعه می‌باشد و سومین علت مرگ‌ومیر در ایران می‌باشد. سرطان انواع مختلف دارد و با توجه به جنسیت، برخی از آن‌ها را در یکی از دو جنس بیشتر شاهد هستیم. سرطان پستان از جمله سرطان‌هایی است که شیوع آن را در بین زنان بیشتر شاهد هستیم و هر ساله خسارات جبران‌ناپذیری را به جامعه و خانواده وارد می‌کند (۲۲). miRNA ها ژن‌ها کوچک غیر کدکننده‌ای هستند که بیان ژن را تنظیم می‌کنند و در بسیاری از مسیرهای مهم

مورد نیاز به ۹۵ °C به مدت ۱۰ ثانیه می‌باشد. این مرحله ۵۰ بار تکرار می‌شود. سپس وارد مرحله دوم شدیم که در این مرحله دمای ۶۲ °C را به مدت ۱۵ ثانیه خواهیم داشت. در مرحله سوم یعنی مرحله پایانی دمای ۷۲ °C به مدت ۳۰ ثانیه را خواهیم داشت که نکته قابل توجه دیگر دمای ذوب ژن کد کننده β-اکتین می‌باشد که در این آزمایش دما بین ۹۵-۷۲ °C در نظر گرفته شده است. سپس real-time PCR برای ژن igsf4 و mir-96 به صورت سه مرحله‌ای بوده که در مرحله اول ۱۰ ثانیه دمای ۹۵ °C با ۵۵ مرتبه تکرار، در مرحله دوم به مدت ۲۰ ثانیه دمای ۹۵ °C و در مرحله سوم به مدت ۲۰ ثانیه دمای ۷۲ °C را شاهد هستیم. دمای ذوب برای این ژن (۹۵-۷۲ °C) می‌باشد. برنامه real-time PCR برای ژن mir-96 دو مرحله‌ای بود. در مرحله اول دمای ۹۵ °C را به مدت ۱۰ ثانیه با ۴۰ بار تکرار و در مرحله دوم دمای ۵۶ °C را به مدت ۴۰ ثانیه داشتیم.




آنالیز های آماری: در نهایت پس از تعیین threshold برای هر نمونه، به کمک نرم‌افزار LinReg با بررسی میزان فلورسانس خوانده شده توسط دستگاه برای هر نمونه و Efficiency هر نمونه، Ct های ژن رفرانس و ژن هدف را در دو گروه بیمار و سالم بررسی می‌کنیم. در صورت نرمال بودن به منظور حذف تأثیرات محیطی و دفعات تکرار آزمایش Ct های ژن هدف را برای هر نمونه از ژن رفرانس کم می‌کنیم و این کار را با برنامه Relative Expression Software (REST 2009) انجام دادیم. برنامه REST یک بسته نرم‌افزاری مستقل برای بررسی بیان ژن با استفاده از داده‌های Amplification (تکثیری) دستگاه Real Time PCR است که این مشکل را برای کاربران مرفوع ساخته است. این نرم‌افزار با اندازه‌گیری نسبی بیان ژن و به کمک randomization نمونه‌ها با یک ژن House keeping اطلاعات را پردازش می‌کند. ضریب اطمینان برای بیان ژن، میزان با ارزش بودن کار را از نظر آماری به ما نشان می‌دهد. از مزایای این نرم‌افزار عدم نیاز به ترسیم Threshold در نمودار Amplification برای پردازش داده‌ها است. این نرم‌افزار جهت پردازش داده‌ها از این روش استفاده



شکل ۱- کنترل کیفی محصولات استخراج RNA روی ژل آگارز و مشاهده نمودن های ۱۸srRNA و ۲۸srRNA



شکل ۲- افزایش معنی دار بیان ژن *mir-96* در بیماران سرطان پستان نسبت به افراد سالم. الف. نمایش نتایج به صورت *fold change* و ب. نمایش نتایج به صورت بیان نسبت به ژن بتا اکتین.



شکل ۳- بیان ژن *igsf4* در بیماران سرطان پستان نسبت به افراد سالم تفاوت معنی داری نشان نداد. الف. نمایش نتایج به صورت *fold change* و ب. نمایش نتایج به صورت بیان نسبت به ژن بتا اکتین.

طبق مطالعاتی که پیش از این صورت گرفته بود بیان این MIR در سرطان های متفاوت از جمله سرطان ریه، پستان، تخمدان و... افزایش می یافت به همین

از جمله سرطانی شدن و گسترش آن دخیل هستند (۲۳، ۲۴). ای که ما در این تحقیق مورد بررسی قرار دادیم *mir-96* می باشد.

PBMC بیماران مبتلا به سرطان پستان وجود ندارد. با توجه به نقش miRNA-96 در خون برای سرطان پستان می‌توان از این mir در شناسایی زودهنگام سرطان به عنوان بیومارک استفاده کرد.

References

- Siegel R, Ward E, Brawley O, Jemal A. Cancer statistics, 2011: the impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths. *Cancer J Clin.* 2011;61(4):212-36.
- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. *Cancer J Clin.* 2016;66(1):7-30.
- de Martel C, Georges D, Bray F, Ferlay J, Clifford GM. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. *Lancet Glob Health.* 2020;8(2):e180-e90.
- Lodish H, Berk A, Kaiser CA, Kaiser C, Krieger M, Scott MP, et al. Molecular cell biology: Macmillan; 2008.
- Barnum KJ, O'Connell MJ. Cell cycle regulation by checkpoints. *Cell Cycle Control*: Springer; 2014. p. 29-40.
- Nafissi N, Saghafinia M, Motamedi MHK, Akbari ME. A survey of breast cancer knowledge and attitude in Iranian women. *J cancer res ther.* 2012;8(1):46.
- Hejazi SH, Ahangari G, Pournour M, Deezagi A, Aminzadeh S, Ahmadkhaniha HR, et al. Evaluation of gene expression changes of serotonin receptors, 5-HT3AR and 5-HT2AR as main stress factors in breast cancer patients. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2014;15(11):4455-8.
- DeSantis C, Ma J, Bryan L, Jemal A. Breast cancer statistics, 2013. *Cancer J Clin.* 2014;64(1):52-62.
- Ariana M, Pournour M, Mehr SS, Vaseghi H, Ganji SM, Alivand MR, et al. Preventive effects of oxytocin and oxytocin receptor in breast cancer pathogenesis. *Pers Med.* 2018;16(1):25-34.
- Montazeri A, Vahdaninia M, Harirchi I, Harirchi AM, Sajadian A, Khaleghi F, et al. Breast cancer in Iran: need for greater women awareness of warning signs and effective screening methods. *Asia Pac Fam Med.* 2008;7(1):1-7.
- Ahangari G, Pournour M, Aminzadeh S, Bakhtou H, Ahmadkhaniha H. Significant association between catechol amine o-methyl transferase (COMT) gene expression changes and breast cancer pathogenesis. *J Carcinog Mutagen.* 2015;6(219):2.
- Nikfarjam A, Pournour M, Sohrabi M, Vaseghi H. Correlation between Expression of hsa-miR-490-5p and NFAT5 in Peripheral Blood Mononuclear Cell Obtained from Breast Cancer Patients. *J Gene*

دلیل است که این mir به عنوان یک oncomir یا به عبارت دیگر القاکننده تومور شناخته شده است (۲۵). مطالعات و بررسی‌های انجام شده بر روی mir-96 که در این آزمایش، القاکننده تومور (oncomir) بودن این microRNA را تایید می‌کند (۲۶، ۲۷). در این پژوهش شاهد افزایش معنی‌دار mir-96 در نمونه PBMC بیماران مبتلا به سرطان پستان بودیم ($P \leq 0.05$).

از طرف دیگر موضوع دیگری که در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفت، سطح بیان ژن igsf4 به عنوان ژن هدف بود. Igf4 یکی از خانواده‌های بزرگ ایمونوگلوبین می‌باشد که زیرگروه‌های متفاوتی را نیز دارا می‌باشد هر کدام از این ژن‌ها در موقعیت‌ها و شرایط متفاوت نقش متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. Igf4 این ایزوفرم‌های مختلف خود، در فعل کردن و بیان بیش از حد، در چند نوع سرطان و همچنین پیشرفت سرطان نقش مؤثری را ایفا می‌کند (۲۸، ۲۹). طبق بررسی‌ها و آزمایشاتی که در این تحقیق بر روی ژن igf4 صورت گرفت، شاهد تغییر سطح بیان معنی‌داری در بیان این ژن نبودیم در واقع می‌توان گفت سطح بیان ژن igf4 در نمونه PBMC بیماران مبتلا به سرطان پستان تغییر قابل توجه و معنی‌داری را به همراه نداشت.

در این مطالعه نقش دوگانه miRNA-96 مشخص شد. این microRNA در بافت نقش یک مهارکننده را ایفا می‌کند ولی در خون با بالا رفتن میزان آن و تغییر در عملکرد ژن هدف باعث افزایش تومور می‌گردد. با توجه به محدودیت‌های موجود در این آزمایش پیشنهاد می‌شود که در آزمایشات آینده، این تحقیقات را با در نظر گرفتن بیماران بیشتر و یا بیماران متنوع‌تر با به کارگیری تکنیک‌های دیگر بار دیگر این آزمایش مورد بررسی قرار گیرد. باشد که نتایج حاصل بتواند کمکی در راستای پیشرفت علم و دانش و پیشرفت حوزه درمان در بخش بیماران مبتلا به سرطان نماید. در این پژوهش شاهد افزایش معنی‌دار mir-96 در PBMC‌های بیماران مبتلا به سرطان پستان هستیم اما سطح بیان ژن igf4 تغییرات معنی‌داری را به همراه ندارد. همچنین ارتباط معنی‌داری بین mir-96 و ژن igf4 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی

- Resources. 2019;5(1):31-7.
13. Mayahi S, Neshasteh-Riz A, Pournour M, Eynali S, Montazerabadi A. Investigation of combined photodynamic and radiotherapy effects of gallium phthalocyanine chloride on MCF-7 breast cancer cells. JBIC J Biol Inorgan Chem. 2020;25(1):39-48.
 14. Keyghobadi N, Rafiemanesh H, Mohammadian-Hafshejani A, Enayatrad M, Salehiniya H. Epidemiology and trend of cancers in the province of Kerman: southeast of Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(4):1409-13.
 15. Li C, Uribe D, Daling J. Clinical characteristics of different histologic types of breast cancer. Br J Cancer. 2005;93(9):1046-52.
 16. Mehr SS, Pournour M, Movafagh A, Akbari ME, Vaziri S, Pourtoloei H, et al. The effect of spiritual intervention on the concentration of interleukin-1 β , interleukin-6, interleukin-8 and tumor necrosis factor alpha cytokines in patients with breast cancer: A pretest-posttest experimental study. Clin Cancer Invest J. 2020;9(6):249.
 17. Khoshnirsafa M, Kianmehr N, Falak R, Mowla SJ, Seif F, Mirzaei B, et al. Elevated expression of miR-21 and miR-155 in peripheral blood mononuclear cells as potential biomarkers for lupus nephritis. Int J Rheumatic Dis. 2019;22(3):458-67.
 18. Ilkhani K, Delgir S, Safi A, Seif F, Samei A, Bastami M, et al. Clinical and In Silico Outcomes of the Expression of miR-130a-5p and miR-615-3p in Tumor Compared with Non-Tumor Adjacent Tissues of Patients with BC. Anti-Cancer Agents Med Chem (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents). 2021;21(7):927-35.
 19. Delgir S, Ilkhani K, Safi A, Montazari V, Seif F, Bastami M, et al. The Expression of miR-513c and miR-3163 was Downregulated in Tumor Tissues Compared with Margin Tissues of Patients with Breast Cancer. 2020.
 20. Chen J, Shin VY, Siu MT, Ho JC, Cheuk I, Kwong A. miR-199a-5p confers tumor-suppressive role in triple-negative breast cancer. BMC Cancer. 2016;16(1):1-12.
 21. Murakami Y. Involvement of a cell adhesion molecule, TSLC1/IGSF4, in human oncogenesis. Cancer Sci. 2005;96(9):543-52.
 22. Pournour M, Ahangari G, Hejazi S, Deezagi A. New perspective therapy of breast cancer based on selective dopamine receptor D2 agonist and antagonist effects on MCF-7 cell line. Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2015;10(2):214-23.
 23. Soheilifar MH, Vaseghi H, Seif F, Ariana M, Ghorbanifar S, Habibi N, et al. Concomitant overexpression of mir-182-5p and mir-182-3p raises the possibility of IL-17-producing Treg formation in breast cancer by targeting CD3d, ITK, FOXO1, and NFATs: A meta-analysis and experimental study. Cancer Sci. 2021;112(2):589.
 24. Heydarzadeh S, Ranjbar M, Karimi F, Seif F,