



تغییرات بیان ژن P53 بافت کبد و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های چاق دیابتی پس از تمرین تناؤی و ژل رویال n کروموزومی

مسعود جهانتاش: دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حسین عابد نظری: استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (* نویسنده مسئول) abednazari@gmail.com

ماندانا غلامی: دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرشاد غزالیان: دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کلیدواژه‌ها

تمرین تناؤی شدید،
ژل رویال،
ژن P53،
موس دیابتی

زمینه و هدف: دیابت نوع دو شایع‌ترین بیماری درون‌ریز است که به دلیل عدم تحمل گلوکز در اثر برهم‌خوردن تعادل بین ذخایر و تقاضای انسولین رخ می‌دهد. برای درمان هایپرگلیسمی و عوارض ثانویه آن در بیماران دیابتی علی‌رغم تحقیقات گسترده علل این اختلال متاپولیک هنوز در سطح مولکولی به خوبی شناخته نشده است. همانطور که p53 یک ژن مهار کننده تومور است که بیشتر با سلطان در ارتباط است، با این حال، آخرین پژوهش‌ها نقش حیاتی p53 را در توسعه دیابت نشان می‌دهد که چگونه سیگنالینگ p53 می‌تواند به عنوان یک هدف درمانی بالقوه جدید برای دیابت و اختلالات متاپولیکی مرتبط با آن عمل کند. هدف پژوهش حاضر طالعه تغییرات بیان ژن P53 بافت کبد و شاخص مقاومت به انسولین پس از انجام تمرین تناؤی و ژل رویال در رت‌های چاق دیابتی نوع دو بود.

روش کار: نمونه آماری پژوهش حاضر ۳۶ سر موس‌های صحرایی نر چاق با میانگین وزن ۴۰.۹ گرم بودند. پس از ۲۰ هفته تدبیره با رژیم پرچرب با تزریق درون صفاقی میلی‌گرم STZ به ازای کیلوگرم وزن موس‌ها دیابتی شدند. موس‌هایی که گلوکز ناشتای آن‌ها بین ۱۵۰ تا ۴۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود دیابتی نوع دوم در نظر گرفته شد. موس‌های دیابتی در ۴ گروه کنترل (۶ سر)، تمرین تناؤی (۸ سر)، ژل رویال (۷ سر)، تمرین تناؤی شدید ژل رویال (۸ سر) گروه‌بندی و پروتکل تمرینی و گاواز ژل رویال روی آن‌ها اجرا شد. هشت هفته تمرین تناؤی شدید، پنچ جاسه در هفته با تناؤب شدید ۲ دقیقه‌ای ۸۰ تا ۹۰ درصد VO_{2max} و تناؤب استراحت یک دقیقه‌ای با ۵۰ تا ۶۵ درصد VO_{2max} اجرا شد. ژل رویال بصورت گاواز به میزان ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ۵ روز در هفته داده شد.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و دوعلاملی و آزمون تعییی نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، تمرین تناؤی شدید به کاهش معنی‌دار گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین منجر شد و تمرین تناؤی به کاهش بیان ژن P53 در سلول‌های کبدی در مقایسه با گروه کنترل منجر شد ($P=0.001$).

نتیجه گیری: تمرین تناؤی و مصرف ژل رویال نیز به کاهش غیر معنی‌دار بیان ژن P53 در سلول‌های کبدی در مقایسه با گروه کنترل منجر شد. نتایج ضریب همبستگی نیز بین تغییرات شاخص مقاومت به انسولین و بیان ژن P53 در گروه‌های تجربی معنی‌دار نبود.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت‌کننده: حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Jahantash M, Abednatanzi H, Gholami M, Ghazalian F. Changes in Hepatocyte p53 Gene Expression and Insulin Resistance Index in Obese Diabetic Rats after Interval Training and N-Chromosomal Royal Jelly. Razi J Med Sci. 2021;28(12):28-42.

* منتشر این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است.



Original Article

Changes in Hepatocyte p53 Gene Expression and Insulin Resistance Index in Obese Diabetic Rats after Interval Training and N-Chromosomal Royal Jelly

Masud Jahantash: PhD Student, Department of Physical Education and Sports Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Hossein Abednatanzi: Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (* Corresponding author) abednazari@gmail.com

Mandana Gholami: Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Farshad Ghazalian: Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

Background & Aims: Type 2 diabetes is the most common endocrine disease that occurs due to glucose intolerance due to imbalance between reserves and insulin demand. For the treatment of hyperglycemia and its side effects in diabetic patients, despite extensive research, the causes of this metabolic disorder are still not well understood at the molecular level.

Some studies have reported that strenuous exercise leads to apoptosis in rat intestinal lymphocytes in rats, but exercising voluntarily on a treadmill reduces apoptosis. Induction or inhibition of apoptosis is still questionable. One of the ways of treatment and prevention is regular physical activity for patients. But what kind of sport and with what kind of protocol is a question that researchers are always looking for. Considering the role of exercise and sports activities in the prevention and control of obesity and diabetes, adopting different training methods to prevent and reduce the prevalence of obesity and also help reduce the process of obesity and its complications such as cardio metabolic diseases such as fatty liver and diabetes and etc. is necessary in studies.

In traditional medicine, herbal and traditional medicines are used to prevent and treat metabolic diseases such as diabetes and fatty liver. Royal Jelly is a yellowish-white substance secreted by the submandibular glands of worker bees and consumed by queen bees throughout life and larvae during the growing season. Royal gel (RJ) and its bioactive compounds have a wide range of drugs due to their antioxidant effects and antibacterial, anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-hypertensive, and immune system properties. Also plays an important role in protecting the liver and kidneys, and in diabetic patients, it showed a decreasing effect on blood sugar and a decrease in lipid peroxidation levels and an increase in the activity of antioxidant enzymes such as CAT, GSH-PX and SOD.

As p53 is a tumor-inhibiting gene that is more closely associated with cancer, however, recent research shows the vital role of p53 in the development of diabetes, how p53 signaling can serve as a potential new therapeutic target for diabetes and Operate related metabolic disorders.

The P53 gene, a tumor suppressor gene that mutates and inactivates a wide range of cancers, has been dubbed the "genome protector", but new research has shown that it has profound effects on metabolism. Its activation can lead to obesity and type 2 diabetes, which is why the gene has been dubbed the "protector against obesity". While the role of this gene has been well known for decades in cancer research, little is known about its role in metabolism. Previous studies have shown that the role of P53 in metabolism is essential in its function in suppressing tumors. This gene also has effects on heart disease, obesity and type 2 diabetes.

The aim of this study was to study changes in p53 gene expression in liver tissue and insulin resistance index after HIIT and Royal Jelly in obese type 2 diabetic rats.

Methods: The statistical subject of the present study consisted of wistar rats. After 20 weeks

Keywords

High intensity interval training,
Royal Jelly,
P53 gene,
Diabetic rat

Received: 04/10/2021

Published: 22/02/2022

of high-fat diet, rats became diabetic by intraperitoneal injection of 25 mg STZ per kg body weight. Mice with fasting glucose between 150 and 400 mg /dL were considered to have type 2 diabetes. Mice were treated in 4 groups: 6-head diabetic control, 8-period periodic training, 7-head Royal Jelly, 8-head Periodic Exercise, and 8-head Royal Jelly training group and training protocol and gel-royal gavage.

The HIIT protocol consisted of eight weeks of aerobic exercise, five sessions per week with a gradual increase in extreme frequency from 22 to 38 meters per minute and a rest period of 16 to 22 meters per minute for 15 to 34 minutes by running on a treadmill. Running time increased from 16 minutes in the first week to 34 minutes in the eighth week. At the end of the training period and 48 hours after the last training session, the experimental training groups and after 12 hours of fasting, the rats were anesthetized and sacrificed by ether anesthetic. Blood samples were collected from the heart. Glucose was measured using an auto-analyzer. Insulin measured by a special kit of Pars Azmoun Company. The insulin resistance index was calculated using the formula and gene expression was also determined by RT-PCR. To describe the data, descriptive statistics and inferential statistics of one-way analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used to compare the differences between groups and two-factor analysis of variance and effect size index were used to compare the effect of each of the independent variables. Significance level it was considered $p \leq 0.05$.

Results: Data analysis using one way and two-way analysis of variance test showed that:

1. Mean glucose concentration (mg /dL) in the exercise group compared to the control was significantly reduced ($P = 0.005$) and in the exercise-royal gel group compared to the royal gel group had no significant difference and had a significant decrease compared to the control in the gel exercise group. ($P = 0.001$)
2. Mean insulin concentration (IUI / ml) in the exercise group was significantly increased compared to the control ($P = 0.005$) but the royal jelly group had a significant increase compared to the control. In the exercise group, Royal Jelly had a non-significant increase compared to control.
3. The mean insulin resistance index in the exercise group was significantly lower than the control group and Royal jelly ($P = 0.044$)
4. Mean P53 gene expression showed that, HIIT reduced P53 gene expression in hepatocytes compared with controls ($P < 0.001$). HIIT and Royal Jelly also reduced P53 gene expression in hepatocytes compared with the control group.

Conclusion: Results shown that HIIT and Royal Jelly also reduced P53 gene expression in hepatocytes compared with the control group.

In general, according to the research results, it can be concluded that HIIT as well as interaction with Royal Jelly can reduce the expression of P53 gene and improve glucose levels due to the effect of genetic components effective in the release of hepatic glucose and in Type 2 diabetic patients are effective, although the results showed that the correlation coefficient between changes in insulin resistance index and P53 gene expression was not significant in the experimental groups. Royal jelly due to various vitamin and protein compounds and phenolic compounds and good substitutes for the role of glucose, as well as various antioxidant and anti-inflammatory roles, etc., regulates carbohydrate metabolism, especially glucose, and regulates lipid metabolism and reduces hyperglycemia and dyslipidemia. And reduce insulin resistance and prevent oxidative stress and inflammatory responses in people with type 2 diabetes, which is associated with exercise-related diabetes and is usually associated with overweight and obesity, but Royal Jelly alone cannot be used in these areas. And changes in the P53 gene are effective, and the use of aerobic exercise programs such as interval training can improve its effectiveness, however, further studies are needed in this area.

Conflicts of interest: None

Funding: None

Cite this article as:

Jahantash M, Abednatanz H, Gholami M, Ghazalian F. Changes in Hepatocyte p53 Gene Expression and Insulin Resistance Index in Obese Diabetic Rats after Interval Training and N-Chromosomal Royal Jelly. Razi J Med Sci. 2021;28(12):28-42.

*This work is published under CC BY-NC-SA 3.0 licence.

مقدمه

کبد نمونه‌های دیابتی القا شده به‌وسیله آلوکسان (ALX) در مدل حیوانی هستند (۶). برخی پژوهش‌ها گزارش کرده‌اند فعالیت ورزشی شدید موجب آپوپتوz لنفوسیت‌های موش آرمایشگاهی می‌شود اما دوین اختیاری بر روی تردیل آپوپتوz را کاهش می‌دهد، در حالی‌که تمرين ورزشی اجباری سطوح اکسیدان‌ها را افزایش می‌دهد (۷). بنابراین تأثیر فعالیت ورزشی بر القا یا مهار آپوپتوz هنوز مورد تردید است. یکی از راه‌های درمانی و پیشگیری، فعالیت بدنی به شکل منظم برای بیماران می‌باشد. اما اینکه چه ورزشی و با چه نوع پروتکلی، سوالی است که محققین همیشه در پی کشف آن هستند.

با توجه به نقش انجام تمرينات و فعالیت‌های ورزشی در پیشگیری و کنترل چاقی و دیابت، اتخاذ شیوه‌های مختلف تمرينی برای پیشگیری و کاهش شیوع چاقی و نیز کمک به کاهش روند چاقی و عوارض ناشی از آن مانند بیماری‌های کاردیومتابولیک مانند کبد چرب و دیابت... در مطالعات ضرورت پیدا می‌کند. تمرين استقامتی با حجم بالا کنترل قند خون را در دیابت نوع دو بهبود می‌بخشد، اما بسیاری از افراد «کمبود وقت» را به عنوان مانع برای مشارکت منظم ذکر می‌کنند. تمرين تناوبی با شدت بالا (HIT) در نهایت یک روش با زمان کارآمد برای ایجاد سازگاری‌های فیزیولوژیکی می‌باشد، اما در مورد تأثیر HIT در دیابت نوع دو کمتر شناخته شده است. تمرينات تناوبی شدید که معمولاً با شدت‌های بالاتر از ۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب و دوره استراحت‌های کم و مدت زمان تمرينی کمتر از ۲۰ دقیقه انجام می‌گیرد، با بکارگیری و درگیر کردن بهتر و بیشتر تارهای عضلانی و فراخوانی قوی‌تر ارگان‌های سوخت و سازی و متابولیکی می‌تواند از طریق سازوکار سلولی مولکولی، متابولیسم کل بدن را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار دهد (۸). از این رو با انجام تمرينات تناوبی شدید، همان طور که پیش‌تر ذکر شد، عضلات بیشتری درگیر خواهد شد لذا در پاسخ به درگیری بیشتر عضلات اسکلتی، میزان مایوکین‌های ترشح یافته از عضلات اسکلتی افزایش می‌یابد و با فعال کردن متابولیسم عضلانی بسیاری از مسیرهای مربوط به متابولیسم چربی و جذب گلوکز خون را افزایش و

دیابت نوع دو شایع‌ترین بیماری درون‌ریز است که به‌دلیل عدم تحمل گلوکز در اثر برهم‌خوردن تعادل بین ذخایر و تقاضای انسولین رخ می‌دهد. این بیماری متابولیکی با هیپرگلیسمی ناشی از نقصان ترشح انسولین، مقاومت به انسولین و یا ترکیبی از هر دو مشخص می‌شود و با افزایش گلوکز خون، اختلال در متابولیسم کربوهیدرات و لیپید همراه می‌باشد (۱). تخمین زده می‌شود تعداد افراد دیابتی در دنیا از ۱۷ میلیون در سال ۲۰۰۰، به ۳۶۶ میلیون در سال ۲۰۳۰ برسد. در افراد مقاوم به انسولین سلول‌های بدن به صورت طبیعی به انسولین پاسخ نداده و گلوکز نمی‌تواند به آسانی به درون سلول جریان یابد. این بیماری متابولیسم درون سلولی اغلب بافت‌ها از جمله کبد را متأثر می‌کند و به عنوان یکی از عوامل اصلی شیوع اختلالات کبدی نیز محسوب می‌شود. حفظ ثبات سطح گلوکز خون توسط برداشت و ذخیره‌سازی گلوکز از وظایف کبد به شمار می‌رود. محل ترشح انسولین سلول‌های بتای پانکراس است. به دلیل این که اندام‌های اصلی بدن برای مصرف سوخت خود که عمدتاً گلوکز می‌باشد به هورمون انسولین نیاز دارند، این کاهش منجر به کاهش مصرف گلوکز توسط اندام‌ها و افزایش قند خون و گلوکونئوژن می‌شود لذا کاهش تولید انسولین مهم‌ترین مشخصه‌ی بیماری دیابت می‌باشد (۲).

افزایش قند خون از طریق افزایش تولید محصولات نهایی گلیکوزیله پیشرفت‌هه باعث تسهیل در تولید رادیکال‌های آزاد، از طریق اختلال در تولید رادیکال‌های درون‌زاد آزاد مثل سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز می‌گردد که به آسیب سلول منجر می‌شود (۳).

دیابت همچنین می‌تواند باعث صدمه بافتی و مرگ سلولی یا آپوپتوz شود. آپوپتوz مرگ برنامه‌ریزی و به‌طور کامل حفاظت‌شده سلولی می‌باشد که نقش مهمی را در رشد و نمو اندام‌ها، هومئوستاز و انهدام سلول‌های فرسوده ایفا می‌کند (۴). تحقیقات نشان می‌دهند که نقص در این مسیر می‌تواند باعث تجمع سلول‌های جهش یافته و در نهایت مرگ بیمار شود (۵). تحقیقات نشان‌دهنده افزایش شیوع آپوپتوz در

آهن، روی و منگنز مواد معدنی اصلی RJ هستند (۱۶) و (۱۷) علاوه بر این، RJ فعالیت‌های بیولوژیکی متنوعی از قبیل اثر فشار خون، عملکرد شبیه انسولین دارد؛ بنابراین، ممکن است که RJ تأثیراتی در مقاومت به انسولین داشته باشد که به عنوان علت اصلی DM در نظر گرفته می‌شود (۱۸). به طور مثال، در یک مطالعه روی موش‌ها، مکمل یاری دوزهای مختلف ژل رویال (۱۰، ۳۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) به کاهش فشار خون سیستولیک و سطح انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین منجر شد. اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی، ضدالتهابی و محافظت کننده عصبی ژل رویال نیز به اثبات رسیده است (۲۰، ۱۹).

ژن P53 که یک ژن سرکوبگر توموراست در طیف وسیعی از سرطان‌ها دچار جهش شده و غیر فعال می‌گردد، به این ژن لقب «محافظ ژنوم» داده شده است، حال تحقیقات جدید نشان داده است که این ژن دارای تأثیرات عمیقی بر متابولیسم است و غیر فعال شدن آن می‌تواند به چاقی و دیابت نوع ۲ بیانجامد و به همین دلیل لقب دیگری به این ژن داده شد «محافظ در برابر چاقی». در حالیکه نقش این ژن در طی دهه‌ها تحقیق بروی سلطان کاملاً شناخته شده است، در مورد نقش آن در متابولیسم اطلاعات کمی در اختیار است. مطالعات قبلی نشان داده اند که نقش P53 در متابولیسم، در عملکرد آن برای سرکوب تومور اساسی است، این ژن همچنین دارای تأثیراتی بر بیماری قلبی، چاقی و دیابت نوع ۲ است. در ژن P53، رایج ترین SNP در اسیدآمینه‌ی ۷۲ رخ می‌دهد جایی که یک توالی نوکلئوتیدی یکی از دو اسید آمینه‌ی پرولین (P72) یا آرژنین (R72) را کد می‌کند. برای دمه‌ها، واریته‌ی R72 از p53 در افرادیکه از خط استوا دورتر زندگی می‌کردند و درجه حرارت سردتری را در زمستان تجربه می‌کردند، مشاهده شده بود، اما مطالعات نتوانست توضیحی قطعی در مورد علت این پدیده ارائه دهد. علاوه بر این، مطالعات گستردۀ ژنومی نشان داد که بین واریته‌ی R72 و استعداد افزایش توده‌ی بدنی و ابتلا به دیابت نوع ۲ ارتباطی وجود دارد. پرسور مورفی و همکارانش به مطالعه‌ی موش‌هایی پرداختند که در جایگاه ۷۲ این پروتئین یا دارای پرولین و یا دارای آرژنین بودند. آن‌ها ابتدا

باعث بالا رفتن هرچه بهتر متابولیسم می‌شود (۹). با توجه به تولید رادیکال‌های آزاد توسط دیابت و فعالیت ورزشی و نهایتاً ایجاد آپوپتوز یکی از مواردی که توجه محققین را به خود جلب کرده است یافتن راه کارهایی برای کاهش عاقب منفی ناشی از دیابت و تولید رادیکال‌های آزاد است. در همین زمینه، مصرف عوامل آنتی‌اکسیدانی می‌تواند مؤثر باشد. محققان زیادی در سراسر دنیا در تلاش هستند تا با استفاده از روش‌های گوناگون از بیماری دیابت پیشگیری کنند و یا آن را درمان کنند و یا عوارض بیماری دیابت را کاهش دهند. امروزه استفاده از گیاهان دارویی و عصاره‌ها برای درمان بیماری‌ها افزایش یافته است. گیاهان دارویی و مشتقات آن‌ها اگرچه از دیرباز در درمان دیابت قندی و عوارض ناشی از آن مطرح بوده‌اند، ولی در مورد اثربخشی قطعی بسیاری از آن‌ها تاکنون شواهد معتبری یافت نشده است (۱۰). در طب سنتی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های متابولیک از جمله دیابت و کبد چرب از داروهای گیاهی و سنتی استفاده می‌شود (۱۱). ژل رویال (Royal Jelly) ماده سفید مایل به زرد است که توسط غدد تحت‌فكی زنبورهای کارگر ترشح و توسط زنبور ملکه در تمام عمر و لاروها در طول دوره رشد مصرف می‌شود. ژل رویال RJ و ترکیبات فعال زیستی آن بهدلیل داشتن اثرات آنتی‌اکسیدانی و خاصیت ضد باکتریایی، ضد دیابتی، ضد سرطان، ضد التهابی، ضد فشار خون و داروهای سیستم ایمنی بدن، داروهای گستردۀ‌ای را به نمایش می‌گذارند (۱۲ و ۱۳). همچنین نقش مهمی در محافظت از کبد و کلیه، بهبود زخم و سیستم تناسلی دارد و در بیماران دیابتی، اثرات کاهشی روی قند خون و کاهش سطح پراکسیداسیون لیپید و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مانند SOD و GSH-PX.CAT را نشان داد (۱۴، ۱۵). ژل رویال به طور عمده از ترکیبات مهم با فعالیت‌های بیولوژیکی و تقویت‌کننده سلامتی مانند پروتئین‌ها، لیپیدها، قندها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه آزاد تشکیل شده است و حاوی ویتامین‌هایی مانند ریبوفلافوین، تیامین، نیاسین، اسید فولیک، بیوتین و پیریدوکسین و مقادیر کمتری از ویتامین‌های C، D، E و (E) و علاوه بر این، کلسیم، سدیم، پتاسیم، مس،

دیابتی و آسیب‌های کبدی مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار

جامعه آماری پژوهش حاضر را موش‌های صحرایی نر تشکیل می‌دهند و نمونه‌های پژوهش ۳۶ سرت نر نژاد ویستار جوان با دامنه سنی ۳۵ تا ۴۵ روز و میانگینی وزنی 110 ± 10 گرم بودند. پس از دو هفته آشنایی با محیط آزمایشگاه و رسیدن به وزن میانگین 20 ± 30 تا 170 ± 30 گرم پر چرب قرار گرفتند. پس از هفته (۵ ماه) تغذیه با رژیم پر چرب و دسترسی آزاد به مواد غذایی و آب، به ۴ گروه کنترل دیابتی (۸ سر)، تمرین تنابوی شدید (۱۰ سر)، ژل رویال (۸ سر)، تمرین تنابوی شدید و ژل رویال (۱۰ سر) تقسیم شدند که در پایان پروتکل ۲۹ سر در ۴ گروه کنترل دیابتی (۶ سر)، تمرین تنابوی شدید (۸)، ژل رویال (۷)، تمرین تنابوی شدید و ژل رویال (۸ سر) باقیماندند.

شیوه نگهداری و تغذیه موش‌های صحرایی: برای نگهداری موش‌های صحرایی از قفس‌های جنس پلی کربنات شفاف با قابلیت اتو کلاو استفاده شد. دمای مطلوب محل نگهداری حیوانات ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد بود چرخه روشنایی نیز هر ۱۲ ساعت یکباره طور دقیق توسط تنظیم کننده الکترونیکی نور سالن نگهداری حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد. جهت تغذیه موش‌های صحرایی از رژیم پر چرب استاندارد استفاده شد. دسترسی موش‌های صحرایی به غذا به صورت نامحدود بود و آب در بطری‌های ۵۰۰ میلی لیتری در تمامی قفس‌ها وجود داشت.

روش چاق کردن رت‌ها با رژیم پر چرب: برای این منظور، پس از آشناسازی و سازگاری با محیط جدید، تمامی رت‌ها به مدت ۲۰ هفته (۵ ماه) تحت رژیم غذایی پر چرب تهیه شده توسط پژوهشکده زیست

موش‌ها را با یک رژیم نرمال به مدت ده هفته تغذیه کردند. پس از آن رژیم غذایی موش‌های هردو گروه را به یک رژیم پر چرب به مدت هشت هفته تغییر دادند. در حالیکه با رژیم غذایی نرمال، موشهای دارای واریته‌ی R72 اندکی دچار افزایش وزن شدند، اما افزایش وزن بسیار قابل توجه هنگامی مشاهده شد که رژیم غذایی این گروه از موش‌ها به رژیم پر چرب تغییر کرد: حداقل ۲۰ درصد چربی بدنی آن‌ها (R72) نسبت به موش‌های دارای پرولین (P72) بیشتر بود. آزمایشات تحمل گلوكز خوراکی نیز نشان داد بدنبال رژیم پر چرب موش‌های R72 دچار علایم پیش دیابت و مقاومت به انسولین می‌شوند مورفی و همکارانش همچینن دو زن دیگر را که بوسیله‌ی p53 کنترل می‌شوند، شناسایی نمودند که در کبد موش‌های R72 نسبت به موش‌های P72 به طرز محسوسی متفاوت می‌باشند: زن Npc1L1 با جذب کلسترول و زن Tnf با مقاومت به انسولین ناشی از چاقی ارتباط دارند (۲۱).

اما تاکنون گزارشی مبنی بر اثرات تعاملی تمرین تنابوی شدید و اثرات ضد دیابتی ژل رویال و مصرف طولانی مدت این ماده بر شاخص مقاومت به انسولین و بیان زن P53 کبدی موش‌های مدل چاق شده با رژیم پر چرب و دباتی شده نوع دو با دوز پایین استرپتیوزوتوسین (STZ) مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا در این مطالعه در نظر است تاثیرات تمرینی تنابوی هوازی شدید بهمراه ژل رویال بر بیان زن P53 بافت کبد موش‌های دیابتی نوع دو گزارش گردد تا شاید بتوان از اثر بخشی و نقش آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی ژل رویال در کنار طراحی برنامه ورزشی تنابوی متناسب با رژیم غذایی برای دیابتی‌ها استفاده کرد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش در علوم پزشکی و ورزشی پس از مطالعات انسانی مشابه به عنوان راهی نجات بخش در بهبود عوارض ناشی از دیابت مانند قلب

جدول ۱- ترکیب امولسیون پر چرب جهت گاواز به موش‌های صحرایی

ماده	غذای رایج	غذای پر چرب	غذای پر چرب	غذای پر چرب
کربوهیدرات (%)	۵۰/۰۳	۴۱	۴۵	۲۶
پروتئین (%)	۲۳	۲۴	۲۴	۲۴
چربی (%)	۵/۱	۲۴	۲۴	۳۵
(%Kcal)	-	۴۵	۴۵	۶۰
(Kcal/g)	۳/۱	۴/۸	۴/۸	۵/۲

رودریگرز و همکاران (۲۰۰۷) استفاده شد. برای اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی ($VO_{2\text{max}}$) به دلیل عدم دسترسی به ابزار مستقیم (مانند دستگاه آنالیز گازهای تنفسی) و با توجه به پژوهش‌های انجام شده، پروتکل غیرمستقیم با دقیقت زیاد مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب که هر دو هفته یکبار موشها در یک وهله تمرینی پس از ۵ دقیقه گرم کردن با سرعت ۱۰ متر در دقیقه سپس با سرعت ۱۵ متر در دقیقه به مدت ۲ دقیقه شروع به دویدن کردند و هر ۳ دقیقه ۳ متر در دقیقه به سرعت افزوده شد تا این که هر کدام از موشها که نتوانستند ادامه دهند و روی شوکر باقی ماندند و به واماندگی رسیدند، آن سرعت به عنوان سرعت حداکثر آنان در نظر گرفته می‌شد و سرعت حداکثر برای شدت تمرین بین ۸۰ تا ۹۵ درصد MERT در نظر گرفته شد که خلاصه پروتکل در جدول ۲ آمده است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، ارتباط بالایی بین سرعت نوارگردان و $VO_{2\text{max}}$ رت‌ها وجود دارد ($r=0.94-0.98$, $p<0.05$). از این‌رو می‌توان با توجه به سرعت دویدن، میزان $VO_{2\text{max}}$ رت‌ها را برآورد کرد (۲۸).

پروتکل تمرین تناوبی شدید: برنامه هشت هفته تمرین هوایی، پنج جلسه در هفته با افزایش تدریجی تناوب شدید از سرعت ۲۲ الی ۳۸ متر بر دقیقه (۰ تا ۹۰ درصد $VO_{2\text{max}}$) و تناوب استراحت با سرعت ۱۶ تا ۲۲ متر در دقیقه (۵۰ تا ۵۶ درصد $VO_{2\text{max}}$) زمان ۱۵ الی ۳۴ دقیقه به صورت دویدن روی تردمیل انجام شد، به طوری که زمان دویدن از ۱۶ دقیقه در هفته اول، به ۳۴ دقیقه در هفته هشتم افزایش یافت. رت‌ها یک هفته قبل از شروع پروتکل به منظور آشنایی با تردمیل سه روز در هفته با سرعت ۵ متر در دقیقه با شبیه صفر درصد با زمان ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ دقیقه روی تردمیل راه رفته‌اند. گروه کنترل نیز در طول اجرای پروتکل بهمین ترتیب روی تردمیل راه رفته‌اند (۳۰، ۲۹) (جدول ۲).

نمونه‌گیری: با خاتمه دوره تمرینی و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین گرووهای تجربی تمرینی و پس از ۱۲ ساعت ناشتاپی موشها توسط ماده بی هوشی اتر بی‌هوش و قربانی شدند. نمونه‌های خون از طریق خون-گیری از قلب جمع‌آوری شد و در دمای ۲۰-۲۰ نگهداری

فناوری رویان قرار گرفتند که شامل ۴۵ درصد انرژی کل از چربی مشتق شده از روغن حیوانی حاوی ۲۴ گرم چربی، ۲۴ گرم پروتئین و ۴۱ گرم کربوهیدرات در هر ۱۰۰ گرم می‌باشد رژیم پر چرب ۴۵ درصد به مدت ۳ ماه و رژیم پر چرب ۶۰ درصد به مدت ۲ ماه داده شد (جدول ۱) (۲۳، ۲۲).

روش دیابتی کردن رت‌ها از طریق تزریق استرپتوزتوسین (STZ): برای القای دیابت از رژیم غذایی پر چرب به مدت ۲۰ هفته و سپس تزریق محلول تازه تهیه شده از STZ در سرم فیزیولوژیکی قابل تزریق و به صورت داخل صفاقی ۲۵ میلی گرم/کیلوگرم استفاده شد. یک هفته پس از تزریق، گلوكز خون ناشتاپی با ایجاد جراحت کوچک در دم رت‌ها یک قطره خون بر روی نوار گلوكومتری قرار گرفته و توسط دستگاه گلوكومتر نوار خوانده شد و اندازه گیری گردید و قند خون بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرم/دی لیتر به عنوان معیاری برای اطمینان از ابتلای رت‌ها به دیابت در نظر گرفته شد. برای اطمینان بیشتر از دیابتی شدن موشها و دقت کار از ۱۰ سرموش به طور تصادفی خون گیری از دم به عمل آمد و گلوكز و انسولین و شاخص مقاومت به انسولین آن‌ها اندازه گیری شد که اطلاعات آن در جداول یافته‌ها آمده است (۲۵، ۲۴).

پروتکل مصرف ژل رویال ۷ کروموزومی: در طی دوره آزمایش به موش‌های گروه ژل رویال، و گروه ژل رویال و تمرین تناوبی شدید، ژل رویال با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم (mg/kg) رقيق شده در آب مقطّر و به روش گاواز ۵ روز در هفته برای گروه ژل رویال و تمرین - ژل قبل از شروع تمرین خورانده شد. ژل رویال نیز حاوی مقادیر فراوانی ترکیبات فنلی از خانواده فلاونوئیدها است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان کوئرستین، کامفرول، آپیزین و لوتنولین را نام برد. ژل رویال آنالیز شده و در دمای منفی ۲۰ و به صورت سرد نگهداری شده و هنگام گاواز طبق دوز لازم با توجه به پروتکل رفنس‌ها در آب مقطّر حل و گاواز شد (۲۶ و ۲۷).

آزمون تمرین دویدن با سرعت حداکثر برای تعیین شدت تمرین MERT (Maximal Exercise Test): برای تعیین سرعت حداکثر از پروتکل

جدول ۲ - پروتکل تمرین تنایوی شدید

زمان کل (دقیقه)	شدت سرد کردن ۵ دقیقه	شدت تنایوب استراحت	زمان تنایوب استراحت	سرعت تنایوب شدید	زمان تنایوب شدید	تعداد تنایوب شدید	شدت گرم کردن ۵ دقیقه	هفته
۱۶	۱۰ متر در دقیقه	۱۰٪/۵۰ دقیقه	۱ دقیقه	۱۶٪/۵۰ دقیقه	۳۰ متر در دقیقه	۸۰٪/۸۰ در دقیقه	۲ دقیقه	۱۰ متر در دقیقه
۲۲	۱۰	۱۸٪/۵۲ دقیقه	۱ دقیقه	۱۸٪/۵۲ دقیقه	۳۲ متر در دقیقه	۸۵٪/۸۵	۲ دقیقه	۴ تنایوب
۲۸	۱۰	۲۰٪/۵۴ دقیقه	۱ دقیقه	۲۰٪/۵۴ دقیقه	۳۴ متر در دقیقه	۹۰٪/۹۰	۲ دقیقه	۶ تنایوب
۳۴	۱۰	۲۲٪/۵۶ دقیقه	۱ دقیقه	۲۲٪/۵۶ دقیقه	۳۶ متر در دقیقه	۹۵٪/۹۵	۲ دقیقه	۸ تنایوب

جدول ۳ - پرایمرهای مورد استفاده در این پژوهش

Oligo Name Genes	Primer Sequence (5' → 3')	Product size
P53	For: CCCAGGGAGTGAAAGAGA Rev: CAGCTCTCGAACATCTGA	133 bp
GapDh	For: GCCTGGAGAACCTGCCA Rev: GGAAGAATGGGAGTTGCTGT	137 bp


در این مطالعه ابتدا مطابق برنامه دمایی ذکر شده، واکنش PCR Housekeeping ساخت cDNA انجام شد (جدول ۳) پس از تعیین کیفیت cDNA سنتز شده، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن آنتی بادی واکنش PCR انجام شد.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد. آزمون شاپیرو ویلک جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها و آزمون لوین برای تجانس واریانس‌ها و از آمار استنباطی تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بن فرونی جهت مقایسه تفاوت بین گروه‌ها و از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و شاخص تعیین اندازه اثر جهت مقایسه میزان تاثیرهای از P53 متغیرهای مستقل استفاده گردید. آنالیز آماری ژن P53 با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. در اینجا گروه شاهد به عنوان رفرنس سایر گروه‌ها می‌باشد و بر حسب این گروه P-Value سایر گروه‌ها به دست آورده شد سطح معنی داری $p \leq 0.05$ در نظر گرفته شد.

لازم به ذکر است که طرح تحقیق حاضر موفق به اخذ کد اخلاق به شماره‌ی IR.SSRC.REC.1400.037 از پژوهشگاه تربیت بدنی شد.

گلوکز با استفاده از دستگاه اتو آنالیز و انسولین توسط کیت مخصوص شرکت پارس آزمون اندازه‌گیری شدند. شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) با استفاده از فرمول محاسبه شد ($HOMA = \frac{(\text{گلوكز mg/dl}) * (\text{انسولين } \mu\text{UI/ml})}{20} = 40.5$)

مقاومت به انسولین (HOMA-IR) روش بیان ژن P53 بافت کبد: بافت کبد نیز به منظور اندازه-گیری بیان ژن جدا و بلا فاصله توسط ازت مایع به فریزر منفی ۸۰ منتقل شد. مقداری از بافت کبد برای انجام مراحل ریل تایم درون RNA later قرار داده شد و سپس در فریزر منفی ۲۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد. در مرحله بعد RNA با استفاده از کیت (RiboEx Total RNA isolation solution (GeneAll استخراج شد و در نهایت بررسی کمی و کیفی آن با استفاده از دستگاه نانودارپ و ژل آگارز یک درصد RNA انجام شد. پس از اطمینان از خلوص و کیفیت FIRE استخراج شده، cDNA با استفاده از کیت (Script RT cDNA Synthesis Solis BioDyne ساخته شد و به فریزر منفی ۲۰ انتقال داده شد. سپس برای بررسی ژن P53 پرایمرهای مورد استفاده در این پژوهش توسط نرم افزار Primer3 طراحی شد و توسط شرکت بیوتکنولوژی پیشگام سنتز گردید. توالی پرایمرهای مورد استفاده در جدول ۳ آورده شده است.



شکل ۱- بیان زن p53 را در گروههای مختلف

کنترل کاهش معنی دار (C&EG. P=٠/٠١) داشت.
 میانگین غلظت انسولین (μ UI/ml) در گروه تمرین (٦/٢٢) نسبت به کنترل (٣/٨٩) افزایش معنی دار داشت (C&E. P=٠/٠٥) و در گروه تمرین- ژل رویال (٥/١٢) نسبت به گروه ژل رویال (٧/٣٦) تفاوت معنی داری نداشت (G&EG. P=٠/٩٩٢) اما گروه ژل رویال نسبت به کنترل افزایش معنی داری داشت؛ و در گروه تمرین ژل رویال نسبت به کنترل افزایش غیرمعنی دار داشت. میانگین شاخص مقاومت به انسولین (HOMA) در گروه تمرین (٢/٠٤) نسبت به گروه کنترل (٣/١٨) و ژل رویال (٢/٣١) کاهش معنی دار داشت (P=٠/٠٤٤) (Fold cheng E&G.). میانگین نسبت بیان ژن P53 در گروه تمرین (٠/٤٨) نسبت به کنترل (١) کاهش معنی دار و در گروه تمرین - ژل رویال (٠/٩٤) تفاوت

یافته‌ها

میانگین وزن موش‌های مورد مطالعه در جدول ۴ ارائه شده است.

در جدول ۴ نیز میانگین وزن موش‌ها (گرم) قبل و پس از رژیم پر چرب را نشان می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد وزن بعد از اعمال رژیم پر چرب افزایش قابل مشاهده داشته است. اطلاعات توصیفی گلوکز و انسولین و شاخص مقاومت انسولین موش‌ها که پس از خون‌گیری از دم اندازه‌گیری شده نیز در جدول ۴ مشاهده می‌شود که حاکی از دیابتی شدن موش‌ها می‌باشد.

جدول ۵ وزن پس از رژیم پرچرب، وزن پس از هشت هفته، گلوكز، انسولین، HOMA.IR و P53.gen.Fold.cheng را در گروه کنترل، تمرین تنابی شدید، ژل رویال و گروه ترکیبی تمرین و ژل رویال نشان می‌دهد.

شکل ۱ بیان ژن p53 را در گروه های مختلف را نشان می دهد.

میانگین وزن (گرم) در گروههای تجربی تمرین (۳۷۳/۱۲)، ژل رویال (۳۴۴/۵۷) و تمرین - ژل رویال (۳۳۴/۲۵) نسبت به کنترل (۳۱۷) افزایش غیر معنی-دار داشت. میانگین غلظت گلوکز (میلی گرم بر دسی لیتر) در گروه تمرین (۱۳۸/۲۵) نسبت به کنترل (C&E. P=۰/۰۰۵) کاهش معنی دار داشت (۰/۳۳۳/۸۳) و در گروه تمرین - ژل رویال (۱۳۴) نسبت به گروه ژل رویال (۱۳۱/۵۷) تفاوت معنی داری نداشت داشت (G&EG. P=۰/۹۹۶).

جدول ۴- اطلاعات توصیفی موش‌های صحرایی پس از رژیم پر چرب HFD و القای دیابت با STZ برای تشخیص دیابت نوع دوم

وزن شروع پروتکل (گرم)	وزن پس از چاقی (گرم)	گلوکز (mg/dl)	انسولین (μUI/ml)	HOMA.IR
۱۹۳/۳۴ ± ۱۹/۴۶	۴۰۹/۰۳ ± ۵۱/۶۹	۳۶۳ ± ۱۲۴/۵	۳/۹۲ ± ۰/۴۹	۳/۵۶ ± ۱/۴۳

جدول ۵- توصیف متغیرهای پژوهش در گروههای مختلف

متغیر / گروه	کنترل (۶ سر)	تمرین نتاوی (۸ سر)	ژل رویال (۷ سر)	تمرین و ژل رویال (۸ سر)
وزن پس از رژیم پر چرب (گرم)	۳۸۶/۶۶ ± ۴۸/۴۲	۴۰۷/۳۷ ± ۶۴/۶۴	۴۱۷/۴۲ ± ۳۳/۶۹	۴۲۰/۴۲۰ ± ۵۶/۰۵
وزن پس از هشت هفته (گرم)	۳۱۷ ± ۷۱/۳	۳۷۳/۱۲ ± ۵۴/۲۸	۳۴۴/۵۷ ± ۳۵/۱۷	۳۳۴/۲۵ ± ۳۲/۲۷
گلوکز (مبلي گرم بر دسی لیتر)	۳۳۳/۸۳ ± ۳۹/۳۹	۱۳۸/۲۵ ± ۴۰/۰۴	۱۳۱/۵۷ ± ۱۵/۷۴	۱۳۴/۰۰ ± ۱۴/۸۷
انسولین (μUI/ml)	۰/۵۳ ± ۳/۸۹	۱/۳۵ ± ۶/۲۲	۲/۸۷ ± ۷/۳۶	۰/۸۹ ± ۵/۱۲
HOMA.IR	۰/۳۳ ± ۳/۱۸	۰/۱۵ ± ۲/۰۴	۰/۶۸ ± ۲/۳۱	۰/۱۶ ± ۱/۵۹
P53.gen.Fold.cheng	۱	۰/۴۸ ± ۰/۲۷	۱/۸۹ ± ۰/۸	۰/۹۴ ± ۰/۵۱

جدول ۶- نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

متغیر / آماره	جمع مجزورات	درجه آزادی	میانگین مجزورات	F	معنی داری	نتیجه
وزن	۱۴۰۴۵.۳۵	۳	۴۶۸۱.۷۸	۱.۹۲	۰.۱۵	
	۶۰۷۸.۰۸	۲۵	۲۴۳۰.۷۲			درون گروهها
گلوکز	۱۸۸۷۹۷.۸۱	۳	۶	۷۱.۴۴	۰.۰۰۰۱	بين گروهها
	۲۲۰۲۰.۰۴	۲۵	۸۸۰.۸			درون گروهها
انسولین	۴۳.۸۵	۳	۱۴۶۱	۵.۲۶	۰.۰۰۶	بين گروهها
	۶۹.۴۴	۲۵	۲.۷۷			درون گروهها
شاخص مقاومت به انسولین	۸	۳	۲۶۶	۱۲.۸	۰.۰۰۰۱	بين گروهها
	۵.۲۱	۲۵	۰.۲			درون گروهها
P53	۶.۸۸	۳	۲.۲۹	۹.۳۵	۰.۰۰۰۱	بين گروهها
	۵.۶۳	۲۵	۰.۲۴			درون گروهها

جدول ۷- نتایج تحلیل واریانس دو عاملی و تعقیبی بنفوذی و نیز اندازه اثرگروهها

متغیر/شاخص آماری وزن (گرم)	گروه کنترل	گروه تمرين	Sig.	F	اندازه اثر	نتایج آزمون تعقیبی
گلوکز(میلی گرم بر دسی لیتر)	۰/۹۴۳	۰/۳۴۱	۰/۰۳۶	۰/۰۸۲۷	P= .۰/۰۸۲۷	
	۰/۳۳۴	۰/۵۶۹	۰/۰۱۳			ژل رویال
	۴/۲۹	۰/۰۴۹	۰/۱۴۷			تمرين*ژل رویال
انسولین (میکرو واحد بر میلی لیتر)	۷۵/۷۰	۰/۰۰۱	۰/۷۵۲	C&E. P= .۰/۰۰۰۱		
	۸۶/۵۳	۰/۰۰۱	۰/۷۷۶	E &EG. P= .۰/۰۹۹۲		ژل رویال
شاخص مقاومت به انسولین	۷۹/۵۵	۰/۰۰۱	۰/۷۶۱	C&EG. P= .۰/۰۰۰۱		تمرين*ژل رویال
	۰/۰۰۵	۰/۹۴۶	۰/۰۰۱	C&G. P= .۰/۰۰۱		تمرين
	۳/۶۲	۰/۰۶۹	۰/۱۲۷			ژل رویال
(Fold Cheng) P53	۱۳/۴۵	۰/۰۰۱	۰/۳۵۰	C&E. P= .۰/۰۰۱		تمرين*ژل رویال
	۲۶/۲۳	۰/۰۱۲	۰/۰۰۱	C&G. P= .۰/۰۰۱		تمرين
	۱۲/۷۸	۰/۱۶۷	۰/۰۰۱	E&EG P= .۰/۰۰۱		ژل رویال
بيان ژن P53	۲/۲۶	۰/۰۳۹۴	۰/۱۴۵	C&E. P= .۰/۰۵۳		تمرين*ژل رویال
	۱۵/۴۹	۰/۰۰۱	۰/۳۹۲	G&EG. P= .۰/۰۰۲		تمرين
	۱۱/۷۵	۰/۰۰۲	۰/۳۲۹	G&E. P= .۰/۰۰۱		ژل رویال
تمرين و ژل رویال EG= ژل رویال، G= تمرين، E= کنترل	۰/۹۸۱	۰/۰۳۲	۰/۰۳۹			تمرين*ژل رویال

کبدی کاهش داد اما در گروه ژل افزایش معنی دار داشت و در گروه تعاملی کاهش بیان مشاهده شد. اولین مدرک مرتبط با p53 و ابتلا به دیابت نوع ۲ در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، زمانی که مینا مینو و همکارانش نشان دادند مهار فعالیت P53 پوسیله حذف siRNA در سلولها و یا بوسیله حذف ژن TP53 در موش ها، حساسیت را افزایش داده و باعث کاهش بیان سایتوکاین های التهاب زا در بافت چربی موش ها می شود و بطور مناسبی از توسعه مقاومت به انسولین آنها جلوگیری می کند.

سلولهای بتا لوزالمعده مسئول ترشح انسولین در جریان خون هستند. این با تحریک جذب گلوکز سطح

معنی داری نداشت و در گروه ژل رویال (۱/۸۹) نسبت به کنترل افزایش معنی دار داشت. نتایج ضریب همبستگی نیز بین تغییرات شاخص مقاومت به انسولین و بیان ژن P53 در گروههای تجربی معنی دار نبود.

بحث

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تمرين تناوبی شدید و ژل رویال منجر به کاهش معنی دار گلوکز و افزایش انسولین و کاهش معنی دار مقاومت به انسولین موش های دیابتی نوع دوم تعذیه شده با رژیم پر چرب گردید و بیان ژن سرکوبگر تومور و مرتبط با چاقی P53 را در گروه تمرين تناوبی نسبت به کنترل در بافت

جدول ۸- نتایج ضریب همبستگی

P53.HIIT.Royal.Jelly	P53.Royal.Jelly	P53.HIIT	متغیر
-0.۲۹	0.۰۹	-0.۴۶۷	r HOMA.HIIT
0.۵۲	0.۸۵	0.۲۴۴	Sig
0.۶۲	0.۱۴	0.۳۱	r HOMA.Royal.Jelly
0.۱۳	0.۷۸	0.۴۸	Sig
-0.۲۴	-0.۳۳	-0.۳	r HOMA.HIIT.Royal.Jelly
0.۵۹	0.۵۱	0.۴۶	Sig

انسولین ایجاد می‌شود که بسیار مهم است (مینامینو و همکاران ۲۰۰۹). پیری با واسطه P53 در بافت چربی با افزایش بیان Cdkn1A / p21 و سیتوکین های پیش التهابی و همچنین کاهش بیان سیتوکین های ضد التهابی ارتباط دارد. این گروه نشان داد که بیان بیش از حد p53 مخصوص بافت چربی با تنظیم بیان آنزیم های گلوكونئوتازیک به روش پاراکرین بر عملکرد کبد تأثیر می گذارد. بعداً همان گروه دریافتند که التهاب مزمن با واسطه p53 در بافت چربی منجر به نارسایی قلبی می‌شود و این نشان دهنده ارتباط بین مقاومت به انسولین / دیابت و بیماری های قلبی عروقی است (Shimizu و همکاران ۲۰۱۲). چندین مطالعه نشان داده است که p53 مسیرهای متابولیکی اولیه را پروتئینی مسئول حفظ هموستاز گلوكز تنظیم می‌کند (وانگ و همکاران، ۲۰۱۳). در یک مطالعه تحقیقاتی، جوندگانی که با رژیم غذایی پرچرب، ساکارز بالا تغذیه می شدند و یا با چاقی همراه بودند، میزان فراوانی پروتئین p53 در کبد افزایش یافت، در حالی که توانایی متفورمین برای فعال کردن (ویلا و همکاران، ۲۰۱۴؛ نلسون و همکاران)، بیان بیش از حد p53 باعث کاهش فراوانی SIRT1 می‌شود و تری گلیکوزیدهای سلولی محدود می‌کند. اینها یافته ها حاکی از وجود یک رابطه متقابل بین سیگنالینگ AMPK-SIRT1 کبدی و پروتئین p53 در شرایط مصرف مواد مغذی اضافی و در پاسخ به متفورمین وجود دارد (۳۲). نقش P53 در ایجاد مقاومت به انسولین در کبد در بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) نیز نشان داده شده است. ناهنجاری های کبدی مانند استئاتوز کبدی و استئو ھپاتیت غیر الکلی

گلوكز در گردش خون را کاهش می دهد (Cnop و همکاران ۲۰۰۵). از دست دادن عملکرد سلول های بتا در پانکراس، ترشح انسولین را کاهش می دهد و منجر به افزایش قند خون و دیابت می شود. مسیرهای متعدد سیگنالینگ برای تنظیم عملکرد سلول های بتای لوزالمعده بر روی p53 جمع می شوند. همچنین ژن P53 ناقل های گلوكز را تنظیم می کند. حفظ عملکرد مناسب ناقلين گلوكز در هموستاز گلوكز و سرکوب (Shepherd & Kahn 1999) دیابت بسیار حیاتی است (Kawauchi et al. 2008). گلدوستاین و همکاران دریافتند ژن P53 به طور منفی گلیکولیز را تنظیم می کند. P53 با تنظیم مستقیم تخریب (گلیکولیز) و سنتز (گلوكونئوتاز) بر سطح گلوكز تأثیر می گذارد. همچنین ژن P53 به طور مثبت گلوكونئوتاز را تنظیم می کند. مطالعات اخیر در مورد گلوكونئوتاز، راهی مستقیم برای p53 برای افزایش سطح گلوكز کشف کرده است.علاوه بر این، این گروه دریافتند که p53 فعال باعث افزایش تولید گلوكز کبدی در سلولهای HepG2 و سلولهای کبدی موش در محیط گلوكوزنیک می شود (گلدوستاین و همکاران ۲۰۱۳). القای آنزیم های گلوكونئوتازیک با واسطه P53 در کبد نیز در مدل موش ترازیخته ay منجر به چاقی و دیابت شد که ارتباط فیزیولوژیکی گلوكونئوتاز تنظیم شده با p53 در ایجاد دیابت را نشان می دهد (مینامینو و همکاران ۲۰۰۹). به خوبی شناخته شده است که افزایش بیان و فعالیت p53 در سلولهای چربی موش های چاق اتفاق می افتد (Yahagi et al. 2003). در موش های ترازیخته Ay که با رژیم غذایی پرچرب / ساکارز تغذیه می شوند، پیری با واسطه p53 در بافت چربی با ایجاد فنوتیپ های دیابت مانند و مقاومت به

آنتری اکسیدانی و ضد التهابی آن انجام تمرینات تناوبی می‌توان اثر بخشی آن را از طریق کاهش بیشتر بیان ژن P53 بهبود بخشد. سرکوب تولید گلوكز کبدی توسط همراه با کاهش بیان ژن P53 می‌تواند به طور مؤثر دیابت را بهبود بخشد برای درمان آن مورد سوء استفاده قرار گیرد (۳۸، ۳۹).

ژل رویال نیز حاوی مقادیر فراوانی ترکیبات فنلی از خانواده فلاونوئیدها است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان کوئرستین، کامفروول، آپیژنین و لوئولین را نام برد (۴۰). فلاونوئیدها از چند جهت بر دیابت تأثیر می‌گذارند، این ترکیبات موجب تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و لیپید و کاهش هیبرگلیسمی، دیس لیپیدمی و مقاومت به انسولین می‌شوند و از استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های التهابی ممانعت می‌کنند. فلاونوئیدها (به‌خصوص کوئرستین) از کاهش وزن در دیابت نیز جلوگیری می‌کنند (۴۱، ۴۲) بنابراین ممکن است ژل رویال با محتوای فلاونوئیدی خود از کاهش وزن موش‌های دیابتی در مطالعه حاضر جلوگیری کرده باشد و حتی افزایش غیر معنی دار وزن هم در گروه تمرین و ژل رویال داشتیم و در گروه تمرین هم احتمالاً به‌دلیل افزایش اشتها در نتیجه افزایش فعالیت هورمون‌ها و نروپیتاپیدهای اشتها در نتیجه انجام فعالیتهای ورزشی میزان و رفتار دریافت غذا توسط موش‌ها افزایش یافته و احتمالاً گروه تمرین و نیز ژل رویال بیشتر غذا مصرف می‌کردد که لازم است در پژوهش‌های آتی و تکمیلی هورمون‌ها و نروپیتاپیدهای مرتبط با چاقی و اشتها اندازه گیری و ارتباط سنجی شود و نیز میزان غذای مصرفی هر یک از موش‌ها به طریقی اندازه گیری شود که جزو محدودیت‌های این پژوهش بود. آپیژنین و کوئرستین استرس اکسیداتیو ناشی از استرپتوزوتوسین را در سلول‌های بتا، کبد و کلیه مهار می‌کنند و رادیکال‌های آزاد را کاهش می‌دهند (۴۳، ۴۴) آپیژنین و کامفروول اثر هیپوگلیسمیک در رتهای دیابتی دارند و می‌توانند گلوكز ناشتا را کاهش دهند که در این پژوهش هم این نتیجه مشاهده شد (۴۵). ژل رویال با خاصیت قوی آنتی اکسیدانی، در برابر گونه‌های فعال اکسیژن نظیر رادیکال هیدروکسیل و آنیون سوپراکسید مبارزه می‌کند (۴۶) و به میزان قابل توجهی موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و

(NASH) می‌تواند به فیروز، سیروز و سرطان سلولهای کبدی منجر شود. بیماری NAFLD به دلیل تجمع تری گلیسیرید کبدی با افزایش سطح اسیدهای چرب آزاد در گردش، به مقاومت به انسولین مرتبط است. هر دو این عوامل باعث تشدید وضعیت التهاب و در نهایت تشکیل یک چرخه مغایب می‌شود. نقش P53 برای القا سمیت سلولی که باعث تشدید آسیب کبدی در مدل‌های مختلف موش NAFLD تایید شد. در مطالعه دیگری تأثیر p53 بر روی آپوپتوز بروزی شد، مکانیزمی اساسی که باعث حذف سلولهای کبدی در NAFLD می‌شود نشان داد مقدار p53 به شدت به استئاتوز کبد بستگی داشت و در نتیجه به التهاب مرتبط بود. در حالی که تنظیم مجدد p53 با کاهش تنظیم ضد آپوپتوز Bcl-2 همراه بود (۳۳).

مطالعات نشان داده است که روش‌های مختلف تمرینی، تأثیر مثبتی بر حساسیت به انسولین، کنترل گلیسمی و سایر عوامل خطر مرتبط با دیابت نوع دو دارد. به خوبی نشان داده شده است که تمرین ورزشی، حتی تمرین حاد، می‌تواند حساسیت به انسولین در عضله موش‌های چاق را بهبود بخشد. ورزش هوازی باید یکی از ویژگی‌های کلیدی برنامه‌های تمرینی در دیابت باشد. با اینکه اثربخشی و مقرن به صرفه بودن ورزش برای پیشگیری دیابت نوع دو به خوبی شناخته شده است. در رابطه به مکانیزم‌های سلولی مولکولی برای افزایش برداشت گلوكز توسط انسولین با تمرین ورزشی می‌توان گفت ممکن است این کار تا حدودی به افزایش بیان و فعالیت پروتئین‌های کلیدی شناخته شده برای تنظیم متابولیسم گلوكز در عضلات و کبد مرتبط باشد (۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷).

بنابراین نتایج پژوهش حاضر نیز که کاهش معنی دار بیان ژن P53 را در بافت کبد در گروه تمرین تناوبی شدید نشان می‌دهد و همچنین کاهش بیان این ژن در گروه تعاملی تمرین تناوبی – ژل رویال از این مباحث حمایت می‌کند و می‌تواند اثر گذاری انجام تمرین تناوبی را بر کاهش بیان ژن P53 بافت کبدی بر طبق مسیرهای تنظیمی اشاره شده نشان دهد ولی در گروه ژل رویال تنها، کاهش معنی داری در بیان این ژن مشاهده نشد که می‌توان استنباط کرد در هنگام استفاده از ژل رویال جهت استفاده از خواص دارویی و

ورزشی هوازی از نوع تمرینات تناوبی می‌تواند اثر بخشی آن را بهبود بخشد با این وجود انجام مطالعات بیشتر و تکمیلی در این زمینه ضروری می‌باشد.

تقدیر و تشکر

این مقاله مستخرج از رساله دکتری بود و با کد اخلاق IR.SSRC.REC.1400.037 در کمیته اخلاق پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم تایید شد. از تمام همکاران پژوهشی و پرسنل آزمایشگاهی تقدیر و تشکر می‌شود.

References

- Shokrolahi Ardakani A, Abednatanzi H, and et al. The Effect of Resistance Training on G6Pase Gene Expression in Liver Hepatocytes, Glucose and Insulin Resistance Levels in Type 2 Diabetic Rats. Iran J Diabetes Obes. 2020;12(14).
- Chahardoli M, Mahmoodi M, Hajizadeh M, Khoramdel Azad H, Khoshdel A, Mirzaei M. Effect of Aloe Vera Hydroalcoholic Extract on Blood Glucose, Serum Insulin and the Key Enzymes in Metabolic Pathways of Glycolysis and Gluconeogenesis in Hepatocytes of Type 1 Diabetic Rats. JRUMS. 2015;13(8):669-682 (Persian).
- jabbari E, gholami M, Nikbakht H, shakeri N, ghazaliyan F. Effect of aerobic training and L-carnitine supplementation on some apoptotic factors in diabetic rat liver. Razi J Med Sci. 2019;26(7):131-140.
- Doustar, Y. Mohajeri, D. Rezaei, A. Effects of grape seed extract on heart cells apoptosis in streptozotocin induced diabetic rats. Med Sci J Islam Azad Uni. 2012;21(3):168-74.
- Frustaci A, Kajstura J, Chimenti C, Jakoniuk I, Leri A, Maseri A. Myocardial cell death in human diabetes. Circ Res. 2000;87:1123-32.
- Jaeschke H. Reactive oxygen and mechanisms of inflammatory liver injury. J.Gastroen. Hepatol. 2000;15:718-24.
- Mirdar Harijani Sh, Musavi N, Hamidian Gh. Effect of endurance swimming training during pregnancy on histology and apoptotic index of rats' liver. ISMJ. 2015;18(1):54-63.
- Godin G, Desharnais R, Valois P, Lepage L, Jobin J, Bradet R. Differences in perceived barriers to exercise between high and low intenders: observations among different populations. Am J Health Prom. 1994;(8):279-285.
- Khajehlandi A, Abed Natanzi H, Nikbakht H. The Effect of Swimming Training and Aloe Vera Extract on Lipid Profile of Male Diabetic Rats. J Isfahan Med School. 2017; 34(411).

افزایش آنتی اکسیدان‌ها در بافت پانکراس بیماران دیابتی تیپ ۲ می‌شود که با توجه به مطالب ذکر شده، بخشی از این اثرات احتمالاً به علت وجود فلاونوئیدها در ژل رویال ایجاد شده است. اثر هیپوگلیسمیک ژل رویال را به ویتامین‌های موجود در آن نیز می‌توان نسبت داد (۴۷، ۴۸). مطالعات نشان داده است که ویتامین‌های E, D, C, B و بیوتین و نیاسین به فراوانی در ژل رویال یافت می‌شود. ویتامین C سطح گلوکز سرم را در دیابت نوع دو کاهش می‌دهد (۴۹) و در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی به صورت رقابتی جانشین گلوکز می‌شود و از گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها به خصوص هموگلوبین و لیپوپروتئین‌ها مانع است می‌کند. ویتامین‌های B1, B6 و بیوتین و نیاسین نیز عملکرد سلول‌های بتا را تقویت می‌کنند و با تحریک تولید گلیکوژن و مهار گلوکونتیزز، سطح گلوکز را در بیماران مبتلا به دیابت کاهش می‌دهد. (۵۰)؛ بنابراین بخشی از نقش مصرف ژل رویال بر کاهش گلوکز را می‌توان به ترکیبات ویتامینی موجود در آن نسبت داد.

نتیجه گیری

به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات تناوبی و همینطور در تعامل با ژل رویال می‌تواند باعث کاهش بیان ژن P53 گردد و در بهبود سطوح گلوکز بواسطه تاثیر مولفه‌های ژنتیکی مؤثر در رهایی گلوکز کبدی و در بیماران دیابتی نوع دو مؤثر می‌باشد هر چند نتایج نشان داد ضریب همبستگی نیز بین تغییرات شاخص مقاومت به انسولین و بیان ژن P53 در گروههای تجربی معنی دار نبود. ژل رویال هم بدلیل ترکیبات متنوع ویتامینی و پروتئینی و ترکیبات فنلی و جایگزین خوب برای نقش گلوکز و نیز نقش‌های متعدد آنتی اکسیدانی و ضد التهابی و ... موجب تنظیم متابولیسم کربوهیدرات‌ها بویژه گلوکز و نیز تنظیم متابولیسم لیپید و کاهش هیپرگلیسمی و دیس لیپیدمی و کاهش مقاومت به انسولین می‌شوند و از استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های التهابی افراد دیابتی نوع دو که دیابت مرتبط با ورزش و معمولاً همراه با اضافه وزن و چاقی نیز می‌باشد مانع می‌کنند اما مصرف ژل رویال به تنها ی نمی‌تواند در این زمینه‌ها و تغییرات بیان ژن P53 مؤثر باشد و استفاده از برنامه‌های تمرینی

10. Shapiro K, Gong WC. Natural products used for diabetes. *J Am Pharmacol Assoc.* 2002;42:217-26.
11. Khajehlandi A, Abed Natanzi H, Nikbakht H. The Effect of Swimming Training and Aloe Vera Extract on Lipid Profile of Male Diabetic Rats. *J Isfahan Med School.* 2017;34(411). [Persian].
12. Yeylaghi Ashrafi M R, Abednatanzi H, Ghazalian F. The effect of eight weeks of high intensity interval training and n-chromosomal royal jelly on G6Pase gene expression in hepatocytes, glucose levels and insulin resistance in type 2 diabetic rats. *Razi J Med Sci.* 2020;27(8). [Persian].
13. Khazaei M, Ansarian A, Ghanbari E. New findings on biological actions and clinical applications of royal jelly: a review. *J Diet Suppl.* 2018;15(5):757-75.
14. Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Álvarez JA. Functional properties of honey, propolis, and royal jelly. *J Food Sci.* 2008;73(9):117-24.
15. Izuta H, Chikaraishi Y, Shimazawa M, Mishima S, Hara H. 10-Hydroxy-2-decenoic acid, a major fatty acid from royal jelly, inhibits VEGF-induced angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells. *Evid-Based Complement Altern Med.* 2009;6(4):489-94.
16. Nakajima Y, Tsuruma K, Shimazawa M, Mishima S, Hara H. Comparison of bee products based on assays of antioxidant capacities. *BMC Complement Altern Med.* 2009;26:9(4).
17. Nagai T, Inoue R. Preparation and the functional properties of water extract and alkaline extract of royal jelly. *Food Chem.* 2004;84(2):181-6.
18. Ramadan MF, Al-Ghamdi A. Bioactive compounds and health-promoting properties of royal jelly: a review. *J Funct Foods.* 2012;4:39-52.
19. Shidfar F, Jazayeri Sh, Musavi SN, Malek M, and et.al. Does Supplementation with Royal Jelly Improve Oxidative Stress and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Patients? *Iran J Public Health.* 2015;44(6):797-803.
20. Nomura M, Maruo N, Zamami Y, Takatori S, Kawasaki H. Effect of long-term treatment with royal jelly on insulin resistance in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF) rats. *Yakugaku zasshi: J Pharm Soc Jpn.* 2007;127(11):1877-82.
21. Kung CP, Leu JI, Basu S, et al. The P72R Polymorphism of p53 Predisposes to Obesity and Metabolic Dysfunction. *Cell Rep.* 2016;14(10):2413-2425.
22. Zou Y, Li J, Lu C, Wang J, Ge J, Huang Y, et al. High-fat emulsion-induced rat model of nonalcoholic steatohepatitis. *Life Sci.* 2006 Aug 8;79(11):1100-1107.
23. Gheibi S, Bakhtiari Zadeh F, Ghasemi A. A review of the high-fat diet model - Streptozotocin for type 2 diabetes in rats. *Journal of Endocrinology and Metabolism of Iran.* Shahid Beheshti Univ Med Sci Health Serv. July 2016;18(2):135-148. [Persian].
24. Aghanouri Z, Noureddini M, Salami M. Effect of Citrullus colocynthis on diabetic rat's plasma glucose. *Feyz.* 2009;12(4):1-6. [Persian].
25. Moeini Fard M, Hedayati M. Aluxan and Streptozotocin, Diabetes Research Tool. *J Appl Sports Physiol.* 2014;10(20):13-22. [Persian].
26. Asgari M, Asle-Rousta M, Sofiabadi M, Effect of Royal Jelly on Blood Glucose and Lipids in Streptozotocin Induced Type 1 Diabetic Rats. *Arak Med Uni J.* 2017;20(122):48-56.
27. Baburao Waykar B. and Alqadhi YA, Administration of Honey and Royal Jelly Ameliorate Cisplatin Induced Changes in Liver and Kidney Function in rats. *Biomed Pharmacol J.* 2018;11(4):2191-2199.
28. Rodrigues B, Figueroa DM, et al. Maximal exercise test is a useful method for physical capacity and oxygen consumption determination in Streptozotocin -diabetic rats. *Cardiovasc Diabetol.* 2007;6:38.
29. Akbarzadeh A, Fattahibafghi A. The effect of high intensity interval training combined with curcumin supplementation on Plasma glucose concentration and insulin resistance in diabetic rats. *JSSU.* 2018;25(12):961-969 [Persian].
30. Rezaei R, Norshahi M, Bigdeli MR, Khodagholi F, Haghparast A, Effect of eight weeks of continuous and interval intense aerobic exercise on VEGFR-2 and VEGF-A values in the brain tissue of wistar rats. *Journal of Exercise Physiology and Physical Activity. Physiol Exerc Physic Act.* 2015;8(2):1213-1221. [Persian].
31. Kung CP, Murphy ME. The role of the p53 tumor suppressor in metabolism and diabetes. *J Endocrinol.* 2016 Nov;231(2):R61-R75.
32. Murtaza, I. P53 transcription factor and diabetes: Is there any link? *JAB* 2016, 9, 1825-1833.
33. Strycharz J, Drzewoski J, Szemraj J, Sliwinska A. Is p53 involved in Tissue-Specific Insulin Resistance Formation? *Oxid Med Cell Longev.* 2017;9270549.
34. Wu H, Deng X, Shi Y, Su Y, Wei J, Duan H. PGC-1 α , glucose metabolism and type 2 diabetes mellitus. *J Endocrinol.* 2016;229(3):R99-R115.
35. Yoon JC, Puigserver P, Chen G, Donovan J, Wu Z, Rhee J, et al. Control of hepatic gluconeogenesis through the transcriptional coactivator PGC-1. *Nature.* 2001;413(6852):131.
36. Rui L. Energy metabolism in the liver. *Comprehens Physiol.* 2014;4(1):177.
37. Aoi W, Ichiiishi E, Sakamoto N, Tsujimoto A, Tokuda H, Yoshikawa T. Effect of exercise on hepatic gene expression in rats: a microarray analysis. *Life Sci.* 2004;75(26):3117-28.
38. Sharabi K, Lin H, Tavares CD, Dominy JE, Camporez JP, Perry RJ, et al. Selective chemical

inhibition of PGC-1 α gluconeogenic activity ameliorates type 2 diabetes. *Cell.* 2017;169(1):148-60. e15.

39. Way KL, Hackett DA, Baker MK, Johnson NA. The effect of regular exercise on insulin sensitivity in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *J Diabetes Metab.* 2016;40(4):253-71.

40. Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Álvarez JA. Functional properties of honey, propolis, and royal jelly. *J Food Sci.* 2008;73(9):117-24.

41. Kocot J, Kiełczykowska M, Luchowska-Kocot D, Kurzepa J, Musik I. Antioxidant potential of propolis, bee pollen, and royal jelly: possible medical application. *Oxid Med Cell Longev.* 2018;1-29.

42. Testa R, Bonfigli AR, Genovese S, De Nigris V, Ceriello A. The Possible Role of Flavonoids in the Prevention of Diabetic Complic. *Nutr.* 2016;8(5):310.

43. Coskun O, Kanter M, Korkmaz A, Oter S. Quercetin, a flavonoid antioxidant, prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and β -cell damage in rat pancreas. *Pharmacol Res.* 2005;51(2):117- 23.

44. Rauter AP, Martins A, Borges C, Mota- Filipe H, Pinto R, Sepedes B, et al. Antihyperglycaemic and protective effects of flavonoids on streptozotocin-induced diabetic rats. *Phytother Res.* 2010;24(S2):S133-8.

45. De Sousa E, Zanatta L, Seifriz I, Creczynski-Pasa TB, Pizzolatti MG, Szpoganicz B, Silva FR. Hypoglycemic Effect and Antioxidant Potential of Kaempferol-3, 7-O-(α)-dirhamnoside from Bauhinia forficata Leaves. *J Nat Prod.* 2004;67(5):829-32.

46. Nagai T, Inoue R, Suzuki N, Nagashima T. Antioxidant properties of enzymatic hydrolysates from royal jelly. *J Med Food.* 2006;9(3):363-7.

47. Amirshahi T, Nejati V, Najafi G. Biochemical and Histological Evaluation of Protective Effect of Royal Jelly on PancreasInduced Oxidative Stress in Male Rat Pancreas. *J Mazandaran Uni Med Sci.* 2013;23(107).

48. Afkhami-Ardekani M, Shojaoddiny Ardekani A. Effect of vitamin C on blood glucose, serum lipids & serum insulin in type 2 diabetes patients. *Indian J Med Res.* 2007;126(5):471.

49. Dakhale GN, Chaudhari HV, Shrivastava M. Supplementation of vitamin C reduces blood glucose and improves glycosylated hemoglobin in type 2 diabetes mellitus: a randomized, double-blind study. *Adv Pharmacol Sci.* 2011;1-5.

50. Xiang X, Liu Y, Zhang X, Zhang W, Wang Z. Effects of biotin on blood glucose regulation in type 2 diabetes rat model. *J Hyg Res.* 2015;44(2):185- 9.