



بررسی تأثیر پودر سلولزی و کرومولین سدیم در کنترل علائم رینیت آлерژیک و کیفیت زندگی و ارتباط آن با یافته‌های سی تی اسکن

علیرضا وطن خواه: متخصص تصویر برداری، بخش رادیولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سعید دبیری فر: دانشکده پردازشکنی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

فاطمه خالقی: دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران (* نویسنده مسئول) fateme.khaleghi2016@gmail.com

چکیده

کلیدواژه‌ها

آل پودر سلولزی،
کرومولین سدیم،
رینیت آлерژیک،
کیفیت زندگی،
سی تی اسکن

زمینه و هدف: رینیت آлерژیک بیماری التهابی مخاط بینی بوده که می‌تواند زندگی روزمره بیمار را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پودر سلولزی و کرومولین سدیم در کنترل علائم رینیت آлерژیک و کیفیت زندگی بیماران و همچنین ارتباط آن با یافته‌های سی تی اسکن طراحی و انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که بر روی بیماران مبتلا به رینیت آлерژیک مراجعه کننده به مرمانگاه ENT بقیه ا. (عج) انجام شد. مطالعه بصورت رندوم و تک فاز در دو گروه (۵۰ نفر برای هر گروه) و با استفاده اسپری کرومولین با دوز ۳ پاف در روز و اسپری نازالیز با دوز ۳ پاف در روز به مدت ۶ هفته در بیماران صورت گرفت. تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی، نمره اندوسکوپی بینی بر اساس معیار Kennedy score, Lund و نمره دهی آنالوگ دیداری صورت گرفت. داده‌های جمع آوری شده از هر دو گروه مورد مطالعه توسط تست‌های آماری مربوطه با هم مقایسه شد.

یافته‌ها: بر سی‌های آماری نشان داد که میزان شدت عطسه و همچنین میزان شدت آریزش بینی در هر دو گروه بعد از اتمام درمان به صورت معناداری بهبود داشت. میانگین نمره RQLQ پس از درمان بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت؛ با توجه به نتایج بدست آمده اختلاف آماری معناداری بین یافته‌های سی تی اسکن در هر دو گروه یافت نشد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که داروی نازالیز با توجه به بهبود علائم و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به رینیت آлерژیک می‌تواند به عنوان دارویی موثر و بدون عارضه در درمان این بیماران مورد استفاده قرار گیرد. اما از لحاظ تأثیرگذاری موثرتر از داروی کرومولین نمی‌باشد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت‌کننده: حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Vatankhah A, Dabirifar S, Khaleghi F. Investigating the Effect of Cellulose Powder and Cromolyn Sodium in Controlling Allergic Rhinitis Symptoms and Quality of Life and Its Relationship with CT Scan Findings. Razi J Med Sci. 2023;29(12): 487-496.

* انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است.



Original Article

Investigating the Effect of Cellulose Powder and Cromolyn Sodium in Controlling Allergic Rhinitis Symptoms and Quality of Life and Its Relationship with CT Scan Findings

Alireza Vatankhah: MD, Department of radiology, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

Saeed Dabirifar: Faculty of Paramedical School, Ferdosi University, Mashhad, Iran

✉ Fatemeh Khaleghi: Assistant Professor, Department of Radiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran (* Corresponding author) fateme.khaleghi2016@gmail.com

Abstract

Background & Aims: Allergic rhinitis is an inflammatory disease of the nasal mucosa, the prevalence of which is estimated at 40% in children and 10-30% in adults. The symptoms of the disease include frequent sneezing, runny nose, itching of the nose, throat and eyes, which can significantly affect the patient's daily life and activities. Over time, these symptoms may lead to depression, anxiety and loss of performance by affecting a person's psyche. In the United States, this disease accounts for 2.5% of medical visits. Unfortunately, only in a small number of patients, the symptoms may be suppressed for a long time and may not return. Currently, the prevalence of disease is increasing in industrialized countries, especially in urban areas, and it imposes a lot of costs on societies. On the other hand, due to the fact that the cause of the disease is unknown, no definitive treatment has been proposed yet. But the existing symptomatic treatments have been able to relieve the annoying symptoms of the disease to some extent. The most effective treatment in patients with severe and permanent symptoms is the use of topical intranasal corticosteroids. Cellulose powder is used as a thickener in many nasal sprays. Due to the fact that cellulose powder acts as a protective layer, it plays a role in preventing the inhalation of pollen, dust and allergens and prevents these substances from reaching the nasal mucosa. As a result of allergies, the nasal mucosa has a low surface tension, and allergens can easily pass through the nasal mucosa and be absorbed by the nasal mucosa, and cellulose powder reduces the symptoms of patients by compensating this system. Also, intranasal cromolyn is widely available today and is used in the treatment of allergic rhinitis with the mechanism of inhibiting the granulation of mast cells. Although this drug is safe for general medicinal use, it is not used as a line of treatment because compared to antihistamines and intranasal corticosteroids, it is less effective in reducing symptoms, the results of a study showed that consumption of cellulose powder significantly improved all symptoms of allergic rhinitis and especially runny nose in these people and no clinical side effects were reported in these people. Also, Nasaliz was able to control hay fever well and significantly improved the patients' symptoms. In general, CT scan is usually not recommended for simple rhinitis. However, when rhinosinusitis or nasal polyp is suspected, especially if it does not respond to medical treatment, CT scan is useful. Due to the chronic nature of this disease on one hand and patients' self-treatment and lack of attention to medical recommendations on the other hand, definitive and effective treatment of allergic rhinitis has become a challenge for patients and treatment staff. The present study was designed and carried out with the

Keywords

Cellulose powder,
Cromolyn sodium,
Allergic rhinitis,
Quality of life,
CT scan

Received: 07/01/2023

Published: 04/03/2023

aim of investigating the effects of nasal cellulose powder and sodium cromolyn in controlling the symptoms of allergic rhinitis and quality of life, as well as its relationship with CT scan findings in patients referred to Baqiyatullah Clinic.

Methods: The present study is a clinical trial that was conducted on patients with allergic rhinitis who were referred to the ENT clinic of Baghiy A. (Aj). The study was conducted as a random and single-phase study in two groups (50 people for each group) using Cromolyn spray with a dose of 3 puffs per day and nasal spray with a dose of 3 puffs per day for 6 weeks in patients. RQLQ quality of life questionnaire, nasal endoscopy score based on Lund criteria, Kennedy score, and visual analog scale (VAS) was completed. Also, in this study, patients with a clinical diagnosis of allergic rhinitis were selected for a CT scan of the Paranasal sinuses without medical treatment. They were referred to the CT scan departments of Baqiyatullah University of Medical Sciences and underwent a Paranasal CT scan and indicators such as polyps, mild mucosal thickening without obstruction, increased bone density of the sinus wall, septal deviation, inferior corneal hypertrophy, and Conca Bellaza were investigated. Then, the findings of the CT scan were reported blindly by only one radiologist. The data collected from both study groups were compared by the respective statistical tests. The significance level for data difference was considered 0.05.

Results: The severity of nasal congestion after 6 weeks of treatment was 2.27 ± 0.97 in the sodium Cromolyn group and 4.61 ± 1.1 in the cellulose powder group. There was a significant difference in the mean severity of nasal congestion after treatment between the two groups. ($P=0.03$). Statistical analysis showed that the intensity of sneezing and also the intensity of runny noses in both groups improved significantly after the completion of the treatment. ($P=0.00$). The mean RQLQ score after treatment was 22.525 ± 5.71 in the sodium Cromolyn group and 25.85 ± 2.91 in the cellulose powder group. There was no significant difference between the two groups in the average RQLQ score after treatment. ($P=0.073$). In this study, the relationship between CT scan findings in both groups of patients before and after the use of both drug categories was investigated. In this study, both groups of patients underwent CT scans before starting the treatment, and the most common findings in both groups in the CT scan were polyps, mild mucosal thickening without obstruction, increased bone density of the sinus wall, and septal deviation. hypertrophy of the inferior cornea and Conca Blesa, also according to the obtained results, no statistically significant difference was found between the findings of the CT scan in both groups (P -value <0.05).

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that nasal decongestant can be used as an effective drug without complications in the treatment of allergic rhinitis patients due to the improvement of symptoms and quality of life. But in terms of effectiveness, it is not more effective than Cromolyn. On the other hand, there is no correlation between CT scan findings among patients with allergic rhinitis, and it can be said that the use of radiology and especially CT scans is not recommended for allergic rhinitis.

Conflicts of interest: None

Funding: None

Cite this article as:

Vatankhah A, Dabirifar S, Khaleghi F. Investigating the Effect of Cellulose Powder and Cromolyn Sodium in Controlling Allergic Rhinitis Symptoms and Quality of Life and Its Relationship with CT Scan Findings. Razi J Med Sci. 2023;29(12): 487-496.

*This work is published under CC BY-NC-SA 3.0 licence.

مطالعه نشان داد که مصرف پودر سلولز باعث بهبود معنadar تمامی علائم رinitی آرژیک و مخصوصاً آبریزش بینی در این افراد شد و هیچ گونه عارضه جانبی بالینی در این افراد گزارش نشد (۱۲). همچنین نازالیز توانست تب یونجه را به خوبی کنترل کند و به طور معنadarی باعث بهبودی سریع علائم بیماران شد (۱۳). یکی از روش‌های تشخیص در بیماری‌های سینوزیت الرژیک استفاده از رادیولوژی و بالاخص سی‌تی اسکن می‌باشد (۱۴). به طور کلی سی‌تی اسکن به طور معمول برای رینیت ساده تو صیه نمی‌شود. با این حال، هنگامی که مشکوک به رینوسینوزیت یا پولیپ بینی هستیم، به خصوص که به درمان دارویی پاسخ نمی‌دهد، سی‌تی اسکن مفید است (۱۵). با توجه به ماهیت مزمن این بیماری از یک طرف و خود درمانی بیماران و عدم توجه به توصیه‌های پزشکی از طرف دیگر، درمان قطعی و موثر رینیت آرژیک به چالشی پیش روی بیماران و قادر درمان تبدیل شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقاصه‌ای تاثیر پودر سلولز نازالیز و کرومولین سدیم در کنترل علائم رینیت آرژیک و کیفیت زندگی و همچنین ارتباط آن با یافته‌های سی‌تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بقیه الله (عج) طراحی و انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که برروی بیماران مبتلا به رینیت آرژیک مراجعه کننده به درمانگاه ENT بقیه الله (عج) انجام شد که تعداد حجم نمونه ۵۰ نفر برای هر گروه تعیین شد. مطالعه به صورت رندوم و تک فاز در دو گروه و با استفاده اسپری کرومولین با دوز ۳ پاف در روز و اسپری نازالیز با دوز ۳ پاف در روز به مدت ۲ هفته در بیماران مبتلا به رینیت آرژیک خفیف صورت گرفت. انتخاب بیماران بر اساس معیارهای ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on ASTHMA Intermittent and Persistent Allergic Rhinitis) (IAR) بوده که به صورت م Moderat to Severe تقسیم بندی شد. معنای وجود یکی از علائم زیر می‌باشد: اشکال در خواب، اختلال در فعالیت روزانه، اوقات فراغت و ورزش،

مقدمه

رینیت آرژیک بیماری التهابی مخاط بینی است که شیوع آن در کودکان ۴۰٪ و در بزرگسالان ۳۰٪ تخمین زده می‌شود (۱). علایم بیماری شامل عطسه‌های مکرر، آبریزش بینی، خارش بینی، گلو و چشم‌ها است (۲) که قادرند زندگی روزمره و فعالیت‌های بیمار را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند (۳). این علایم با گذشت زمان با تاثیر بر روح و روان فرد ممکن است منجر به افسردگی، اضطراب و افت عملکرد وی شود (۴). در ایلات متعدد، این بیماری٪ ۲/۵ مراجعات طبی را شامل می‌شود (۵). متأسفانه فقط در تعداد اندکی از بیماران ممکن است علایم به مدت طولانی سرکوب شود و برگشت نداشته باشد (۶). در حال حاضر، شیوع بیماری در کشورهای صنعتی و خصوصاً در مناطق شهری رو به افزایش بوده و هزینه‌های زیادی را به جوامع تحمیل می‌نماید (۷). از طرفی با توجه به ناشناخته بودن علت بیماری هنوز درمان قطعی جهت آن پیشنهاد نشده است. ولی درمان‌های علامتی موجود، تا حدودی توانسته اند علائم آزاردهنده بیماری را برطرف نمایند (۸). مؤثرترین درمان در بیماران مبتلا به علائم شدید و دائمی استفاده از کورتیکوستروئیدهای موضعی اینترانازال می‌باشد (۹). پودر سلولزی به عنوان قوام دهنده در بسیاری از اسپری‌های بینی استفاده می‌شود. پودر سلولزی به دلیل آن که به عنوان یک لایه محافظ عمل می‌کند در جلوگیری از استنشاق گردها، خاک و مواد حساسیت‌زا نقش داشته و از رسیدن این مواد به مخاط بینی ممانعت می‌کند. در نتیجه آرژی، مخاط بینی دارای کشش سطحی کمی می‌شود و آرژن‌ها به راحتی می‌توانند از مخاط بینی عبور کرده و جذب مخاط بینی شود که پودر سلولز با جبران این سیستم باعث کاهش علائم بیماران می‌شود (۱۰). همچنین کرومولین داخل بینی امروزه به طور فراوان در دسترس است و با مکانیسم مهار گرانولا سیون ماست سل‌ها در درمان علائم رینیت آرژیک کاربرد دارد. اگرچه این دارو برای استفاده عمومی دارویی امن است ولی به علت اینکه این دارو در مقایسه با آنتی‌هیستامین‌ها و کورتیکوستروئیدهای داخل بینی اثر کمتری در کاهش علائم دارد به عنوان خط لول درمان استفاده نمی‌شود (۱۱)، نتایج یک

آنالوگ دیداری. بررسی‌های ویزیت دوم عبارت بود از معاینه بالینی و اندوسکوپی و Follow up بیماران (از جهت بررسی تاثیر درمان) و نمره‌دهی آنالوگ دیداری و بررسی‌های ویزیت سوم نیز شامل معاینه بالینی کامل و اندوسکوپی بینی-پرسشنامه کیفیت زندگی و نمره‌دهی آنالوگ دیداری بود.

همچنین در این مطالعه برا ساس حجم نمونه تقریبی ۱۰۰ نفر (از هر گروه ۵۰ نفر) با تشخیص بالینی رینیت الرژیک جهت انجام سی تی اسکن سینوس‌های پارانازال و بدون درمان طبی به بخش‌های سی تی اسکن بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ارجاع شده و تحت سی تی اسکن پارانازال قرار گرفتند. در این مطالعه شاخص‌های تشخیصی از قبیل هایپرتروفی کورونه تحتنی، کونکا بلازا، انحراف سپتوم، پولیپ، ض-خیم ش-دگی خفی-ف مخاطی بدون انسداد، افزایش دانسیته استخوانی جدار سینوس مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه سی تی اسکن با دستگاه توشیبا Xvid انجام شد. ضخامت مقاطع و فواصل بین آن‌ها ۵ میلی‌متر بوده، کیلو ولتاژ ۱۲۰ و میلی‌آمپر ثانیه ۱۴۰ انتخاب گردید. سپس یافته‌های سی تی اسکن توسط تنها یک متخصص رادیولوژی به صورت Blind گزارش گردید.

داده‌های جمع آوری شده از هر دو گروه مورد مطالعه در بانک نرم افزاری SPSS ذخیره و فراوانی مشخص شد. سپس نتایج هر دو روش درمانی در هر دو گروه توسط تست‌های آماری تی استیودنت جهت داده‌های کمی و χ^2 جهت داده‌های کیفی با هم مقایسه شد. سطح معنی‌داری جهت اختلاف داده‌های 0.05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در این مطالعه ۱۰۰ بیمار با میانگین سنی 14.81 ± 3.64 سال مورد بررسی قرار گرفت (۵۰ بیمار در هر گروه). میانگین سن در گروه کرومولین سدیم 11.26 ± 3.47 سال و در گروه پودر سلولزی 12.71 ± 3.47 سال بود. میانگین سنی دو گروه اختلاف معنی‌داری با

اختلال در مدرسه و محل کار، علائم ناتوان کننده و نداشتن علائم فوق Mild Allergic Rhinitis می‌شود. بیماران با شدت بیماری Mild وارد این مطالعه شدند. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بود از بیماران با آنتی هیستامین‌های دیگر و یا کوتیکواستروئیدها و بارداری بر اساس شرح حال بیماران و موارد اورژانسی که نیازمند سایر مداخلات درمانی بود. مطالعه به صورت تک فاز و یک ماهه انجام گرفت. در این دوره ۳ ویزیت توسط پزشک صورت گرفت. اولین ویزیت روز قبل از شروع مطالعه و نوبت‌های بعدی ۲ هفته و ۶ هفته پس از شروع درمان. قبل از شروع مطالعه و پس از پایان آن پارامترهای ارزیابی بیماران ثبت شد. پس از ویزیت اولیه، بیماران وارد مطالعه شده و به صورت رندوم، کرومولین سدیم و پودر سلولزی دریافت کردند و در ویزیت دوم و سوم به ترتیب گروهی از پارامترها و تمام پارامترها ارزیابی شدند. پارامترهای مورد بررسی عبارت بود از: تاریخچه و معاینات بالینی از جمله رینوسکوپی که انسداد، رنگ مخاط، هایپرتروفی و ترشحات قابل ارزیابی می‌باشند. پرسشنامه کیفیت زندگی: این پرسشنامه شامل ۲۸ سوال می‌باشد که تو سط خود بیمار پاسخ داده می‌شود. ۴ مجموعه سوال (۲۶ سوال) از جمله عالیم بیمار، اختلالات عملکردی، فعالیت و احساسات را در بر می‌گیرد. نمره‌دهی آن بر اساس ۱ تا ۷ می‌باشد و توسط خود بیمار پر می‌شود. نمره اندوسکوپی بینی بر اساس معیار Lund - Kennedy score (نمره دهی آن بر اساس ۰ تا ۶)، نمره‌دهی آنالوگ دیداری: توسط خود بیمار عدد گذاری می‌شود (۰ تا ۱۰). نمره VAS گرفتگی بینی، در پیش‌بینی، کاهش قدرت بیوایی بر اساس شدت کاهش می‌باشد که عدد ۱۰ به معنای گرفتگی کامل بینی، در پیش‌بینی می‌باشد. پشت حلق و از دست دادن کامل قدرت بیوایی می‌باشد. به منظور تسهیل عملکرد بیمار یک خط کش ۱۰ سانتی‌متری در پرسشنامه چاپ شد که بیمار عدد مورد نظر را علامت‌گذاری می‌کند. به طور کلی بررسی‌های ویزیت اول عبارت بود از معاینه بالینی کامل و اندوسکوپی بینی-پرسشنامه کیفیت زندگی و نمره‌دهی

بررسی‌های آماری نشان داد ساقه آلرژی بین دو گروه اختلاف معنی‌داری ندارد ($P = 0.692$). از طرف دیگر بررسی‌های آماری نشان داد ساقه آسم نیز بین دو گروه اختلاف معنی‌داری ندارد. یافته‌های معاینه قبل از درمان در بیماران به تفکیک گروه‌ها درمانی در جدول ۱ ارائه شده است. بررسی‌های آماری نشان داد که بیماران هر دو گروه از نظر یافته‌های معاینه اختلاف معنی‌داری نداشتند.

نتایج مطالعه حاضر در رابطه با بررسی تاثیر پودر سلولزی و کرومولین سدیم در کنترل علائم رینیت

یکدیگر نداشت. در مجموع ۴۳ بیمار (۴۳٪) زن و ۵۷ بیمار (۵۷٪) مرد بودند. این توزیع در گروه کرومولین سدیم به صورت ۲۷ بیمار (۵۴٪) مذکور و ۲۳ بیمار (۴۶٪) مونث و در گروه پودر سلولز به صورت ۳۰ بیمار (۶۰٪) مذکور و ۲۰ بیمار (۴۰٪) مونث بود. توزیع جنسیت در بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت جنسیت در بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (۰/۲۴۵ = P). نتایج نشان داد که از مجموع ۱۰۰ بیمار بررسی شده ۷۰ بیمار (۷۰٪) ساقه آلرژی را ذکر می‌کردند. این ساقه در گروه نازالیز در ۳۷ بیمار و در گروه کروکولین سدیم در ۳۳ بیمار وجود داشت.

جدول ۱- مقایسه یافته‌های معاینه در بیماران دو گروه

P-value بین گروه‌ها	پودر سلولزی		کرومولین سدیم	
	سمت راست	سمت چپ	سمت راست	سمت چپ
۰/۸۲۵	۴۶ (۵۲٪)	۴۶ (۵۲٪)	۲۸ (۵۶٪)	۳۰ (۶۰٪)
۰/۹۵۶	۴۵ (۹۰٪)	۴۶ (۹۲٪)	۴۶ (۹۲٪)	۴۷ (۹۴٪)
۰/۲۴۱	۴۴ (۸۸٪)	۴۳ (۸۶٪)	۴۷ (۹۴٪)	۴۸ (۹۶٪)

جدول ۲- مقایسه علائم رینیت آلرژیک قبل و پس از درمان در بیماران دو گروه

P Value	کرومولین سدیم		علایم	
	پودر سلولزی	کرومولین سدیم	قبل از درمان	پس از درمان
گرفتگی بینی				
۰/۴۲۹	۶/۴۱ ± ۲/۱۸	۵/۸ ± ۲/۸۳	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۰۳	۴/۶۱ ± ۱/۱	۲/۲۷ ± ۲/۹۷	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۶۳		۰/۰۰	P Value	P Value
عطسه				
۰/۸۸۵	۵/۰ ± ۱/۵	۴/۹۵ ۱±۰/۵۸	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۶۶	۲/۰۲۵ ± ۱/۰۷	۲/۴۷۵ ± ۱/۰۸	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۰۰		۰/۰۰۱	P Value	P Value
آبریزش بینی				
۰/۱۰۹	۴/۴ ± ۱/۵۸	۴/۹۷۵ ± ۱/۵۹	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۰۲	۱/۷۵ ± ۰/۰۸۱	۲/۴۵ ± ۱/۱۵	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۰۰		۰/۰۰۰	P Value	P Value
خارش بینی				
۰/۶۲۲	۳/۲۵ ± ۱/۸۵	۳/۵۵ ± ۱/۷۷	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۸۴	۲/۹۶ ± ۰/۷۹	۲/۱ ± ۱/۰۱	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۵۶		۰/۰۰۲	P Value	P Value
PND				
۰/۱۷۵	۴/۲۰ ± ۱/۷۳	۳/۳۳ ± ۱/۸۷	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۹۶	۲/۲۷ ± ۰/۰۹۵	۲/۱۷۵ ± ۰/۰۹۳	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۰۰		۰/۰۱۲	P Value	P Value
خشکی گلو				
۰/۴۵۷	۲/۹۵ ۱±۰/۳۸	۳/۲ ± ۱/۶	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۳۷۹	۱/۶۵ ± ۰/۰۶۲	۱/۵۲۵ ± ۰/۰۶۴	قبل از درمان	پس از درمان
۰/۰۰۰		۰/۰۰۰	P Value	P Value

جدول ۲- ادامه

P Value	پودر سلولز	کرومولین سدیم	علایم
سردرد			
۰/۸۷۱	۳/۱۲۵ ± ۱/۳۲	۳/۱۷۵ ± ۱/۴۱	قبل از درمان
۰/۱۷۳	۲/۸ ± ۰/۷۹	۲/۵ ± ۰/۶۸	پس از درمان
	۰/۱۱۲	۰/۰۷۶	P Value
خستگی			
۰/۲۳۳	۲/۶۵ ± ۱/۴۹	۳/۰۵ ± ۱/۴۸	قبل از درمان
۰/۷۴۱	۱/۴۵ ± ۰/۷۵	۱/۴ ± ۰/۵۹	پس از درمان
	۰/۰۰۰	۰/۰۰۳	P Value
خارش چشم			
۰/۵۵۰	۲/۵۷ ± ۱/۵۵	۲/۷۷۵ ± ۱/۴۲	قبل از درمان
۰/۷۰۸	۱/۳۵ ۰±/۶۲	۱/۳ ± ۰/۵۶	پس از درمان
	۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	P Value
اشک ریزش			
۰/۳۰۷	۲/۲۷ ± ۱/۱	۲/۷۳ ۱±/۲۸	قبل از درمان
۰/۸۲۲	۱/۸۳ ± ۰/۴۷	۱/۲۷ ± ۰/۵۲	پس از درمان
	۰/۰۶	۰/۰۰۲	P Value
تحریک پذیری			
۰/۸۱۴	۲/۷۲ ± ۱/۱۱	۲/۴۷ ± ۱/۷۲	قبل از درمان
۰/۸۴۷	۱/۷۶ ± ۰/۵۳	۱/۳۳ ± ۰/۶۱	پس از درمان
	۰/۰۰۱	۰/۰۲۳	P Value

جدول ۳- مقایسه نمره کیفیت زندگی قبل و پس از درمان در بیماران دو گروه


P Value	پودر سلولز	کرومولین سدیم	آیتم
اضطراب			
۰/۴۴۵	۲/۴۵ ± ۱/۵۸	۲/۷۵ ± ۱/۹۷	قبل از درمان
۰/۶۲۵	۱/۳۲۵ ± ۰/۰۵۲	۱/۴ ± ۰/۰۸	پس از درمان
	۰/۰۰	۰/۰۰	P Value
بی حوصلگی			
۰/۳۸۲	۳/۹۵ ± ۱/۲۷	۴/۳۲۵ ± ۱/۵۶	قبل از درمان
۰/۶۱۹	۲/۲۵ ± ۰/۴۹	۲/۴۲۵ ± ۰/۰	پس از درمان
	۰/۰۰	۰/۰۰	Trend P Value
عصباتیت			
۰/۵۷۳	۲/۶ ۱±/۲۵	۳ ± ۱/۸۱	قبل از درمان
۰/۸۶۶	۱/۹۷ ± ۰/۴۱	۱/۹۰ ± ۰/۵۱	پس از درمان
	۰/۰۸۴	۰/۰۰	P Value
ضعف بویایی			
۰/۸۶۳	۴/۳۲ ± ۱/۳۸	۴/۲۱ ± ۱/۱۸	قبل از درمان
۰/۰۷۰	۳/۴۸ ۰±/۷۳	۲/۳۸ ± ۰/۰	پس از درمان
	۰/۱۴۳	۰/۰۰۱	P Value
کیفیت زندگی			
۰/۳۵۴	۴۵/۹ ± ۱۳/۴۹	۴۸/۸۸ ± ۱۴/۹	قبل از درمان
۰/۰۷۳	۲۵/۸۵ ± ۲/۹۱	۲۲/۵۲ ± ۵/۷۱	پس از درمان
	۰/۰۰۰	۰/۰۰	P Value

نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر در رابطه با میانگین شدت اضطراب، میزان بی حوصلگی، میزان

آلرژیک و کیفیت زندگی در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۴- مقایسه یافته‌های سی تی اسکن پارانازال در بیماران مبتلا به رینیت آرژیک در بیماران دو گروه

P-value بین گروه‌ها	پودر سلولوزی		کرومولین سدیم		علائم
	سمت راست	سمت چپ	سمت راست	سمت چپ	
.۰/۹۵۶	۸ (۱۶%)	۷ (۱۳%)	۶ (۱۲%)	۱۳ (۲۶%)	هیپرتروفی کورنه تحتانی
.۰/۸۴۱	۴ (۸%)	۹ (۱۸%)	۷ (۱۴%)	۱۳ (۲۶%)	کونکا بلازا
.۰/۲۷۸	۹ (۱۹%)	۱۱ (۲۲%)	۷ (۱۴%)	۹ (۱۹%)	انحراف سپتوم
.۰/۸۲۵	۲۶ (۵۲%)	۲۶ (۵۲%)	۲۸ (۵۶%)	۳۰ (۶۰%)	بولیپ
.۰/۵۳۴	۳۰ (۶۰%)	۲۸ (۵۶%)	۳۲ (۶۷%)	۳۴ (۷۲%)	ضخیم شدگی خفیف مخاطی بدون انسداد
.۰/۷۶۷	۲۹ (۵۹%)	۳۳ (۷۳%)	۲۱ (۴۳%)	۲۶ (۵۴%)	افزایش دانسیته استخوانی جدار سینوس
.۰/۱۳۲	۲۳ (۴۵%)	۱۵ (۳۰%)	۱۳ (۲۶%)	۲۰ (۴۰%)	Sinus air fluid level



شکل ۱- شکل a و b نمونه‌ای سی تی اسکن بیماران مبتلا به رینیت آرژیک

بحث

با توجه به ماهیت مزمن بیماری رینیت آرژیک از یک طرف و خود درمانی بیماران و عدم توجه به توصیه‌های پزشکی از طرف دیگر، در مان قطعی و موثر رینیت آرژیک به چالشی پیش روی بیماران و قادر درمان تبدیل شده است. با توجه به اینکه تلاش‌های درمانی به درمان قطعی نیانجامیده و عوارض دارویی برای درمان‌های قبلی گزارش شده است بنابراین ما بر آن شدیم از پودر سلولوزی به عنوان یک دارو با منشا گیاهی بدون عوارض جانبی قابل توجه و اثربخشی مناسب جهت درمان رینیت آرژیک استفاده نماییم و یک درمان جدیدی را برای رینیت آرژیک پیشنهاد دهیم. لازم به ذکر است که این موضوع تا کنون در ایران انجام نشده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که داروی نازالیز کارایی یکسانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رینیت آرژیک در مقایسه با داروی کرومولین سدیم دارد. اما در بررسی علائم بیماران مشخص کردید که نازالیز علارغم بهبود علائم،

عصبانیت، میزان ضعف بویایی و میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد در مان در دو گروه مورد مطالعه در جدول ۳ نشان داده شده است.

در این مطالعه شاخص‌های تشخیصی از قبیل هیپرتروفی کورنه تحتانی، کونکا بلازا، انحراف سپتوم، پولیپ، ضخیم شدگی خفیف مخاطی بدون انسداد، افزایش دانسیته استخوانی جدار سینوس و Sinus air fluid level مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه بیماران هر دو گروه قبل از شروع درمان تحت سی تی اسکن قرار گرفتند و شایع ترین یافته‌ها در هر دو گروه در سی تی اسکن به ترتیب پولیپ، ضخیم شدگی خفیف مخاطی بدون انسداد، افزایش دانسیته استخوانی جدار سینوس، انحراف سپتوم، هیپرتروفی کورنه تحتانی و کونکا بلازا بدست آمدند. شکل ۱ (شکل a و b) نمونه‌ای سی تی اسکن بیماران مبتلا به رینیت آرژیک را نشان می‌دهد و با توجه به نتایج بدست امده اختلاف آماری معناداری بین یافته‌های سی تی اسکن در هر دو گروه یافت نشد (جدول ۴).

شدند. براساس نتایج این مطالعه نازالیز توانست تب یونجه را به خوبی کنترل کند، همچنین به طور معناداری توانست باعث بهبودی سریع علائم بیماران شود (۱۴). نتایج حاصل از این بررسی با مطالعه حاضر به طور نسبی همخوانی دارد. اما در مطالعه ما نازالیز بر روی خارش، سردرد، بویایی و گرفتگی بینی علارغم بهبود علائم نتوانست تغییر معنی داری ایجاد کند. در دیگری که د سال ۲۰۱۷ در کشور چین به منظور ارزیابی اثر کمکی و ایمنی اسپری به دو گروه مساوی تقسیم شدند که در یک گروه بیماران از اسپری نازالیز استفاده کرده و در گروه کنترل از اسپری داخل بینی مومتاژون به مدت دو هفته استفاده کرده بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که اسپری نازالیز همانند مومتاژون به طور معنی داری باعث بهبود علالم بیماران گردید و کارایی ۸۶/۶۶ درصدی داشت. اما در مقایسه با مومتاژون موثر تر نبود (۱۵) که نتایج حاصل از مطالعه حاضر و این مطالعه با هم همخوانی دارند.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که داروی نازالیز با توجه به بهبود علائم و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به رنیت آرژیک می‌تواند به عنوان دارویی موثر و بدون عارضه در درمان این بیماران مورد استفاده قرار گیرد. اما از لحاظ تاثیر گذاری موثرتر از داروی کرومولین نمی‌باشد؛ از طرفی دیگر هیچ ارتباطی بین یافته‌های سی تی اسکن در بین بیماران مبتلا به رینیت آرژیک وجود ندارد و می‌توان گفت استفاده از رادیولوژی و بالاخص سی تی اسکن به طور معمول برای رینیت آرژیک توصیه نمی‌شود.

References

- Alqarni MS, Bukhari ZM, Abukhodair AW, Binammar DY, Alzahrani A, Alkahtani A, et al. Diagnostic Value of Single-Photon Emission Tomography Stress Test in Patients With Suspected Coronary Artery Disease in Saudi Arabia. Cureus. 2021;13(10):e19071.
- Dewey M, Siebes M, Kachelrieß M, Kofoed KF, Maurovich-Horvat P, Nikolaou K, et al. Clinical

نتوانست به طور معنی‌داری خارش بینی، خارش چشم، عصبانیت بیماران به دلیل علائم، بویایی، گرفتگی بینی و سردرد را بهبود دهد. اما در سایر علائم رنیت آرژیک مانند داروی کرومولین بهبودی چشم گیری در بیماران حاصل کرد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد کرومولین بر سردرد بیماران بهبودی نسبی ایجاد می‌کند که این بهبودی از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین هیچ کدام از بیماران حاضر در این مطالعه عوارض جانبی بعد از مصرف دارو ها نداشتند. در این مطالعه بیماران هر دو گروه قبل از شروع درمان تحت سی تی اسکن قرار گرفتند و با توجه به نتایج بدست امده اختلاف اماری معناداری بین یافته‌های سی تی اسکن در هر دو گروه درمانی یافت نشد به طوری که با سایر مطالعات مشابه همخوانی دارد. استفاده از رادیولوژی و بالاخص سی تی اسکن به طور معمول برای رینیت آرژیک توصیه نمی‌شود. با این حال، هنگامی که مشکوک به رینوسینوزیت یا پولیپ بینی هستیم، به خصوص که به درمان دارویی پاسخ نمی‌دهد، سی تی اسکن مفید است (۱۲). در مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال ۲۰۰۹ در کشور آلمان انجام شد ۵۳ فرد به منظور بررسی اثر پودر داخل بینی سلولز در کاهش علائم رنیت آرژیک مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه تمام بیماران تحت درمان روزانه با داروی آنتی هیستامین خوراکی بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف پودر سلولز باعث بهبود معنادار تمامی علائم رنیت آرژیک و مخصوصاً آبریزش بینی در این افراد شد. و هیچ گونه عارضه جانبی بالینی در این افراد گزارش نشد (۱۳). در مطالعه حاضر نیز پودر نازالیز توانست به طور معنی‌داری باعث بهبود آبریزش بینی بیماران شود اما بر روی خارش، سردرد، بویایی و گرفتگی بینی علارغم بهبود علائم نتوانست تغییر معنی‌داری ایجاد کند. در مطالعه ما همچون مطالعه دیگر محققان هیچ گونه عارضه جانبی دیده نشد. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور انگلیس انجام شد تأثیر پودر سلولز در درمان رینیت آرژیک فصلی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۱۰۲ داوطلب با متوسط سن ۴۴ سال با سابقه رنیت آرژیک وارد مطالعه

- quantitative cardiac imaging for the assessment of myocardial ischaemia. *Nat Rev Cardiol.* 2020;17(7):427-450.
3. Sciacaluga C, Ghionzoli N, Mandoli GE, Sisti N, D'Ascanzi F, Focardi M, et al. The role of non-invasive imaging modalities in cardiac allograft vasculopathy: an updated focus on current evidences. *Heart Fail Rev.* 2022;27(4):1235-1246.
 4. Kitagawa K, George RT, Arbab-Zadeh A, Lima JA, Lardo AC. Characterization and correction of beam-hardening artifacts during dynamic volume CT assessment of myocardial perfusion. *Radiology.* 2010;256(1):111-8.
 5. Ichihara T, Ogawa K, Motomura N, Kubo A, Hashimoto S. Compton scatter compensation using the triple-energy window method for single- and dual-isotope SPECT. *J Nucl Med.* 1993;34(12):2216-21.
 6. Celler A, Dixon KL, Chang Z, Blinder S, Powe J, Harrop R. Problems created in attenuation-corrected SPECT images by artifacts in attenuation maps: a simulation study. *J Nucl Med.* 2005;46(2):335-43.
 7. Zhang D, Ghaly M, Mok GSP. Interpolated CT for attenuation correction on respiratory gating cardiac SPECT/CT - A simulation study. *Med Phys.* 2019;46(6):2621-2628.
 8. P Dobala S, Ananthasubramaniam K, Armstrong IS, Chareonthaitawee P, DePuey EG, Einstein AJ, et al. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Myocardial Perfusion Imaging Guidelines: Instrumentation, Acquisition, Processing, and Interpretation. *J Nucl Cardiol.* 2018;25(5):1784-1846.
 9. Gong P, Almasian M, van Soest G, de Bruin D, van Leeuwen T, Sampson D, et al. Parametric imaging of attenuation by optical coherence tomography: review of models, methods, and clinical translation. *J Biomed Opt.* 2020;25(4):1-34.
 10. Hutton BF, Buvat I, Beekman FJ. Review and current status of SPECT scatter correction. *Phys Med Biol.* 2011;56(14):R85-112.
 11. Pretorius PH, van Rensburg AJ, van Aswegen A, Lötter MG, Serfontein DE, Herbst CP. The channel ratio method of scatter correction for radionuclide image quantitation. *J Nucl Med.* 1993;34(2):330-5.
 12. Axelsson B, Msaki P, Israelsson A. Subtraction of Compton-scattered photons in single-photon emission computerized tomography. *J Nucl Med.* 1984;25(4):490-4.
 13. Cade SC, Arridge S, Evans MJ, Hutton BF. Use of measured scatter data for the attenuation correction of single photon emission tomography without transmission scanning. *Med Phys.* 2013;40(8):082506.
 14. Pan TS, King MA, Luo DS, Dahlberg ST, Villegas BJ. Estimation of attenuation maps from scatter and photopeak window single photon-emission computed tomographic images of technetium 99m-labeled sestamibi. *J Nucl Cardiol.* 1997;4(1 Pt 1):42-51.
 15. Bokulić T, Vastenhoud B, de Jong HW, van Dongen AJ, van Rijk PP, Beekman FJ. Monte Carlo-based down-scatter correction of SPECT attenuation maps. *Eur J Nucl Med Mol Imaging.* 2004;31(8):1173-81.