



استخراج و شناسایی عصاره میخک در اولتراسوند توسط GC/MS و اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آن به روش تخریب رادیکال‌های آزاد DPPH و مطالعه کاربردهای دارویی آن

هادی جباری: استادیار، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (* نویسنده مسئول)

سکینه مرادخانی: استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

کلیدواژه‌ها

گیاهان دارویی،
میخک،
فرایند اولتراسوند،
.DPPH

خاصیت آنتی اکسیدانی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

زمینه و هدف: گیاهان دارویی از منابع طبیعی با ارزشی هستند که امروزه مورد توجه صنایع غذایی و دارویی قرار گرفته و به عنوان مواد اولیه برای تولید داروهای بدون عارضه برای انسان به شمار می‌روند. انسان میخک دارای خواص آنتی اکسیدانی است که در پیشگیری از سرطان بسیار موثر است. نقش حلال در استخراج انسان گیاهان دارویی بسیار مهم است. فرایند اولتراسوند یکی از ارزانترین روش برای استخراج عصاره ترکیبات گیاهان دارویی می‌باشد. به عنوان یک فرآیند غیرحرارتی، فرآصوت یک روش استخراج ملایم است که از تخریب گرمایی عصاره جلوگیری می‌کند. از این رو هدف مطالعه استخراج و شناسایی عصاره میخک در اولتراسوند توسط GC/MS و اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آن به روش تخریب رادیکال‌های آزاد DPPH و مطالعه کاربردهای دارویی آن بود.

روش کار: عصاره گیاه میخک در حلال‌های اتانول، آب، متانول، مخلوط اتانول و آب به روش اولتراسونیک استخراج شد. ترکیب عصاره با استفاده از کروماتوگرافی گازی شناختی شد. مهمترین ترکیب شناختی شده در ان اوژنول بود که بیش از ۸۵ درصد عصاره را تشکیل می‌دهد. مقدار اوژنول در حلال‌های مختلف درصد متفاوتی داشته که بیشترین مقدار آن ۱۷/۸۳ درصد در حلال آب شناختی شد که خاصیت درمانی فراوانی دارد. خواص آنتی اکسیدانی گیاه میخک با روش تخریب رادیکال‌های آزاد ۲۶ دی‌فیل-۱-پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: بیشترین ماده شناختی شده عصاره میخک ترکیب اوژنول بود که در حلال آب بازده بالایی داشته است. خواص آنتی اکسیدانی گیاه میخک با روش تخریب رادیکال‌های آزاد اندازه‌گیری شد، با تهیه ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میکرولیتر از نمونه عصاره تیمار ۹۰ میکرولیتر بیشترین مصرف DPPH را داشت که بهترین تیمار این آزمایش انتخاب شد و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی در مقایسه با تیمارهای بعدی داشت.

نتیجه‌گیری: فرایند اولتراسوند و استخراج عصاره گیاهان دارویی در دمای پایین به منظور حفظ ساختار ترکیبات دارویی و نقش حلال در بازده ترکیب استخراج شده اوژنول بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت‌کننده: حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Jabbari H, Moradkhani S. Extraction and Identification of Clove Extract in Ultrasound by GC/MS and Measurement of Its Antioxidant Activity by DPPH Free Radical Destruction Method and Study of Its Medicinal Applications. Razi J Med Sci. 2024(02 Dec);31:82.

Copyright: ©2024 The Author(s); Published by Iran University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY-NC-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>).

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 4.0 صورت گرفته است.



Original Article

Extraction and Identification of Clove Extract in Ultrasound by GC/MS and Measurement of Its Antioxidant Activity by DPPH Free Radical Destruction Method and Study of Its Medicinal Applications

Hadi Jabbari: Assistant Professor, Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran. (* Corresponding author) hadijabbari@yahoo.com

Sakineh Moradkhani: Assistant Professor, Department of Biology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

Abstract

Background & Aims: Medicinal plants are valuable natural resources that are considered by the food and pharmaceutical industries today and are considered as raw materials for the production of medicines without complications for humans. Medicinal plant extract compounds for asthma, bronchitis, cough, throat infections and emphysema, as well as for the treatment of ulcers or inflammation of the mucous membrane of the mouth, throat, stomach and intestines, gall bladder, kidney stones, kidney edema, headache, constipation, toothache and insomnia. The role of solvent in extracting the essential oils of medicinal plants is very important. The ultrasound process is one of the cheapest methods for extracting medicinal plant compounds. Ultrasound breaks the cell structure and releases bioactive compounds. As a result, it leads to higher yield and faster extraction speed. Herbs, spices and other plant materials are rich in phytochemicals that are considered as valuable components for pharmaceutical and food products. As a non-thermal process, ultrasound it is a gentle extraction method that prevents thermal degradation of the extract.

Methods: Clove plant extract was extracted by ultrasonic method in ethanol, water, methanol, ethanol and water mixture. The composition of the extract was identified using gas chromatography. The most important compound identified in N was eugenol, which constitutes more than 85% of the extract. The amount of eugenol in different solvents had different percentages, and the highest amount of 83.17% was detected in water solvent, which has many therapeutic properties. The antioxidant properties of clove plant with the destruction method of free radicals 2 and 2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) was measured.

Results: The ultrasound process is one of the cheapest methods for extracting medicinal plant compounds. Ultrasound breaks the cell structure and releases bioactive compounds. As a result, it leads to higher yield and faster extraction speed. Herbs, spices and other plant materials are rich in phytochemicals that are considered as valuable components for pharmaceutical and food products. As a non-thermal process, ultrasound it is a gentle extraction method that prevents the thermal degradation of the extract. The most identified substance in clove extract was eugenol, which had a high yield in water solvent. The antioxidant properties of the clove plant were measured by the free radical scavenging method (DPPH), by preparing 10, 15, 20, 25, 50, 80 and 90 microliters of the extract sample, the 90 microliter treatment had the highest consumption of DPPH, which was the best treatment of this test and had high antioxidant properties compared to the following treatments.

Conclusion: Clove oil and eugenol obtained from it have analgesic, anesthetic and antiseptic effects. It is usually used in dentistry. It shows an anti-inflammatory effect against mouse macrophages. Eugenol showed strong antibacterial effectiveness against different strains of Gram-positive and Gram-negative bacteria and has more antimicrobial activity when combined with gentamicin, β -lactam and vancomycin antibiotics. The antifungal efficacy of eugenol and clove oil has been investigated against yeasts and filamentous fungi, including various human pathogenic fungi and food-borne fungal species. Eugenol has antiviral activity against HSV-1 and herpes simplex-2 (HSV-2) by inhibiting viral replication and reducing viral infection. Eugenol isolated from clove extracts and their essential oils shows that it has antioxidant and antimicrobial effects. The anti-inflammatory effects of eugenol are attributed to its effect to prevent neutrophil/macrophage chemotherapy and prostaglandin synthesis as

Keywords

Medicinal Plants,
Cloves,
Ultrasound Process,
DPPH,
Antioxidant Property

Received: 22/06/2024

Published: 02/12/2024

well as cyclooxygenase II enzyme. In addition, eugenol dimers reduce the side effects of chemotherapy by inhibiting the expression of cytokines in macrophages. It cures arthritis and therefore can be used in the treatment of arthritis. The direct effect of eugenol in inhibiting the activation of NF- κ B caused by tumor necrosis factor (TNF α) and preventing the activity of cyclooxygenase (COX-2) in LPS stimulating macrophages was investigated with an IC₅₀ value equal to 2.7 μ m in healthy cells. Furthermore, eugenol protects protected macrophages from chemical-induced cell dysfunction and stabilizes PRO/anti-inflammatory mediators. Eugenol has been investigated for its anticancer activity against skin tumors, melanoma, gastric cancer, leukemia, and prostate cancer by regulating oncogenes and the caspase-dependent pathway. The process of ultrasound and extraction of medicinal plant extracts at low temperature is very important in order to preserve the structure of medicinal compounds and the role of solvent in the efficiency of the extracted eugenol compound.

Conflicts of interest: None

Funding: None

Cite this article as:

Jabbari H, Moradkhani S. Extraction and Identification of Clove Extract in Ultrasound by GC/MS and Measurement of Its Antioxidant Activity by DPPH Free Radical Destruction Method and Study of Its Medicinal Applications. Razi J Med Sci. 2024(02 Dec);31:82.

Copyright: ©2024 The Author(s); Published by Iran University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY-NC-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>).

*This work is published under CC BY-NC-SA 4.0 licence.

کاربردهای مختلف صنعتی به طور گستردگی در عطرها، صابون‌ها استفاده می‌شود (۱۰). میخک‌ها در طب سنتی هندی و چینی به عنوان یک ماده گرم‌کننده و تحریک‌کننده استفاده می‌شوند (۱۱).

به طور سنتی، میخک قرن‌ها در درمان استفراغ استفاده شده است. نفح، حالت تهوع؛ اختلالات کبد، روده و معده؛ و محرك اعصاب، برای تسکین میکروگانیسم‌های مختلف به عنوان زخم، وبا، مالاریا و سل استفاده شده‌اند. همچنین، در آمریکا، میخک به طور سنتی در مهار پاتوژن‌های ناشی از مواد غذایی برای درمان ویروس‌ها، کرم‌ها، کاندیدا و عفونت‌های مختلف باکتریایی و تک یاخته استفاده شده است (۱۲). علاوه بر این، اوژنول به طور گستردگی در دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا می‌تواند به بافت پالپ دندان نفوذ کرده و وارد جریان خون شود. ترپن‌های جدا شده از میخک دارای فعالیت ضد سرطانی هستند. روغن میخک به دلیل محبوبیت، در دسترس بودن و محتوای اسانس بالا به طور گستردگی مورد بررسی قرار گرفته است (۱۳). روغن میخک به طور گستردگی به عنوان عطر و طعم‌دهنده غذا، به عنوان دارویی برای درمان آسم و اختلالات مختلف آلرژیک و به عنوان یک ضد عفونی کننده عمومی در دندانپزشکی استفاده می‌شود. فعالیت ضد میکروبی، روغن میخک را در برابر طیف وسیعی از پاتوژن‌های قارچی از جمله موارد عفونت ادراری-تناسی ارزیابی کرد (۱۴). روغن میخک دارای فعالیت ضد قارچی قوی علیه پاتوژن‌های قارچی فرست طلب مانند آلبیکنس، کربپتوکوکوس نئوفور مانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس است. ماده اصلی مسئول فعالیت ضد قارچی آن اوژنول از میخک است. اوژنول اصل‌ترین ترکیب فرار روغن استخراج شده از جوانه میخک است که در طب سنتی به عنوان باکتری‌کش، قارچ‌کش و بی‌حس‌کننده و غیره استفاده می‌شود (۱۵). در این کار تحقیقاتی عصاره گیاه دارویی میخک در دستگاه اولتراسوند در حلال‌های مختلف استخراج شده و میزان ترکیبات فعال آن در GC/MS شناسایی شده است. که یکی از مهمترین ترکیب فعال آن اوژنول می‌باشد که در حلال‌های مختلف درصد متغیر است دارد و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی و ارتباط آن با میزان اوژنول مورد نظر مطالعه می‌شود.

مقدمه

سیستم طب سنتی مبتنی بر استفاده از داروهای گیاهی همچنان نقش مهمی در سیستم مراقبت‌های بهداشتی ایفا می‌کند. در دهه‌های اخیر، گیاهان دارویی به عنوان محصولات طبیعی دارای عوارض جانبی کمتر و کارایی بهتری نسبت به همتایان مصنوعی خود داشته و مقبولیت گستردگی‌تری پیدا کرده‌اند (۱). در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از ساکنان جهان به داروهای سنتی برای درمان بیماریها استفاده می‌کنند. از نظر فارماکولوژیکی، گیاهان دارویی دارای فعالیت‌های انتی باکتریال، ویروس‌کش، قارچ‌کش هستند (۲). دارای فعالیت‌های ضد التهابی، ضد میکروبی، اسپا سمولیتیک، آرام بخش، ضد درد و بی‌حس کننده موضعی هستند (۳). بسیاری از گونه‌های گیاهی فعالیت‌های دارویی مربوط به ترکیبات گیاهی آنها مانند گلیکوزیدها، ساپونین‌ها، فلاونوئیدها، استروئیدها، تانن‌ها، آلkalوئیدها، ترپن‌ها می‌باشد. تا به امروز، داروهای گیاهی به عنوان منبعی حیاتی برای کشف مولکول‌های دارویی جدید که برای درمان بیماری‌ها استفاده شده‌اند (۴). این فیتوکمیکال‌های شناسایی شده به عنوان یک ترکیب پیشرو قابل توجه در جستجوی داروهای موثر و جدید در نظر گرفته شده‌اند که از نظر تجاری برای بسیاری از اهداف دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرند (۵). میخک یکی از گیاهان دارویی که به طور بالقوه می‌تواند به عنوان مواد نگهدارنده در بسیاری از غذاها، به ویژه در فرآوری گوشت به دلیل خاصیت آنتی‌اکسیدان و ضد میکروبی مورد استفاده قرار گیرد (۶). گزارش‌های متعددی فعالیت‌های ضد باکتریایی، ضد دیروسوی و ضد قارچ برخی از گیاهان معطر از جمله دارچین، پونه کوهی، میخک، آویشن و نعنادرگارش شده است (۷). با این حال، میخک به دلیل فعالیت‌های ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی، در بین سایر ادویه‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است (۸). نقش مؤثر میخک در مهار بیماری‌های دز نرأتیو مختلف به حضور ترکیبات شیمیایی مختلف در غلظت‌های بالا با فعالیت آنتی‌اکسیدانی نسبت داده می‌شود. روغن میخک به طور سنتی در درمان سوختگی و زخم‌ها و به عنوان یک تسکین‌دهنده درد در مراقبت از دندان و همچنین درمان عفونت‌های دندان و درد دندان استفاده می‌شود (۹). علاوه بر این، استفاده از آن در

دما سنج استفاده شد. عصاره با سرعت ۳۲۰۰ دور در دقیقه به مدت ۴۵ دقیقه سانتریفیوژ شد و سپس سطح شفاف مخلوط جدا شد. حلال در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده شد تا از آسیب به ترکیبات فنلی جلوگیری شود. عصاره غلیظ روی یک صفحه ثبت و در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد در داخل آن قرار داده شد و مدار استخراج کاملاً خشک شد. سپس درب صفحه را قرار داده و دور آن را با پارانیم بسته و برای جلوگیری از نفوذ نور، روی آن را کاملاً با فویل آلومینیومی پوشانده و ترکیبات فنلی را در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد شد.

کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS): کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی یا روش GC/MS یکی از تکنیک‌های موثر و پرکاربرد در زمینه آنالیز مواد است. تکنیک GC-MS از ادغام یک تکنیک جداسازی با دستگاه GC و یک تکنیک تشخیصی قدرتمند MS برای تجزیه و تحلیل نمونه بهتر استفاده می‌کند. در حالی که دستگاه GC بیشتر برای جداسازی ترکیبات فرار استفاده می‌شود، طیف سنج جرمی به شناسایی هر جزء جدا شده بر اساس خاصیت جرمی آن با دقت بالا کمک می‌کند. دستگاه GC-MS علاوه بر آنالیز طیف وسیع تری از مواد، امکان تشخیص دقیق‌تر و ارائه نتایج سریع‌تر را فراهم می‌کند. از مهمترین مزایای این روش می‌توان به حساسیت بالا، ویژگی و تکرارپذیری، راندمان جداسازی بالا و دقت بسیار بالا اشاره کرد. برای اندازه‌گیری ترکیبات عصاره گیاهان دارویی استفاده می‌شود.

فعالیت آنتی اکسیدانی: در این روش رادیکال چربی دوست با آنتی اکسیدان‌های DPPH واکنش داده و رنگ محلول به زرد روشن تبدیل شد و جذب در طول موج ۵۱۷ نانومتر اندازه‌گیری شد. نتایج به صورت IC50 (مقدار آنتی اکسیدانی که برای رسیدن غلظت DPPH به ۵۰ درصد مقدار اولیه ضروری است) بیان شد.

یافته‌ها

استخراج عصاره میخک با حلاب آب: در روش عصاره‌گیری گیاه میخک با مخلوط اتانول و هگزان، ۴۰٪ جزء شیمیایی با درصد بازدهی متفاوت شناسایی شد.

روش کار

در این تحقیق، میخک که از شـمال غرب ایران خریداری شده بود، به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفت که در کمیسیون کد اخلاق دانشگاه پیام نور با کد IR.PNU.REC.1403.510 پاکسازی، گیاه به دور از نور خور شید خشک و سپس کاملاً در آسیاب (Molinex-684-French) آسیاب شد و از الک با توری مناسب عبور داده شد و تا زمان انجام آزمایش در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد. مشخصات و تجزیه و تحلیل دستگاه GC-MS انسانس ها با استفاده از GC-MS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل GC-MS از یک کروماتوگرافی گازی A 7890 Agilent با یک طیف HP ۵۹۷۵ A با استفاده از ستون مویرگی- سنج جرمی A ۵۹۷۵ با استفاده از ستون مویرگی- MS ۵% ۵فنیل متیل پلی سیلوکسان، ۳۰ متر طول، ۰/۲۵ میلی متر در روز، ضخامت فیلم ۰/۲۵ میکرومتر) استفاده شد. دمای فر به صورت زیر برنامه‌ریزی شد: ۳ دقیقه در ۸۰ درجه سانتیگراد، متعاقباً ۸ درجه سانتیگراد در دقیقه ۱ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد، به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد نگه داشته شد. هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان ۱ میلی لیتر در دقیقه و ۷۰ eV Electronimpact (EI) استفاده شد. انژکتور در حالت تقسیم (نسبت تقسیم ۱:۵۰۰) تنظیم شد و برد جرمی ۴۰ تا ۵۰۰ بود. ترکیبات انسانس با استفاده از شاخص‌های حفظ خطی محاسبه شده و طیف جرمی با مواردی که در NIST 05 و Wily 07 گزارش شده‌اند، شناسایی شدند.

روش‌های استخراج عصاره: روش اولتراسوند در این روش ۲۰ گرم میخک با ترازو با دقت ۰/۰۰۱ گرم و توسط آسیاب تیغه‌ای برقی (مولینکس ۳۰۰.۳۲ MC 300.32) توزین شد. به مدت یک دقیقه آسیاب شد و از الک ۱۶ رد شد و با ۱۰۰ میلی لیتر حلال مخلوط و با ایجاد امواج اولتراسونیک در این تحقیق (MPI, Switzerlaud) با توان تولید ۱۰۰۰ وات و فرکانس ± ۲۰ کیلوهرتز و از یک پروب استوانه‌ای تیتانیم با قطر ۲۰ میلی متر استفاده شد. دما در طول زاویه استخراج با استفاده از حمام آب ثابت نگه داشته شد و برای کنترل دما از

هیدرازیل (DPPH) ارزیابی شد DPPH یک ترکیب بنفسنگ است که به دلیل وجود گروههای فنیل در ساختار خود به راحتی تو سط رادیکال‌ها جذب می‌شود و در واقع منبع رادیکال‌های آزاد است. این ترکیب با گرفتن الکترون از ترکیب آنتی‌اکسیدانی از بنفسنگ به زرد تغییر می‌کند. رادیکال‌های آزاد در طول موج

در صد و نوع ترکیبات شناسایی شده توسط GC-MS آنالیز شد. ترکیبات شیمیایی مشاهده شده در هر یک از گیاهان دارویی متفاوت بود. در زیر ۴۰ ترکیب شیمیایی مشاهده شده در حضور این گیاه دارویی با درصدهای کارایی متفاوت آورده شده است که مهمترین ترکیبات با درصد بالا در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- ترکیبات اسانس میخک GC/MS


نام ترکیب	نام ابیوک	فرمول شیمیایی	نام ترکیب	نام ابیوک	فرمول شیمیایی
<i>Eugenol</i>	2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol	$C_{10}H_{12}O_2$	<i>Gallic acid</i>	3,4,5-Trihydroxybenzoic acid	$C_7H_6O_5$
β - <i>Caryophylle</i>	(1 <i>R</i> ,4 <i>E</i> ,9 <i>S</i>)-4,11,11-Trimethyl-8methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	$C_{15}H_{24}$	<i>Biflorin</i>	5,7-dihydroxy-2-methyl-6-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one	$C_{16}H_{18}O_9$
<i>Vanillin</i>	4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde	$C_8H_8O_3$	<i>Myricetin</i>	3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4-chromenone	$C_{15}H_{10}O_8$
<i>Cateolic acid</i> (<i>Maslinic acid</i>)	(4 <i>a</i> S,6 <i>a</i> R,6 <i>a</i> S,6 <i>b</i> R,8 <i>a</i> R,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>a</i> ,14 <i>b</i> S)-10,11-dihydroxy-2,2,6 <i>a</i> ,6 <i>b</i> ,9,9,12 <i>a</i> -heptamethyl-1,3,4,5,6,6 <i>a</i> ,7,8,8 <i>a</i> ,10,11,12,13,14 <i>b</i> -tetradecahydropicene-4 <i>a</i> -carboxylic acid	$C_{30}H_{48}O_4$	<i>Campesterol</i>	(3 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,17 <i>R</i>)-17-[(<i>E</i> ,2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>a</i>]phenanthren-3-ol	$C_{28}H_{48}O$
<i>Kaempferol</i>	3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4 <i>H</i> -chromen-4-one	$C_{15}H_{10}O_6$	<i>Stigmasterol</i>	{(3 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,17 <i>R</i>)-17-[(<i>E</i> ,2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>a</i>]phenanthren-3-ol}	$C_{29}H_{48}O$
<i>Rhamnetin</i>	2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxychromen-4-one	$C_{16}H_{12}O_7$	<i>Oleanolic acid</i>	(4 <i>a</i> S,6 <i>a</i> R,6 <i>a</i> S,6 <i>b</i> R,8 <i>a</i> R,10 <i>S</i> ,12 <i>a</i> R,14 <i>b</i> S)-10-hydroxy-2,2,6 <i>a</i> ,6 <i>b</i> ,9,9,12 <i>a</i> -heptamethyl-1,3,4,5,6,6 <i>a</i> ,7,8,8 <i>a</i> ,10,11,12,13,14 <i>b</i> -tetradecahydropicene-4 <i>a</i> -carboxylic acid	$C_{30}H_{48}O_3$
<i>Eugenitin</i>	5-Hydroxy-7-methoxy-2,6-dimethylchromen-4-one	$C_{12}H_{12}O_4$	<i>Bicorn</i>		

۵۱۷ نانومتر جذب می‌شوند، طبق قانون بیر لامبرت، کاهش جذب آن با مقدار آنتی‌اکسیدان رابطه خطی دارد. هر چه مقدار آنتی‌اکسیدان بیشتر باشد، هیدروکسی تولوئن (BHT) برای مقایسه اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس میخک استفاده شد. نمونه‌ها با غلظت‌های مختلف ۱ میلی لیتر محلول ۹۰ میکرومولار مخلوط و با متانول ۹۵ درصد به حجم ۵ میلی لیتر رسید. جذب ماده خالی و محلول تهیه شده در ۵۱۷ نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر خوانده شد. درصد RSC از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$RSC(\%) = 100 \times (A_{blank} - A_{sample}) / A_{blank}$$



بیشترین ترکیب شناسایی شده عصاره میخک مربوط به اوژنول می‌باشد. در حللاهای مختلف درصد اوژنول متفاوت بوده و درصد شناسایی ان در حللاهای مختلف معنی‌دار بوده در حالیکه در صد نسبی سایر ترکیبات با اندکی تغییرات نه چندان معنی‌دار در حللاهای مختلف شناسایی شد. که میزان درصد اوژنول شناسایی شده در حللا اب مقدار ۸۳/۱۷٪ عصاره مربوط به اوژنول می‌باشد.

بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس‌ها با استفاده از روش RSC در این مقاله عصاره گیاه دارویی میخک در حللاهای مختلف توسط اولتراسوند استخراج شد. اثر آنتی‌اکسیدان‌ها با استفاده از روش کاهش ظرفیت رادیکال RSC با کمک ۲/۲-دی‌فنیل-۱-پیکریل



شکل ۱- میزان فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس میخک استخراج شده توسط حلال آب در آزمایش تخریب رادیکال DPPH

قرار گرفته است. از آن برای توسعه و معرفی مواد آنتی اکسیدانی جدید استفاده می‌شود. اساس این روش بر اساس کاهش رادیکال آزاد DPPH توسط آنتی اکسیدان‌ها در غیاب سایر رادیکال‌های آزاد در محیط است. DPPH یک رادیکال آزاد پایدار است که یک الکترون جفت نشده روی یکی از اتم‌های پل نیتروژن دارد. مهار رادیکال DPPH اساس ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی است (شکل ۲ و شکل ۳).



DPPH یک رادیکال پایدار است که محلول متانولی آن دارای رنگ ارغوانی است که بیشترین جذب را در

Asample و Ablank به ترتیب میزان جذب نمونه و بلانک فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس به عنوان یک IC50 نشان‌دهنده ترکیبی است که باعث مهار ۵۰ درصدی ظرفیت رادیکال می‌شود. این مقدار با تجزیه و تحلیل همپستگی خطی از RSC برای غلاظت‌های مختلف نمونه تعیین شد. در ادامه انواع غلاظت‌های اسانس مالوا سیلوستریس، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۴۰، ۵۰، ۸۰ و ۹۰ میکرو لیتر که ۵۰ درصد رادیکال‌های آزاد (IC50) را از بین می‌برند در جدول ۱ نشان داده شده است. همانطور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود تیمار ۹۰ میکرولیتری بهترین نتیجه را داشت و به عنوان بهترین تیمار این تحقیق انتخاب شد.


بررسی مکانیسم: ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی با روش رادیکال DPPH یک آزمایش شناخته شده برای اندازه‌گیری قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات مختلف است. اساس این روش بر اساس کاهش رادیکال آزاد DPPH توسط آنتی اکسیدان‌ها در غیاب سایر رادیکال‌های آزاد در محیط است. نتیجه به دست آمده برای یک ترکیب به طور کلی با یک ترکیب آنتی اکسیدانی شناخته شده مانند فنل‌ها مقایسه می‌شود. آنلیز ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH آزمایشی است که در زمینه‌های غذا، دارو و بیوتکنولوژی بسیار مورد توجه

در ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌های گیاهان دارویی و در فرآیندهای بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای اندازه‌گیری ظرفیت کلی آنتی اکسیدان‌ها و فعالیت حذف رادیکال‌های آزاد عصاره‌های گیاهان دارویی استفاده شده است. این روش برای اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدانی دانه‌های سبوس گندم، اسیدهای لینولئیک کونژوگه، گیاهان دارویی، روغن دانه خوراکی در سیستم استفاده می‌شود. حلال‌های مختلفی مانند آب، اتانول، استون آبی، متانول، الكل آبی و بنزن استفاده شده است. واکنش نمونه با DPPH در حلال متانول آبی در عصاره گیاهان دارویی کارایی بسیار بالایی برای استخراج آنتی اکسیدان‌ها دارد. فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی به حلال بستگی دارد زیرا آنتی اکسیدان‌های مختلف با درصددهای متفاوت در حلال‌های مختلف استخراج می‌شوند. همچنین از این تکنیک برای اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدان‌های چربی دوست و چربی دوست استفاده می‌شود.

بحث

فعالیت‌های ضدوبروسوی، ضدمیکروبی، ضدقارچ، ضد سلطان، آنتی اکسیدان و ضدالتهابی بر سلطان و کنترل چرخه سلولی تأثیر دارد. نتایج حاضر همسو با نتایج مطالعات آیینی (Ayeni) (۲۰۲۲) (۱۲) و هوآنگ (Huang) و همکاران (۲۰۱۷) (۷) می‌باشد. مشکلات مقاومت در برابر پاتوژن و همچنین باقیماندهای سوموم در بیشتر داروهای ضد میکروبی رویکردهای درمانی و محافظ مؤثر آنها را به شدت تضعیف می‌کند. بنابراین توسعه گزینه‌های درمان ضدمیکروبی جدید و مؤثر برای بهبود درمان و کنترل بیماری بسیار مهم است. میخک به دلیل اثربخشی گستردگدارویی، یک داروی گیاهی شناخته شده و قابل توجه است (۵). مطالعات اخیر افزایش داخل بدن در پراکسیداسیون لیپیدها و قند خون در موهای صحرایی دیابتی را مورد بررسی قرار داده و میزان آنزیم آنتی اکسیدانی را پس از مکمل تغذیه با میخک دوباره برقرار کرده است میخک در داخل بدن باعث کاهش صدمات کبدی و عضلات قلبی

طول موج ۵۹۵-۵۱۹ نانومتر نشان می‌دهد. اساس این روش این است که رادیکال DPPH مانند یک آنتی اکسیدان به عنوان یک گیرنده الکترون از یک مولکول دهنده عمل می‌کند که در نتیجه DPPH به تبدیل می‌شود در این حالت، رنگ بنفس محيط به زرد تغییر می‌کند، بنابراین شدت جذب در طول موج ۵۹۵ نانومتر کاهش می‌یابد. از اندازه‌گیری کاهش شدت جذب توسط طیف سنجی، می‌توان به خواص آنتی اکسیدانی پی‌برد. این روش با هدف اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از رادیکال آزاد پایدار DPPH توسعه یافته است که اساس این روش برای اندازه‌گیری ظرفیت مهار آنتی اکسیدانی نسبت به آن است. تک الکترون اتم نیتروژن در ساختار DPPH با گرفتن هیدروژن از آنتی اکسیدان به هیدرازین کاهش می‌یابد و به دلیل جابجایی الکترون اضافی روی مولکول DPPH به رادیکال آزاد پایدار تبدیل می‌شود. تغییر در محل جابجایی الکترون باعث رنگ ارغوانی می‌شود. که در اسپکتروفوتومتر در محلول اتانول در طول موج ۵۲۰ نانومتر جذب می‌شود (شکل ۴).



شکل ۴ - واکنش عمومی کاهش DPPH

در شکل کاهش یافته ZH رادیکال ایجاد شده است. در مرحله بعد، رادیکال ایجاد شده تحت واکنش‌های بیشتری قرار می‌گیرد که استوکیومتری واکنش را کنترل می‌کند، بنابراین واکنش شکل ۵ برای ایجاد پیوند در یک سیستم اتواکسیداسیون لیپیدی در سیستم‌های اکسیدکننده رخ می‌دهد. در حالی که DPPH با گرفتن یک الکترون یا یک رادیکال هیدروژن به یک مولکول دیا مغناطیسی پایدار تبدیل می‌شود که به سختی اکسید می‌شود. DPPH یک نوار جذب قوی را در طول موج ۵۱۷ نانومتر نشان می‌دهد که دلیل آن وجود الکترون فرد بر روی اتم نیتروژن است و محلول به رنگ بنفس تیره تبدیل می‌شود. با گرفتن یک جفت الکترون و الکترون، جذب کاهش می‌یابد و از قانون بیر-لامبرت پیروی می‌کند. این روش بسیار سریع، ارزان و ساده برای اندازه‌گیری حذف فعالیت رادیکال‌های آزاد

اکسید و توانایی کلاتلاسیون باشد. عوامل آنتی اکسیدانی مانند عصاره میخک نقش مهمی در درمان استرس اکسیداتیو دارند. کاهش استرس اکسیداتیو ارزیابی شده تو سط گلوتاتیون و همچنین سطح مالنديالدئید در مغز موش‌ها شد. توانایی روغن میخک برای بازگرداندن حافظه و کمبودهای یادگیری ناشی از درمان اسکوپولامین کوتاه مدت و طولانی مدت به اثربخشی آن در کاهش استرس اکسیداتیو است (۹). علاوه بر این، اثر ضد درد میخک و تسکین‌دهنده درد دندان، درد مفاصل با فعال کردن کانال‌های کلرید و کلسیم در سلولهای گانگلیونی تایید شده است. با این حال، یک مطالعه دیگر نشان داد که فعالیت ضد درد میخک ممکن است به فعالیت آگونیست کپساپسین آن نسبت داده شود. کارآیی ضد درد داخل بدن اوژنول را با استفاده از روش پیچش شکم تحریک شده توسط اسید استیک گزارش داد. فعالیت‌های ضد سرطانی و سمیت سلولی در برابر خطوط سلولی تومور انسانی 3 PC-HEP G2 گزارش شده است. اوژنول و دهیدرو اوژنول باعث تحریک مرگ سلول‌های سرطانی انسان می‌شوند. اثر ضد سرطان در برابر سلولهای سرطانی ریه، پستان و کولورکتال می‌باشد (۵). میخک با سرکوب عملکرد لیبیولی ساکارید (NF- κ B) و همچنین مسیر فاکتور هسته‌ای κ B (CCL4) محافظت در برابر سلولهای کبدی ناشی از درمانی، محافظت می‌شود. سایر ترکیبات فیتوشیمیایی جدا شده از عصاره‌های میخک از جمله آلkalولئید و بنزوونوتريدين برای محافظت از آسیب کبد گزارش شده است. میزان مصرف میخک در مقایسه با مقدار طبیعی در موش‌های هایپرلیپیدمی، سطح ALT، اوره، AST و لیپیدها را در کلیه‌ها بهبود می‌بخشد. اثربخشی ضد دیابتی عصاره میخک ممکن است به وجود عوامل تحریک‌کننده انسولین نسبت داده شود. آزمایشات داخل بدن نشان داد که قند خون طبیعی در موش‌های تحت درمان با عصاره میخک افزایش یافته است که حاوی بسیاری از ترکیبات بیولوژیکی فعال با فعالیتهای

در موش می‌شوند. از نظر فارماکولوژیکی، روغن میخک در طیف گسترده‌ای به عنوان ضدغذوفونی کننده در بیماری‌های دهان و برای درمان دندان‌ها، اختلالات آرژی، آسم، آکنه، زخم و آرتربیت روماتوئید استفاده می‌شود و اثرات آنتی اسپاسمیک را نسبت به درماتوگوجوگوئیدهای در مایتوفاغوئید pteronyssinus و dermatogogoides اشتها آور، ضداضطراب، ضددرد، ضدغذوفونی کننده، ضدمیکروبی، ضدصرع، میورلاکسانت، ضدالتهابی و همچنین دارای تأثیر دارویی در برابر اختلال تروفیک است (۱۳).

نکته قابل توجه، تانن‌ها، اسید گالیک، اسید گالیک، فلاونوئیدهای گلیکوزیدهای جدا شده از عصاره جوانه‌های الكلی و آبی گزارش شده است که دارای آنتی ترموبوتیک، آنتی پروز، هیپوگلیسمی، ضد التهابی، محافظت کننده و محافظت کننده محافظت شده و آفریدیزیاک هستند. در طب سنتی، میخک در نفح، سوء هاضمه و اسهال استفاده شده است. داروهای گیاهی به عنوان منبع اصلی برای کشف مولکولهای دارویی جدید برای مهار و کنترل عفونت‌های ویروسی تایید شده‌اند ترکیب جدا شده از عصاره میخک به دلیل اثربخشی ضدویروسی آن نسبت به سویه‌های مختلف ویروس تبخال و ویروس هپاتیت C با عملکرد آن بر روی سنتز DNA ویروسی با مهار آنزیم DNA ویروسی بررسی شده است (۱۱).

تحقیقات دیگر نشان داد که اثربخشی ضدویروسی عصاره‌های آبی میخک در ترکیب با اسیکلولویر در برابر ویروس تبخال سیمپلکس نوع ۱ (HSV-1) و ویروس آنفلوانزا A عمل ضدمیکروبی احتمالی برای روغن میخک به اوژنول نسبت داده می‌شود که حدود ۸۵٪ تا ۹۲٪ از کل روغن میخک تشکیل شده است کارواکرول و اوژنول مؤلفه‌های اصلی میخک مسئول ویژگی‌های قارچی آن در برابر قارچ‌های جدا شده اونیکومیکوز است (۱۵).

اثربخشی قدرتمند آنتی اکسیدانی عصاره آبی میخک ممکن است به دلیل توانایی اهدای هیدروژن قوی، جابجایی پراکسید هیدروژن، رادیکال‌های آزاد و سوپر

باعث افزایش انتشار Ca^{2+} از شبکه سارکوپلاسمی و کاهش حساسیت پروتئین‌های انقباضی به Ca^{2+} می‌شوند. اوژنول و آنالوگ‌های آن با جلوگیری از مونوآمین اکسیداز، اثر ضد افسردگی در داخل بدن را نشان دادند (۲).

روغن میخک و اوژنول حاصل از ان دارای اثرات ضددرد، بیهوشی و ضد عفونی کننده می‌باشد. معمولاً در دندانپیشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اثر ضد التهابی را در برابر ماکروفازهای موش نشان می‌دهد. اوژنول اثربخشی ضد باکتریایی قوی در برابر سوبوهای مختلف باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی نشان داد و فعالیت ضد میکروبی بیشتری را هنگام ترکیب با آنتی بیوتیک‌های جنتامایسین، β -لاکتم و وانکومایسین دارد. اثربخشی ضد قارچ روغن اوژنول و میخک به سمت مخمرها و قارچ‌های رشته‌ای، از جمله قارچ‌های مختلف بیماری‌زا انسان و گونه‌های قارچی ناشی از مواد غذایی بررسی شده است. اوژنول با جلوگیری از تکثیر ویروسی و کاهش عفونت ویروسی، فعالیت ضد ویروسی را در برابر HSV-1 و تبخال-2 Simplex (HSV-2) دارد. اوژنول جدا شده از عصاره‌های میخک و روغن‌های اساسی آنها نشان می‌دهد که دارای اثرات آنتی اکسیدان و ضد میکروبی دارد (۵). اثرات ضدالتهابی اوژنول به اثر آن برای جلوگیری از شیمی درمانی نوتروفیل/ماکروفاز و سنتز پروستاگلاندین و همچنین آنزیم سیکلوكسیزناز II-نسبت داده می‌شود. علاوه بر این، دیمرهای اوژنول با مهار بیان سیتوکین‌ها در ماکروفازها عوارض شیمی درمانی را کاهش می‌دهد. اوژنول دارای اثرات بهبودی بر آرتریت می‌باشد و بنابراین می‌تواند در درمان آرتروز استفاده شود. اثر مستقیم اوژنول در مهار فعل سازی $\text{NF}-\kappa\text{B}$ از فاکتور نکروز تومور ($\text{TNF}\alpha$) و جلوگیری از فعالیت سیکلوكسیزناز (COX-2) در LPS تحریک کننده ماکروفازها با مقدار IC₅₀ برابر با ۲/۷ میکرومتر در سلولهای سالم بررسی شد. علاوه بر این، اوژنول از ماکروفازهای محافظت شده از اختلال عملکرد سلولی ناشی از مواد شیمیایی محافظت می‌کند و واسطه‌های PRO ضد التهابی را تثبیت می‌کند. اوژنول به دلیل فعالیت ضد سرطان در برابر تومورهای پوستی،

قدرمند محافظت کننده است و این فعالیت به دلیل محتوای بالای فلاونوئید آن یافت شده است با کاهش تری گلیسیریدهای سرم و سطح کلسترول، اثربخشی ضدآب بودن عصاره میخک تایید شده است (۱۱). علاوه بر این رژیم غذایی همراه با عصاره میخک باعث کاهش انسولین سرم، لپتین و لیپیدهای کبدی به همراه وزن بدن موش‌های رژیم غذایی پرچرب شده است. که نشان‌دهنده یک مکمل ضد آب طبیعی و توانایی آن در کاهش تجمع لیپید کبدی است. روغن‌های اساسی میخک باعث افزایش گردش خون و افزایش دمای بدن می‌شوند. چندین گزارش نشان می‌دهد که میخک می‌تواند خطر ابتلا به اسکلروز شریانی، اختلالات قلبی عروقی و سایر بیماری‌های مرتبط با استرس اکسیداتیو را کاهش دهد. اوژنول همچنین عروق برگشت پذیر، فعالیت‌های اینوتروپیک منفی در عضله قلب را نشان می‌دهد و اثربخشی عضلانی صاف و کارآیی فشار خون را نشان می‌دهد (۹). همچنین دارای تحریک عصبی و همچنین رفتارهای جنسی در موش‌های نر باشد. و این عمل ممکن است به فعالیت تقویت کننده عصبی آنها نسبت داده شود. علاوه بر این، این افزایش عملکرد جفت‌گیری در موش‌ها را در مقایسه با افزایش انگیزه جنسی نشان داد و توانایی روغن میخک را برای مهار و جلوگیری از ارزال زودرس گزارش داد. رفتار جنسی میخک در انسان با تحریک سطح تستوسترون افزایش یافته است. روغن میخک به عنوان سنتز ترومبوکسان و مهار کننده‌های تجمع پلاکت ثابت شده و فعالیت ضد انعقادی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، روغن میخک مانع از تجمع پلاکت‌های ناشی از فاکتور فعل کننده پلاکت، اسید آراشیدونیک یا کلارژن می‌شود، و نتایج نشان داد که روغن میخک در مهار کننده عاملی فعل کننده پلاکت و تجمع اسید آراشیدونیک نسبت به کلارژن کارآمدتر است. همچنین، اوژنول برای جلوگیری از بیو سنتز پروستاگلاندین، تشکیل ترومبوکسان B2 و تجمع پلاکت ناشی از اسید آراشیدونیک در شرایط آزمایشگاهی گزارش شده است (۶). اثر ضدا سپا سم میوژنیک اوژنول در عضله صاف هوایی موشهای تایید شده است. مشخص شد که با مسدود کردن کانال‌های

در مان ایندومتاسین و افزایش غلاظت مخاط معده می‌شود (۱۰). متابولیسم اوژنول در داوتلبان سالم زن و مرد مورد بررسی قرار گرفته است. اوژنول پس از تجویز خوراکی به راحتی جذب می‌شود و به سرعت با نیمه عمر ۱۴ و ۱۸ ساعت به پلاسما و خون می‌رسد و تأثیر آن پس از تجویز روزانه برای در مان درد نورو پاتیک مشاهده شده است. پس از آن، اوژنول به اسید گلوکورونیک یا ترکیب سولفات در کبد متابولیزه CYP می‌شود. متیلوژنول با عملکرد آنزیم‌های مختلف ۴۵۰ به اپوکسید ۲'، ۳' (آلیلی) یا هیدروکسی متابولیزه می‌شود. متابولیسم اوژنول با همان مسیر فعال‌سازی نشان داده شده است و به نظر می‌رسد شکل ژنوتکسیک و سرطان زا اوژنول در مقایسه با متیلوژنول ناچیز است و در طول ۲۴ ساعت به شکل کونژوگه شده در ادرار دفع می‌شود. مسیرهای متابولیک ثانویه شامل اکسیداسیون پیوند دو زنجیره جانبی به اپوکسید و سپس هیدرولیز شدن به دیول و اکسیداسیون اضافی به ایزوژنول همراه با اکسیداسیون آلیلی و سپس کاهش پیوند مضاعف زنجیره جانبی است. کمتر از ۰/۱٪ از دوز اوژنول به صورت غیر مناسب در ادرار ترشح شد، در حالی که ۹۵٪ از دوز آن در ادرار ترمیم شد، بیشتر از ۹۹٪ از ترکیبات فنولیک و ۵۰٪ به عنوان اوژنول گلوکورونید و سولفات یافت شد. سازمان غذا و داروی ایمنی جوانه‌های میخک، روغن میخک، اوژنول و اولئورسین‌ها را به عنوان یک مکمل غذایی تأیید کرده است. با این حال، اخیراً توجه قابل توجهی در مورد سمیت آن وجود دارد فعالیت‌های سمیت سلولی اوژنول را در شرایط آزمایشگاهی در برابر فیبروبلاستهای انسانی و سلول‌های اندوتیال بررسی کرده‌اند (۱۵). از طرف دیگر، گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که اوژنول هنگام استفاده در دندانپزشکی از کارآیی آلرژیک کمتری برخوردار است. علاوه بر این، اوژنول و در زوج‌های نایاور دارای اثر اسپرمیک در شرایط آزمایشگاهی است سازمان بهداشت جهانی مقدار قابل قبول روزانه میخک در انسان ۲/۵ میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن را تایید کرده است.

تشکر و قدردانی

با تشکر از دانشگاه پیام نور که با حمایت آزمایشگاهی

ملانوما، سرطان معده، لوسمی و سرطان پروستات با تنظیم انکوژن و مسیر وابسته به کا سپاز مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، اوژنول و بی‌فنیل (S)-Dibromo-dehydrodieugenol آپوپتوز جزئی، اثربخشی ضدپرولیفراتیو را بر روی سلولهای تومور عصبی ایجاد می‌کند شکل اپوکسید اوژنول به عنوان یک درمان قوی برای تحریک آپوپتوز در سلولهای سرطانی پستان انسان گزارش شده است (۱۳). علاوه بر این، اوژنول از سرطان پستان مرتبط با انکوژن‌های مختلف یعنی NF-κB و سیکلین D1 جلوگیری می‌کند و همچنین سرطان پستان را به روش مستقل p53 مسدود و پروتئین مهار کننده وابسته به سیکلین را تنظیم کرد و این فعالیت ضدپرولیفراتیو به طور قابل توجهی در تومور سینه انسانی مورد توجه قرار گرفته است. غلظت سیتوکسیک اوژنول باعث کاهش ATP و تقویت متابولیت‌های گلیکولیتیک و پلی آمین‌ها در سلولهای خوراکی طبیعی و سرطان سلول سنگفرشی خوراکی شده است، که نشان دهنده القای مرگ و میر سلول غیربرنامه‌ریزی شده است. توانایی اوژنول در جلوگیری از متابولیز مرتب با استرس اکسیداتیو با مسدود کردن اثربخشی ماتریس متالوپروتئیناز در سلول‌های HT1080 ناشی از PMA نشان دادند (۶). امروزه، شیمی درمانی ترکیبی به عنوان مهمترین استراتژی برای کاهش بیماریهای جدی از جمله سرطان برای کاهش دوز دارو‌ها گزارش می‌شود و منجر به کاهش علائم سمی آنها و همچنین مقاومت به دارو می‌شود. اوژنول و درمان ترکیبی ۵-fluorouracil سمتی سلولی بیشتری نسبت به سلول‌های سرطانی دهانه رحم نشان می‌دهند.

اوژنول و روغن میخک با استفاده از مکانیسم عملکرد متفاوت، تأثیر قدرتمندی بر کبد چرب و دیس لیپیدمی دارند. که شامل استرس اکسیداتیو با کاهش آسیب اکسیداتیو است. آزمایشات نشان داد که تجویز اوژنول در ۱۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم ۴ روز قبل و ۶ روز همراه با جنتاماکسین سرکوب آسیب اکسیداتیو ناشی می‌باشد. علاوه بر این، پیش در مانی اوژنول در موش‌ها باعث ترشح اسید معده، زخم معده و فعالیت پپسین ناشی از

Property of a True Mangrove Rhizophora apiculata Bl. Chem Biodivers. 2023;20(9):e202201144.

9. Bian L, Sun H, Zhou Y, Tao Y, Zhang C. Enhancement of Antioxidant Property of N-Carboxymethyl Chitosan and Its Application in Strawberry Preservation. Molecules. 2022;27(23):8496.

10. Li Y, Kong D, Fu Y, Sussman MR, Wu H. The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiol Biochem. 2020;148:80-89.

11. Romano B, Lucariello G, Capasso R. Topical Collection "Pharmacology of Medicinal Plants". Biomolecules. 2021;11(1):101.

12. Ayeni EA, Gong Y, Yuan H, Hu Y, Bai X, Liao X. Medicinal Plants for Anti-neurodegenerative diseases in West Africa. J Ethnopharmacol. 2022;285:114468.

13. Shen YL, Li XQ, Pan RR, Yue W, Zhang LJ, Zhang H. Medicinal Plants for the Treatment of Hair Loss and the Suggested Mechanisms. Curr Pharm Des. 2018;24(26):3090-3100.

14. Niazian M. Application of genetics and biotechnology for improving medicinal plants. Planta. 2019;249(4):953-973.

15. Sun M, Xu S, Mei Y, Li J, Gu Y, Zhang W, Wang J. MicroRNAs in Medicinal Plants. Int J Mol Sci. 2022;23(18):10477.

این کار پژوهشی به سرانجام رسید

نتیجه‌گیری

فرایند اولتراسوند و استخراج عصاره گیاهان دارویی در دمای پایین به منظور حفظ ساختار ترکیبات دارویی و نقش حلال در بازده ترکیب استخراج شده اوژنول بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی

مقاله حاضر زیر نظر کمیته اخلاق دانشگاه پیام نور و با کد اخلاقی به شناسه IR.PNU.REC.1403.510 انجام گرفته است.

مشارکت نویسنده‌گان

هادی جباری نگارش و ویراستاری مقاله را بر عهده داشت و سکینه مرادخانی داده‌ها را تجزیه، تحلیل و آن را تفسیر کرد.

References

- Talaei A, Forouzanfar F, Akhondzadeh S. Medicinal Plants in the Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: A Review. Curr Drug Discov Technol. 2021;18(1):8-16.
- Cao X, Xie H, Song M, Zhao L, Liu H, Li G, Zhu JK. Simple method for transformation and gene editing in medicinal plants. J Integr Plant Biol. 2024;66(1):17-19.
- Maleš Ž, Drvar DL, Duka I, Žužul K. Application of medicinal plants in several dermatovenerological entities. Acta Pharm. 2019;69(4):525-531.
- Sirivibulkovit K, Nouanthavong S, Sameenoi Y. Paper-based DPPH Assay for Antioxidant Activity Analysis. Anal Sci. 2018;34(7):795-800.
- Baliyan S, Mukherjee R, Priyadarshini A, Vibhuti A, Gupta A, Pandey RP, Chang CM. Determination of Antioxidants by DPPH Radical Scavenging Activity and Quantitative Phytochemical Analysis of Ficus religiosa. Molecules. 2022;27(4):1326.
- Rumpf J, Burger R, Schulze M. Statistical evaluation of DPPH, ABTS, FRAP, and Folin-Ciocalteu assays to assess the antioxidant capacity of lignins. Int J Biol Macromol. 2023;233:123470.
- Huang G, Mei X, Hu J. The Antioxidant Activities of Natural Polysaccharides. Curr Drug Targets. 2017;18(11):1296-1300.
- Acharya S, Jali P, Pradhan M, Pradhan C, Mohapatra PK. Antimicrobial and Antioxidant