

تمایز سوش‌های چندگانه ترایکوفایتون متاگروفاپتیس در بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش تکثیر تصادفی پلی‌مورفیسم DNA (RAPD) در مراکز پوست وابسته به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: درماتوفیت‌ها، گروهی از قارچ‌های کراتین دوست هستند که گروه وسیعی از بیماری‌های پوست و ضمام آن مانند ناخن و مو را ایجاد می‌کنند. در بین عوامل قارچی، جنس ترایکوفایتون که عامل عمده کچلی پا در سرتاسر دنیا می‌باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است و تا به حال در حدود ۲۴ گونه آن شناسایی شده است. علاوه بر آن بررسی‌های مولکولی بر روی تمایز انواع گونه ترایکوفایتون متاگروفاپتیس در نمونه‌های جمع‌آوری شده در ضایعات یکسان از بیماران مختلف مبتلا به درماتوفیتوزیس، نشان دهنده وجود چندین گونه متفاوت در این ضایعات بوده است. هدف از انجام این پژوهش تعیین گونه و نوع ترایکوفایتون‌ها جهت جلوگیری از گسترش عفونت است که از نقطه نظر اپیدمیولوژیک بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

* دکتر سید امیر یزدان پرست I

حمزه رحیمی II

میتر فرودیان III

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. نمونه‌های پوست از ۱۰۰ بیمار مختلف مبتلا به درماتوفیتوزیس در اثر ترایکوفایتون متاگروفاپتیس کشت داده شد و پلیت‌های کشتی که دارای ۵ کلنی بودند، انتخاب شدند. DNA آن‌ها به طور جداگانه استخراج و نتایج با توجه به مراحل مختلف روش مولکولی واکنش زنجیرهای پلیمرز و بر اساس خصوصیت اختلاف در تعداد تکرار ژن‌های تولید کننده اسیدریبونوکلئیک ریپوزومی منطقه غیرژنی تجزیه و تحلیل شد. قابل ذکر است نتایج داده شده با آزمون‌های آماری انحراف معیار ($\pm SD$)، Chi-square و t-student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: از میان ۱۰۰ نمونه ترایکوفایتون متاگروفاپتیس تنها در ۲۰ نمونه، تعداد ۲ نوع مختلف یا بیشتر در یک اریته از گونه ترایکوفایتون متاگروفاپتیس مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش پیش بینی می‌شود که در تعداد زیادی از عفونت‌های قارچی پوست که توسط ترایکوفایتون متاگروفاپتیس ایجاد شده اند، گونه‌های زیادی وجود داشته باشد. وجود چنین مسئله‌ای (Multiple strain) در مطالعات اپیدمیولوژیک مربوط به بیماری‌های قارچی، نحوه درمان و مشخص کردن مقاومت دارویی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ۱- ترایکوفایتون متاگروفاپتیس ۲- درماتوفیتوزیس ۳- تمایز مولکولی استرین‌ها ۴- تکثیر تصادفی پلی‌مورفیسم DNA (RAPD)

تاریخ دریافت: ۸۷/۲/۲۳، تاریخ پذیرش: ۸۷/۹/۱۱

مقدمه

یکی از نتایج تشکیل این کلنی‌های درماتوفیتی واکنش میزبان با متابولیت‌های قارچ است که شدت بیماری براساس استرین یا گونه درماتوفیت و حساسیت میزبان به قارچ خاص متفاوت می‌باشد. به طور کلی، واکنش میزبان تحت تاثیر ایمنی میزبان و گونه‌ها و زیر گونه‌های قارچ بوده و حساسیت نسبت به درماتوفیت‌ها می‌تواند

درماتوفیت‌ها، گروهی از قارچ‌های کراتین دوست هستند که در سه دسته اپیدرموفایتون، میکروسپوروم و ترایکوفایتون قرار می‌گیرند و شایع‌ترین تظاهر آن‌ها کچلی پا (پای ورزشکاران)، کچلی ناخن و کچلی تنه و سر می‌باشد.^(۱) علل عمده کچلی پا در سرتاسر دنیا ترایکوفایتون متاگروفاپتیس و ترایکوفایتون روبروم گزارش شده است.^(۲)

این مطالعه تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است (کد پروژه ۶۰۳).

(I) دانشیار و متخصص قارچ شناسی، بخش قارچ شناسی، دانشکده پیراپزشکی، تقاطع بزرگراه‌های شهید همت و چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، تهران، ایران (* مولف مسؤول)

(II) دانشجوی دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، انیستیتی پاستور ایران، تهران، ایران

(III) کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، تهران، ایران

از نوع فوری یا تاخیری باشد که به طور معمول حساسیت فوری در اثر کربوهیدرات قارچ و حساسیت تاخیری در اثر وجود پروتئین قارچ ایجاد می‌گردد.^(۳) تریکوفایتون متاگروفایتیس دارای انواع متفاوتی است، اما اغلب تنها دو نوع آن از ضایعات انسانی جدا شده است: تریکوفایتون متاگروفایتیس وارپته اینتردیجیتال (فرم انسان دوست) و تریکوفایتون متاگروفایتیس وارپته متاگروفایتیس (فرم حیوان دوست). وارپته متاگروفایتیس معمولاً باعث ضایعات التهابی کچلی سر، کچلی بدن و کچلی کشاله ران می‌شود، در حالی که وارپته انسان دوست (اینتردیجیتال) اکثراً باعث کچلی مزمن پا، کچلی ناخن و کچلی نواحی چین‌دار می‌شود.

داروهای موضعی ضد قارچ گروه آزول از موثرترین داروها جهت درمان درماتوفیت‌ها هستند. درمان درماتوفیتوزیس و انیکومایکوزیس ناشی از درماتوفیت‌ها با تربینافین (Terbinafine) در ۸۵٪ موارد موفقیت‌آمیز بوده است. از دلایل عمده عدم موفقیت درمان (۱۵٪) می‌توان به عواملی مانند عدم نفوذ دارو به بافت‌های عمقی، مقاومت به داروهای ضد قارچی، عدم تشخیص صحیح عوامل قارچی، در آزمایشگاه، انواع گونه‌ها، وارپته‌ها و استرین‌های قارچی، عوامل سیستمیک و پاسخ‌های میزبان و مهم‌تر از همه ساختمان پیچیده و مقاوم آرتروکونیدیا اشاره کرد که تمام آن‌ها می‌توانند سبب عود مجدد شوند.

عود بیماری به ویژه در عفونت‌های ناشی از تریکوفایتون روبروم به طور مکرر مشاهده شده است.^(۴) از نظر رشد اپیدمیولوژیک (Dysgonic)، تعیین وارپته و استرین تریکوفایتون‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها برای جلوگیری از گسترش عفونت از اهمیت زیادی برخوردار است.

در حال حاضر تشخیص آزمایشگاهی گونه‌ها و وارپته‌های تریکوفایتون براساس آزمایش‌های میکروسکوپی و کشت‌های آزمایشگاهی و تست‌هایی مانند سوراخ کردن مو و تعدادی از تست‌های فیزیولوژیکی صورت می‌گیرد که اغلب این تست‌ها بسیار وقت‌گیر بوده و نیاز به مهارت‌های

خاص و دقت فراوان در آزمایشگاه دارند.^(۵)

روش‌های مولکولی تیپ‌بندی جهت مطالعه گونه‌های درماتوفیت با موفقیت زیادی همراه نبوده است. روش آنالیز آنزیمی محدودکننده DNA (Restriction Enzyme Analysis) میتوکندری ایزوله‌های تریکوفایتون متاگروفایتیس از نواحی مختلف جغرافیایی نتوانسته تفاوت بین گونه‌ای (Intraspecies) را معلوم کند.^(۶) در حالی که روش تکثیر اتفاقی DNA پلی‌مورفیک (Random Amplified Polymorphic DNA- RAPD) هتروژنیسیته موجود بین ایزوله‌های تریکوفایتون ویولاسئوم را در یک مطالعه اپیدمیولوژیک نشان داده است.^(۷) در مطالعات انجام شده معلوم شده است که دو وارپته تریکوفایتون متاگروفایتیس با استفاده از یک پرایمر RAPD از همدیگر متمایز می‌شوند^(۸) که براساس باندهای اختصاصی مشاهده شده، بیش‌هایی را نسبت به ساختار ژنتیکی و عملکردهای ممکن در مورد این نواحی ژنی اشغال شده فراهم می‌کند که موجب درک بیشتر روابط ژنتیکی بین وارپته‌های مختلف تریکوفایتون‌ها می‌شود و تشخیص درماتوفیت‌های انسانی بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد.

این مطالعه که در مقطع زمانی یک ساله (۱۳۸۶-۱۳۸۵) انجام شد، نشان داد که عامل جدا شده تریکوفایتون متاگروفایتیس از ضایعات پوست در یک بیمار مشخص، ممکن است که دارای چندین استرین مختلف باشد که این مسئله در مطالعات اپیدمیولوژیکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

هدف از انجام این پژوهش تعیین وارپته و استرین تریکوفایتون‌ها جهت جلوگیری از گسترش عفونت است که می‌تواند نقش بسزایی در بررسی چگونگی الگوی مقاومت و نحوه درمان این بیماری داشته باشد.

روش بررسی

جمع‌آوری نمونه‌ها

ایزوله‌های تریکوفایتون متاگروفایتیس از ضایعات پوستی درماتوفیتی در دست، پا، سینه، پشت

۹۵٪ و ۲ نوبت شستشو رسوب DNA با اتانول سرد ۷۰٪، می‌توان رسوب را روی کاغذهای مخصوص خشک و بعداً در ۲۰۰ میکرولیتر از آب مقطر استریل به صورت معلق در لوله اپندورف میکروسانتریفوژ حل کرد.

تکثیر DNA با استفاده از روش RAPD

جهت تکثیر منطقه غیرژنی بین محل TRS1-(NTS region of T.rubrum) از پرایمرهای (RAH1) 5-ATGGATCCGG-3 (RAH2) و 5-GTGACGTAGG-3 (شرکت سیناژن، ایران) در واکنش‌های جداگانه استفاده شد. DNA با استفاده از دستگاه ترموسایکلر Palam Cyclo (شرکت آرمین طب، ایران) در حجم ۵۰ µl انجام شد. هر واکنش حاوی ۵۰-۲۵ میکروگرم (µg) از DNA قارچی، ۵۰ پیکومول (pmol) از هر یک از دی‌اکسی نوکلئوزید تری فسفات‌ها، Tris-HCL 10mmol (PH=8.3)، ۱۵۰mmol/l MgCl₂-kcl 0/5mmol/l، ۱۰۰ pmol از پرایمر و 1U از DNA Taq پلیمرز (شرکت سیناژن، ایران) می‌باشد.

واکنش در ۳۰ سیکل و با شرایط زیر انجام شد: ۹۴،۵°C ۹۴ دقیقه یک سیکل، ۹۴°C ۱ دقیقه، ۵۸°C ۶۰ ثانیه، ۷۲°C ۳ دقیقه در ۳۰ سیکل. در هر آزمایش یک لوله فاقد DNA به عنوان کنترل منفی استفاده شد. قطعات DNA حاصل بر روی ژل آگاروز ۲٪ (wt/vol) (شرکت سیناژن، ایران) به مدت یک ساعت در ولتاژ ۷۰ میلی‌آمپر با بافر 1x TBE (89.2 mmol/l Tris) 89 mmol/l بوریک اسید و ۰/۵ mmol/l EDTA ران و جدا شد. سپس با رنگ اتیدیوم بروماید (۰/۵ µg/ml) رنگ‌آمیزی انجام شد. در نهایت محصول PCR زیر نور فرابنفش مورد مشاهده و عکس برداری قرار گرفت. از مارکر ۱۰۰ bp (QiaGene, Germany) جهت تعیین اندازه باندها و به عنوان نشانگر مورد استفاده قرار گرفت. ذکر این نکته لازم است که با استفاده از کنترل‌های منفی DNA و PCR در تمام تست‌ها، هیچ‌گونه باندها مشاهده نشد.

و گردن ۱۰۰ بیمار مختلف که مبتلا به درماتوفیتوزیس بودند به طور تصادفی از بیمارستان حضرت رسول اکرم و آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت ۶ ماه جمع‌آوری شده‌اند. سپس هر یک به طور جداگانه به روش آزمایش مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند و روی محیط کشت سابورودکستروز آگار (SAB-agar) کشت داده شدند. ۶۰٪ نمونه‌ها در آزمایش مستقیم مثبت گزارش شدند و سپس از هر پلیت کشت، ۵ کلنی انتخاب گردید.


استخراج و تخلیص DNA از ایزوله‌های قارچی

ایزوله‌های قارچی تریکوفایتون منتاگروفایتیس به طور جداگانه در حجم ۵۰ میلی‌لیتر از محیط کشت آبگوشت سابورود (Sabouraud broth) به مدت ۷ روز در حرارت ۲۷ درجه سانتی‌گراد (°C) در داخل دستگاه شیکر انکوباتور با سرعت ۱۵۰ rpm کشت داده شدند. جرم زیستی حاصل، پس از ۲ نوبت شستشو با آب مقطر استریل و صاف کردن از صافی مخصوص جمع‌آوری و در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. به ۲-۳ گرم از جرم زیستی شده در داخل یک هاون چینی سرد، نیتروژن مایع اضافه گردید و با استفاده از دسته هاون چینی آسیاب و به پودر تبدیل گردید. سپس به ۲۰۰ میلی‌گرم از این پودر مقدار ۶۰۰ میکرولیتر (µl) از بافر لیز (400 mM Tris-HCl, pH 8.0; 60 mM EDTA; 150 mM NaCl; 1% [SDS]; 40 mg/ml proteinase K) اضافه گردید.


نمونه‌ها به مدت ۱ ساعت در حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوبه شدند و سپس ۱۰۰ میکرولیتر از سدیم پرکلرات اضافه و به مدت ۱۵ دقیقه در حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید. پس از قرار دادن لوله‌ها بر روی یخ، ۵۰۰ میکرولیتر از کلروفرم سرد و ۵۰۰ میکرولیتر از فنل کلروفرم ایزوآمیل (۱:۲۴:۲۴:۱، pH=۸) و در نهایت ۵۰۰ میکرولیتر کلروفرم افزوده شد. سپس با اضافه کردن ۱۰۰۰ میکرولیتر اتانول سرد

یافته‌ها

در این مطالعه که با روش RAPD انجام شد، تعداد ۱۰۰ ایزوله ترایکوفایتون منتاگروفایتیس به دست آمده از ضایعات یکسان پوست که هر یک متعلق به بیمار مشخصی بود، بر روی محیط SAB کشت داده شدند و از هر پلیت کشت، ۵ عدد کلنی انتخاب گردید (شکل شماره ۱). DNA استخراج شده از کلون‌های مذکور جهت تکثیر با روش RAPD مورد آزمایش قرار گرفتند که نشان داد بیش از یک استرین در نمونه‌ها وجود دارد (اشکال شماره ۲ و ۳).




شکل شماره ۳- تمایز استرین‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و تعیین نوع مربوطه در ۵ کلنی مربوط به هر بیمار از نمونه‌های پوست در ۲ بیمار مختلف مبتلا به درماتوفیتوزیس با روش PCR. 5: ت. منتاگروفایتیس) بیمار شماره ۶، نوع ۱- نشان وزن مولکولی، - باند- 1: mx ت: 10: (+C): ت. م. بیمار شماره ۷. (نوع ۲، - باند ۱۱ - - باند ۶، DNA) کنترل منفی) استخراج: (-C) کنترل مثبت، نوع ۲، - باند ۱۲، LM101 (PCR) کنترل منفی: - (xc) باند ۱۳



شکل شماره ۱- ۵ کلنی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس

توصیف انواع، براساس روش دکتر جکسون^(۹) انجام شد. بدین ترتیب که نوع ۱ بیان‌کننده یک باند منفرد به اندازه ۴۳۴ bp و نوع ۲ به اندازه ۲۰۰ bp بزرگ‌تر یعنی ۶۳۴ bp می‌باشد و نوع ۳، تولید بانندی به اندازه ۸۳۴ bp می‌نماید. همچنین، ایزوله ترایکوفایتون منتاگروفایتیس نوع ۲ که به عنوان کنترل مثبت DNA در تست‌ها استفاده شد، اهدایی دکتر سی جکسون بوده است.

نتایج متمایزسازی استرین‌های چندگانه ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش RAPD در جدول شماره ۱ آورده شده است. ۲۰ بیمار دارای عفونت همزمان با بیشتر از یک استرین از ترایکوفایتون منتاگروفایتیس بودند. نمونه‌هایی از این متمایزسازی و باندهای تشکیل شده یکسان یا هموزن و نامتجانس یا هتروژن در اشکال مشاهده می‌شود.



شکل شماره ۲- تمایز استرین‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و تعیین نوع مربوطه در ۵ کلنی مربوط به هر بیمار از نمونه‌های پوست در ۲ بیمار مختلف مبتلا به درماتوفیتوزیس با روش RAPD، باند شماره ۱ مارکر مولکولی 100 BP، باند شماره ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مربوط به کلنی‌های یک بیمار، باند شماره ۷ کنترل مثبت، باند شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مربوط به کلنی‌های بیمار شماره ۲، باند شماره ۱۳ و ۱۴ کنترل منفی می‌باشند.

جدول شماره ۱- تمایز استرین های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در نمونه ضایعات پوست مبتلا به درماتوفیتوزیس

شماره بیمار	جنس سن (سال)	مدت زمان تخمینی عفونت	تاپ (تعداد کلنی)
۱	مرد-۵۰	یکسال	۳)۱ و (۱)۲ و (۱)۱۲
۲	مرد-۴۲	ناشناخته	۳)۱ و (۲)۲
۳	زن-۳۳	کمتر از ۱ سال	۳)۱ و (۲)۲
۴	مرد-۶۱	ناشناخته	۴)۱ و (۱)۱
۵	زن-۴۷	بیشتر از ۱ سال	۳)۱ و (۲)۲
۶	مرد-۳۶	کمتر از ۱ سال	۴)۳ و (۲)۲
۷	زن-۶۷	کمتر از ۱ سال	۳)۴ و (۱)۴
۸	زن-۳۵	کمتر از ۱ سال	۲)۳ و (۱)۳
۹	مرد-۴۴	ناشناخته	۳)۱۲ و (۱)۳ و (۱)۲
۱۰	زن-۵۲	بیشتر از ۱ سال	۳)۳ و (۲)۳
۱۱	مرد-۲۵	کمتر از ۱ سال	۴)۳ و (۲)۳
۱۲	زن-۲۹	کمتر از ۱ سال	۴)۱ و (۱)۳
۱۳	زن-۳۴	ناشناخته	۳)۳ و (۲)۲
۱۴	مرد-۳۸	کمتر از ۱ سال	۴)۱ و (۱)۲
۱۵	زن-۴۳	بیشتر از ۱ سال	۳)۴ و (۲)۳
۱۶	مرد-۴۵	کمتر از ۱ سال	۳)۲ و (۲)۱
۱۷	زن-۵۱	کمتر از ۱ سال	۳)۱ و (۲)۲
۱۸	مرد-۲۸	کمتر از ۱ سال	۴)۱ و (۱)۴
۱۹	زن-۱۹	ناشناخته	۳)۱ و (۲)۲
۲۰	مرد-۲۶	کمتر از ۱ سال	۴)۲ و (۱)۱۲

بحث

این تحقیق نشان داد که بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس ممکن است در یک زمان مبتلا به چند استرین از یک وارپته ترایکوفایتون منتاگروفایتیس باشند. این مطلب شاید توضیحی برای عدم درمان کامل این عفونت ها یا درمان طولانی مدت ضایعات درماتوفیتی و مزمن بودن طولانی مدت این بیماری ها باشد.

تاکنون چنین تصور می شد که عامل درماتوفیتی تنها یک استرین است و دارو جهت درمان بیماری تجویز می شد، در حالی که ممکن است استرین های مختلف این عامل قارچی، پاسخ های مختلفی به درمان دارویی بدهند و از درجه حساسیت متفاوتی برخوردار باشند.

با پیشرفت تکنولوژی امروزه کاربردهای PCR بیشتر شده است که از جمله آن استفاده از روش RAPD در

مطالعه حاضر می باشد. به عنوان مثال، اکنون می توانیم تعیین کنیم که عود (Relapse) بیماری بعد از یک درمان موفقیت آمیز به علت (Reinfection) یعنی تکرار بیماری به علت یک استرین جدید است یا در اثر Recrudescence است، یعنی تکرار عفونت در اثر یا به علت همان استرین قبلی می باشد.

یکی از مهم ترین تحقیقات اپیدمیولوژی که انجام شدن آن ضروری به نظر می رسد این مطلب است که آیا عفونت ها در اثر یک استرین یکسان به وجود آمده اند یا در اثر چند استرین مختلف؟ این پژوهش جهت مطالعات آتی بسیار با اهمیت به نظر می رسد. متمایز کردن استرین های قارچی از طریق روش های مولکولی در مورد درماتوفیت های انسانی تنها توسط یکی از محققان گزارش شده است.^(۱۰) از جمله در مورد ترایکوفایتون منتاگروفایتیس^(۸) یا ترایکوفایتون روبروم یکی از محققان تنها تمایز بسیار ناچیزی را در بین استرین های مختلف گزارش نمود و نتیجه گیری کرد که ترایکوفایتون روبروم نشان دهنده یک گونه کلونال است (Clonal species).

کاک و همکاران در سال ۱۹۹۹، مطالعه هایی را در زمینه مقایسه ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفایتون منتاگروفایتیس انجام دادند^(۱۱) و با استفاده از روش مولکولی تکثیر شناسایی مناطق تغییر یافته و پرایمر اتفاقی یا روش DNA-(Random amplified polymorphic RAPD) دریافتند که از نظر مولکولی ۲ ایزوله ترایکوفایتون منتاگروفایتیس جدا شده از ۲ بیمار مبتلا تفاوتی با هم نداشته اند. در حالی که نکته قابل توجه این بود که ۲ ایزوله جمع آوری شده از این بیماران که در یک مکان نیز زندگی می کردند، از نظر ظاهری با هم تفاوت داشتند.

هر چند که مقایسه این مطالعه با مطالعه دکتر کاک و همکاران مشکل به نظر می رسد، اما می توان چنین پیشنهاد کرد که شاید استرین های عفونت های مربوط به ترایکوفایتون منتاگروفایتیس نسبت به ترایکوفایتون روبروم از نزدیکی (Less heterogeneity) بیشتری برخوردار باشند.

نتیجه‌گیری

مربوط به عدم موفقیت و نیز عود بیماری در درمان پس از درمان کامل (Relapse) پاسخ دهد.

به نظر می‌رسد که مطالعه طرح احتمال چند استرین بودن گونه‌های مربوط به درماتوفیت‌ها (Multiple Strains) و عوامل دیگر عفونت‌های قارچی در مطالعات آینده ضروری باشد. توزیع و پراکندگی انواع به دست آمده از این آزمایش و نمونه‌های جمع آوری شده شباهت زیادی با مطالعات وسیع‌تر قبلی در منطقه انگلستان داشت.^(۹) از آن جا که ما هنوز از دستیابی به یک درمان سریع و مطمئن جهت عفونت‌های حاد اونیکومایکوزیس حتی پس از ماه‌ها درمان به دور هستیم، این روش، قادر است که به بسیاری از سئوالات

تقدیر و تشکر

بدین وسیله نویسندگان مقاله از مساعدت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت انجام این پروژه تحقیقاتی کمال تشکر را دارند و نیز از همکاران محترم در دانشکده پیراپزشکی و مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی و نیز دکتر سی جکسون به خاطر اهدای نمونه کنترل مثبت DNA از دانشگاه ابردین سپاسگزاری می‌نمایند.

فهرست منابع

- 1- Rippon JW. Medical mycology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 1988.p.169-275.
- 2- Evans, EGV. Causative pathogens in onychomycosis and the possibility of treatment resistance; A review. JAAD 1988; 39(5) Part 3: S32.
- 3- Graham-Brown R, Burns T. Lecture notes on dermatology. 1st ed. Oxford: Black well scientific publications; 1990.p. 25.
- 4- Roberts DT, Evans EGV. Subfungal dermatophytoma complicating dermatophyte onychomycosis. British association of dermatologists. BJD 1998; 138: 189-203
- 5- Evans EGV, Richardson MD. Medical mycology, a practical approach. 1st ed. Oxford: IRL Press; 1989. p. 68-71.
- 6- Liu D, Coloe S, Pedersen J, Baird R. Use of arbitrarily primed PCR to differentiate trichophyton dermatophytes FEMS. Microbiol Lett 1996; 116(2): 147-50.
- 7- Soll DR. The ins and outs of DNA finger printing the infectious fungi. Clin Microbiol Rev 2000; 13(2): 332-70.
- 8- Bistis GN. Pleomorphism in the dermatophytes. Mycologia 1959; 51(1): 440-52.
- 9- Jackson CJ, Barton RC, Evans EGV. Species identification & strain differentiation of dermatophyte fungi by analysis of ribosomal-DNA spacer regions. JCM 1999; 37(4): 931-6.
- 10- Moor D, Novak Farzer LA. Why study the genom of fungi? In: Essential fungal Genetics.. Moor D, editors. New York : 2002, p.1-25
- 11- Kac G, Boughoux ME, Feuilhade De, Chauvin M, Sene S, Derouin F. Genetic diversity among T. Mentagrophytes isolates using random amplified polymorphic DNA method. BJD 1999; 140(5): 839-44.

Molecular Strain Typing of Trichophyton mentagrophytes Isolated from Patients with Dermatophytosis by Random Amplified Polymorphic DNA

***S.A. Yazdanparast, PhD^I H. Rahimi, MSc^{II}
M. Farnoodian, MSc^{III}**

Abstract

Background and Aim: Dermatophytes are the group of keratinophilic fungi that can cause diseases and infection in skin and other keratinized parts such as nail and hairs. The most important genus among keratinophilic fungi is Trichophyton which can be the most probable cause of tinea pedis in the world. There are 24 recognized species of this genus. Additionally, molecular strain typing of Trichophyton mentagrophytes isolates within skin specimens from patients with dermatophytosis indicates involvement of multiple strains. The aim of this study was the determination of strains of Trichophyton mentagrophytes in order to prevent the dissemination of infection, which is very important epidemiologically.

Materials and Methods: The study was of descriptive – analytic type. Skin specimens from 100 patients who had dermatophytosis by Trichophyton mentagrophytes were cultured and plates which had 5 colonies were selected. Deoxyribonucleic acid (DNA) was extracted from the isolates. According to PCR-based typing method that analysed variations in the numbers of repeats in the non-transcribed spacer (NTS) region of the ribosomal ribonucleic acid (rRNA) gene repeats, data were described. All the results were analyzed by (\pm SD), Chi-square and t-student tests.

Results: In 20 out of 100 specimens of Trichophyton mentagrophytes, there were 2 or more strain types in a variety of Trichophyton mentagrophytes.

Conclusion: These results suggest that in the most cases of fungal infections caused by Trichophyton mentagrophytes, multiple strains are involved. These results have important implications in epidemiological studies, treatment and drug resistance in fungal infection.

Key Words: 1) Trichophyton mentagrophytes 2) Dermatophytosis
3) Molecular strain typing 4) Random amplified polymorphic DNA

This study has been conducted under the financial support of Iran University of Medical Sciences and Health Services.

I) Associate Professor of Mycology, Department of Mycology, Faculty of Paramedical Sciences, Crossing of Shaheed Hemmat and Chamran Expressways, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran (* Corresponding Author)

II) PhD student in Medical Biotechnology, Department of Medical Biotechnology, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

III) MSc in Mycology, Department of Mycology, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran