بررسی اثر گازهای شیمیایی(به طور عمده موستارد) روی نوتروفیل‌های مصدومان شیمیایی ۱۰ سال پس از مصدومیت طی جنگ تحمیلی

دکتر ابراهیم هوشیار I

دکتر زهیر محمد حسن II

دکتر علیرضا سالک‌مقدم III

***زهرا شاکر** IV

دکتر معصومه ابتکارV

چکیده

بروز عفونت‌های مکرر، به خصوص در نواحی پوست، چشم و ریه در مجروحان شیمیایی جنگ، این فرضیه که شاید سیستم فاگوسیتوز دچار اختلال شده باشد را مطرح می‌نماید و از آن‌جا که نقص سیستم فاگوسیتوز در سوختگی‌ها به اثبات رسیده و در این مجروحان نیز سوختگی‌های سطحی وجود دارد، این فرضیه قوت می‌یابد. این مطالعه بر اساس مطلب ذکر شده شکل گرفت و هدف از آن بررسی تعداد و عمل‌کرد نوتروفیل‌ها در مصدومان شیمیایی بوده است. در این پژوهش طی آن ۳ گروه ۲۵ نفری از بیماران در ۳ درجه خفیف، متوسط و شدید همراه با یک گروه شاهد با ۱۰ عضو مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش‌های انجام شده شامل ۳ بخش بررسی مورفولوژی، CBC(Complete Blood Count) و فلوسایتومتری بود. در این مطالعه از تمام بیماران(۸۵ نفر)، ۵ میلی‌لیتر خون محیطی گرفته شد و پس از انتقال به مرکز درمانی، با تهیه فروتی، مورفولوژی سلول‌های خون محیطی با عدسی X۱۰۰ و روغن ایمرسیون مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری شاخص‌های مربوط به WBC(White Blood Cell)، RBC(Red Blood Cell)، پلاکت و میزان هموگلوبین با استفاده از شمارش‌گر خون‌شناسی ۱۰۰۰-Sysmex K انجام شد. طی آزمایش‌های فلوسایتومتری، شاخص‌های CD۴۵، CD۱۵ و CD۱۶ بر سطح سلول‌های نوتروفیل با فنوتیپ CD۴۵/CD۱۵/CD۱۶ مورد بررسی قرار گرفتند. عمل‌کرد این سلول‌ها با استفاده از تست NBT(Nitro Blue tetrazolium) که شامل احیای رنگ نیتروبلوتترازولیوم شفاف و محلول در آب به فورمازان آبی نامحلول و رسوب آن در داخل نوتروفیل‌ها است، مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق انجام شده از نوع توصیفی ـ کاربردی بود و در مجموع نتایج آماری حاصل از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و در تأیید آن شفه هیچ اختلاف معنی‌داری را در بررسی میانگین درصد و تعداد مطلق جمعیت سلولی $CD_{16}^{+}/CD_{15}^{+}/CD_{45}^{+}$ و نیز میانگین درصد آزمایش‌های NBT در گروه‌های بیمار و طبیعی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها: ۱ – گاز خردل ۲ – مصدومان شیمیایی ۳ – نوتروفیل

مقدمه

خردل نیتروژنی و خردل گوگردی معروف‌ترین ترکیبات صناعی خردل هستند. در دسته‌بندی عوامل شیمیایی جنگی،

این مقاله خلاصه‌ای است از پایان نامه دکتر ابراهیم هوشیار جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی به راهنمایی دکتر زهیر محمد حسن و مشاوره دکتر علیرضا سالک‌مقدم، سال ۱۳۷۶.

I) دکترای علوم آزمایشگاهی

II) استاد گروه ایمنی‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، بزرگراه جلال آل احمد، تهران.

III) استاد گروه ایمنی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی، تهران.

IV) کارشناس ارشد ایمنی‌شناسی، مربی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ارتش، خیابان کارگر شمالی، تهران(*مولف مسئول)

V) دانشیار گروه ایمنی‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، بزرگراه جلال آل‌احمد، تهران.

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

خردل‌ها جزء عوامل تاول‌زا محسوب می‌شوند. هر دو نوع دارای ساختمان مشابه بوده و واکنش‌های شیمیایی بین آن‌ها مشترک می‌باشد. هم‌چنین این گازها دارای اثرات بیولوژیک یکسانی هستند.

خردل با استفاده از ٤ مکانیسم هیدرولیز(۱و ۲)، غیرفعال کردن پلاسمینوژن و الکیلاسیون(۳) اثرات خود را بر فرایندهای بیولوژیک اعمال می‌کند. خردل‌ها، گرایش خاصی نسبت به اسیدهای نوکلئیک دارند به این ترتیب که با ایجاد یون کربونیوم، پیوندهای داخل رشته‌ای و بین رشته‌ای را تشکیل داده و آن‌ها را الکیله می‌کنند که موجب بروز اشتباهات و اختلالاتی در تکثیر DNA یا ساخت پروتئین می‌شود(۳).

به نظر می‌رسد که تغییرات ایجاد شده توسط خردل در بازهای DNA توجیه کننده خواص جهش‌زایی و سرطان‌زایی آن باشد.

تعادل ایمنی وابسته به اثرات سیستم عصبی مرکزی، توانایی سلول‌های ایمنی و تعادل اندوکرین می‌باشد. در واقع ماکروفاژها، لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها برای بسیاری از هورمون‌ها مانند کورتیکواستروییدها، انسولین، هورمون رشد، کاتکولامین‌ها، استیل‌کولین و اندورفین‌ها دارای گیرنده هستند و هر گونه تغییر بارز در وضعیت هورمون‌ها به دنبال جراحت، ممکن است در نقص ایمنی ایجاد شده نقش داشته باشد(٤).

در مطالعه دکتر بهار و همکاران بیان شده است که فعالیت فاگوسیتوزی در مصدومان ناشی از خردل در مدت ۱ ماه بعد از مسمومیت کاهش شدید را نشان می‌دهد، به طوری که ضریب فاگوسیتوزی در برخی موارد به $\frac{۱}{۵}$ حد طبیعی کاهش می‌یابد.

ضریب اپسونین کاهش کم‌تر و وضعیت بهتری نسبت به ضریب فاگوسیتی دارد. این ضریب‌ها ۳ ماه بعد به حالت طبیعی باز می‌گردند(۵).

دکتر کیهانی و همکارانش طی مطالعه‌ای روی ۱۲۱ مجروح ایرانی آلوده به خردل با استفاده از آزمایش کیفی NBT نشان دادند که عملکرد فاگوسیت‌های نوتروفیل در فاصله زمانی حداکثر ۵۱ روز پس از آلودگی در تمام موارد مثبت بوده که نشان‌دهنده عدم اختلال عملکرد فاگوسیتیک نوتروفیل‌ها بوده است(٦). دکتر زندیه مطالعه وسیعی را در مراحل مختلف روی سیستم فاگوسیتوز در مجروحان شیمیایی که ۲-۱ سال از زمان مجروح شدن آن‌ها گذشته بود، انجام داد.

در این تحقیق حرکت سلولی و فاکتورهای کموتاکسی، میزان اپسونین‌های پلاسما و سطح سلول، تست کیفی NBT و آزمایش Killing سلولی به روش حساس و دقیق رادیواکتیو انجام شد و نتایج آن طبیعی گزارش گردید(۷).

براساس تحقیق دکتر عماد و همکارانش در بیماران مبتلا به فیبروز ریوی تعداد نوتروفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری بیش‌تر بود.

یافته جالب در این تحقیق ارتباط قوی بین نمونه‌های بیوپسی نمونه‌های مایع BAL بیماران مبتلا به فیبروز ریوی با تعداد سلول‌های نوتروفیل بود. به نظر می‌رسد که رادیکال‌های آزاد مشتق از اکسیژن و آزادسازی پروتئاز توسط نوتروفیل‌ها در پاتوژنز فیبروز ریوی ایدیوپاتیک نقش مهمی را ایفا نماید(۸).

هدف از این مطالعه بررسی تعداد سلول‌های نوتروفیل با استفاده از شاخص‌های سطحی مربوطه و عملکرد این سلول‌ها با استفاده از تست احیای NBT در مصدومان شیمیایی آلوده شده با گاز خردل که در زمان مطالعه بیش از ۱۰ سال از مصدومیت آن‌ها می‌گذشت، بوده است.

روش بررسی

آزمون آماری به کار رفته در این مطالعه توصیفی - کاربردی آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA در ابتدا بود که در صورت معنی‌دار بودن نتایج، برای یافتن عامل معنی‌دار کننده و تأیید آن از آزمون آماری شفه استفاده شد.

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

بیماران مورد مطالعه در این تحقیق مصدومانی بودند که طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در معرض گاز شیمیایی خردل قرار گرفته بودند و حدود ۱۰ سال از مصدومیت آن‌ها می‌گذشت.

این افراد با مراجعه به کلینیک مجروحان شیمیایی مورد معاینه تیم مجرب متخصصان ریه قرار گرفتند.

بیماران براساس یافته‌های بالینی فیزیکی، تست‌های اسپیرومتری و برونکوسکوپی و بر حسب شدت ضایعات به ۳ گروه خفیف، متوسط و شدید دسته‌بندی شدند.

از کل بیماران مورد معاینه، ۷۵ بیمار در ۳ گروه ۲۵ نفری قرار گرفتند و همراه با ۱۰ فرد سالم که قبلاً در جبهه جنگ حضور داشته اما شیمیایی نشده بودند(به عنوان گروه شاهد) بررسی شدند.

ـ نمونه‌گیری: از هر بیمار ۵ میلی‌لیتر خون محیطی گرفته شد و به شیشه حاوی ماده ضد انعقاد EDTA(Ethylene Diamide Tetra Acetic acid) منتقل گردید. سپس نمونه‌های جمع‌آوری شده جهت بررسی مورفولوژی سلول‌های خون محیطی، CBC و برانگیختن NBT و آزمایش‌های فلوسایتومتری به بخش مربوطه در مرکز تحقیقات هسته‌ای بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقال داده شدند.

ـ رنگ‌آمیزی گسترش‌های خون محیطی: جهت بررسی مورفولوژی سلول‌های سفید و قرمز خون محیطی، ابتدا از نمونه خون، یک فروتی تهیه شد و پس از خشک شدن لام و ثابت کردن آن‌ها با متانول، لام‌ها به داخل سبد رنگ‌آمیزی منتقل شده و سبد در داخل بوکال حاوی رنگ گیمسا گذاشته شد.

در مرحله بعد لام‌ها به مدت ۲۰ دقیقه از سبد خارج شده و در داخل آب قرار گرفتند سپس به آرامی شسته شده و خشک شدند و در نهایت با عدسی ۱۰۰X و روغن ایمرسیون مورفولوژی سلول‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

جهت تعیین میزان هموگلوبین، شمارش گلبول‌های قرمز، سفید و پلاکت‌های خون محیطی از دستگاه شمارش‌گر سلولی مدل Sysmex K-۱۰۰۰ موجود در آزمایشگاه خون‌شناسی بیمارستان شریعتی استفاده شد بدین ترتیب که ۱۰۰λ خون محیطی داخل دستگاه تزریق می‌شد و نتایج به صورت دیجیتالی ثبت می‌گردید.

ـ آزمایش‌های NBT(Nitro Blue Tetrazolium) برانگیخته شده: در این بخش هدف، بررسی عمل‌کرد نوتروفیل‌ها بوده است. برای این منظور ۰/۲ میلی‌لیتر از خون کامل حاوی ضد انعقاد خوب مخلوط شده با ۰/۱ میلی‌لیتر از محلول NBT ۰/۲٪ و ۰/۱ میلی‌لیتر PMA(Phorbol Miristate Acetate) مخلوط گردید و به مدت ۲۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. پس از گذشت این مدت، گسترش خونی تهیه و با متانول ثابت شد.

لام‌های تهیه شده ابتدا با بزرگ‌نمایی کوچک در متراکم‌ترین قسمت گلبول‌های سفید بررسی شدند سپس با بزرگ‌نمایی ۱۰۰X حداقل ۱۰۰ نوتروفیل که حاوی رسوبات سیاه فورمازان(رنگ NBT احیا شده) بود، ثبت شد(۹).

ـ رنگ‌آمیزی گلبول‌های سفید خون محیطی به روش ایمونوفلئورسانس: جهت بررسی تعداد نوتروفیل‌ها از ۳ شاخص CD٤٥(شاخص لکوسیتی)، CD١٥(شاخص گرانولوسیتی) و CD١٦(شاخص نوتروفیلی) استفاده شد(۱۲-۱۰). این مرحله به منظور آماده کردن نمونه‌های خونی جهت تزریق به فلوسایتومتر صورت گرفت.

مراحل انجام شده برای نشان‌دار کردن گلبول‌های سفید خون محیطی در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

جدول شماره ۱- مراحل آماده سازی نمونه‌های خون محیطی جهت تزریق به فلوسایتومتر

ماده	لوله A	لوله B	لوله C
Neg.Control IgG(R), IgM(F)	۱۰ λ		
Anti CD ٤٥ (R)		۱۰ λ	
Anti CD ۱۵ (F)		۱۰ λ	۱۰ λ
Anti CD ۱٦ (R)			۱۰ λ
Whole Blood	۱۰۰ λ	۱۰۰ λ	۱۰۰ λ
۳۰ دقیقه انکوباسیون در ٤ درجه سانتیگراد			
Immuno Prep A	۰/۷ml	۰/۷ml	۰/۷ml
	مخلوط		
Immuno Prep B	۰/۳۲Ml	۰/۳۲ml	۰/۳۲ml
	مخلوط		
Immuno Prep C	۰/۱٤Ml	۰/۱٤ml	۰/۱٤ml
	مخلوط		

نتایج

میانگین نتایج حاصل از آزمایش‌های CBC در ٤ گروه مورد مطالعه در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.

این میانگین بیان‌گر افزایش معنی‌دار تعداد گلبول‌های سفید در گروه شدید نسبت به گروه شاهد می‌باشد.

میانگین درصد شاخص‌های CD٤٥ و CD۱۵/CD۱٦ در ۲ حالت Gated(جمعیت لنفوسیتی)، Ungated(جمعیت لکوسیتی) در ٤ گروه خفیف، متوسط، شدید و طبیعی در جدول شماره ۳ نشان داده شده است. هیچ گونه تفاوت معنی‌داری در تعداد سلول‌های مورد بحث در بین ۲ گروه بیمار و شاهد و هم‌چنین به صورت درون گروهی در بیماران مشاهده نشد. جهت نشان دادن میزان فعالیت سلول‌های نوتروفیل از آزمایش کیفی NBT برانگیخته شده استفاده گردید. جدول شماره ٤، نتایج حاصل از درصد نوتروفیل‌های NBT مثبت در جمعیت سلول‌های سفید خون محیطی در ٤ گروه تحت مطالعه را نشان می‌دهد.

هیچ تفاوت معنی‌داری بین عمل‌کرد نوتروفیل‌ها در بین گروه‌های بیمار و شاهد دیده نشد و عمل‌کرد نوتروفیل‌ها طبیعی بود.

جدول شماره ۲- نتایج حاصل از آزمایش‌های CBC در گروه‌های مورد مطالعه

گروه	تعداد WBC میلیون/میلی‌متر مکعب	تعداد RBC میلیون/میلی‌متر مکعب	تعداد پلاکت هزار/میلی‌متر مکعب	میزان هموگلوبین گرم/دسی‌لیتر
گروه شاهد	٦۲۰۰ ± ۳۱۰	۵/۰۱ ± ۰/۳	۲۳۸/۷ ± ۱۱/۹٤	۱۵/٤٦ ± ۰/۸
گروه خفیف	۷۳۲٤ ± ۳٦٦/۲	۵/۱۲ ± ۰/۳	۲٤۱/٦۸ ± ۱۲/۱	۱۵/۵۵ ± ۰/۸
گروه متوسط	۷۸۷۲ ± ۳۹۳/٦	٤/۹٦ ± ۰/۲	۲۲۲/۳۲ ± ۱۱/۱	۱۵/۱۵ ± ۰/۸
گروه شدید	۸٦۰۸ ± ٤۳۰/٤	۵/۰۸ ± ۰/۳	۲۳۲/۷٦ ± ۱۱/٦	۱۵/۰۲ ± ۰/۸

جدول شماره ۳- میانگین درصد شاخص‌های CD٤٥ و CD۱۵/۱٦ در گروه‌های مورد مطالعه

گروه	CD٤٥		CD۱۵/CD۱٦	
	جمعیت لنفوسیتی	جمعیت لکوسیتی	جمعیت لنفوسیتی	جمعیت لکوسیتی
گروه شاهد	-	۹۸/۳۳ ± ۲/۰۱	۹٤/۹۳ ± ۰/۸٦	٤۳/۷۲ ± ۷/۳۸
گروه خفیف	-	۹۹/۰۰ ± ۱/۰۰	۹۲/۵۸ ± ۳/٦۹	۵۱/٤۱ ± ۱۱/۹٤
گروه متوسط	-	۹۸/۸٦ ± ۱/٤٦	۹۱/٦۸ ± ۵/۳۰	٤٤/٦۸ ± ۱۵/۵۹
گروه شدید	-	۹۹/٤۰ ± ۰/٦۱	۸۸/۷۲ ± ۱۰/۵۳	۵۲/۰۰ ± ۱۹/۵۷

جدول شماره ۴- میانگین درصد سلول‌های نوتروفیل NBT مثبت در گروه‌های مورد مطالعه

گروه‌های مورد مطالعه	میانگین درصد نوتروفیل‌های NBT مثبت
گروه شاهد	۸۸/۳۰ ± ٤/۵۸
گروه خفیف	۸۵/۵٦ ± ۷/۱۵
گروه متوسط	۸٦/۲۰ ± ٦/۷۷
گروه شدید	۸۹/۵۲ ± ۵/۱٦

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

بحث

تولید سولفور موستارد یا گاز خردل گوگردی، یکی از دست‌آوردهای دانش بشری است که متأسفانه به علت سمیت و خاصیت مرگ‌زایی در حملات نظامی و جنگ‌های بین‌المللی، بارها مورد استفاده قرار گرفته است.

یکی از اثرات مخرب و سوء این سم کشنده، اختلال در عمل‌کرد سیستم ایمنی، بروز بیماری‌های نقص ایمنی ثانویه و نیز بروز بدخیمی‌ها می‌باشد.

در تحقیق حاضر هدف بررسی اثرات دیررس گاز خردل روی تعداد و عمل‌کرد نوتروفیل‌ها بود. عملیات آماری توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد که پس از مثبت شدن هموژنیسیتی واریانس بین گروه‌ها برای آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA جهت بررسی متغیرها استفاده گردید. در موارد دیگر آزمون غیرپارامتری کروسکال ـ والیس به کار گرفته شد.

در صورت معنی‌دار بودن نتایج، آزمون شفه(Scheffe) برای تعیین گروه یا گروه‌هایی که سبب ایجاد این تفاوت معنی‌دار در گروه‌ها می‌شدند مورد استفاده قرار می‌گرفت. عدم مشاهده اختلاف معنی‌دار در نتایج آماری حاصل از بررسی میانگین تعداد پلاکت، گلبول‌های قرمز و میزان هموگلوبین خون محیطی بین گروه بیماران و افراد طبیعی طی آزمایش‌های CBC(Complete Blood Count)، نشان دهنده حذف اثر موتاژنیک خردل بر اجزای نام برده از سیستم خون ساز می‌باشد.

وجود ائوزینوفیلی در تعدادی از بیماران گروه شدید که البته معنی‌دار هم نبود، در برگیرنده مورد خاصی نمی‌باشد. درمطالعات کوتاه مدت و مطالعات با مدت متوسط روی بیمارانی که در معرض گاز خردل قرار داشتند، گزارش‌هایی مبنی بر وجود شکل‌های نابالغ میلوییید وجود دارد اما در مطالعه حاضر که اثرات دراز مدت گاز خردل بر مصدومان شیمیایی بررسی شده است، چنین شکل‌هایی در حد قابل توجهی مشاهده نشد(۱۳).

نوتروفیل‌های رسیده(Mature) با داشتن فنوتیپ سطحی CD۱۶/CD۱۵/CD۴۵ از سایر سلول‌های موجود در گردش خون قابل تشخیص می‌باشند. سلول‌های بالغ موجود در درون یا بیرون رگ‌های خونی آماده هستند که در صورت القا به جایگاه عفونت، التهاب، نکروز یا آلرژی مهاجرت نمایند(۱۱و ۱۴).

وجود گرانولوسیت بیش از حد طبیعی در تعداد قابل توجهی از بیماران(۵۰/۶٪) ممکن است به دلیل پاسخ التهابی سیستم ایمنی نسبت به آزردگی‌های بافتی(Tissue injury) باشد که در این بیماران، به خصوص در بافت ریه و پوست وجود دارد یا به علت وجود عفونت‌هایی باشد که به طور مکرر در این بیماران رخ می‌دهد.

گرانولوسیت پایین‌تر از حد طبیعی در ۶/۷٪ از کل این بیماران وجود داشت.

در پاسخ به این سؤال که آیا این کمبود گرانولوسیت را می‌توان به اثر خردل نسبت داد یا خیر، تردید وجود دارد. زیرا این دسته از بیماران تعداد بسیار کمی را تشکیل می‌دادند و در افراد گروه شاهد نیز که در معرض خردل قرار نگرفته بودند این کاهش ممکن است رخ دهد. هم‌چنین عوامل عفونی متعددی وجود دارند که قادرند تعداد گرانولوسیت‌ها را کاهش دهند.

وجود ۶/۷٪ نوتروفیل کم‌تر از حد طبیعی در جمعیت گرانولوسیتی از نظر تئوری نشان دهنده وجود گرانولوسیت‌های غیر از نوتروفیل شامل بازوفیل و ائوزینوفیل می‌باشد.

از آن جا که آنتی‌بادی مونوکلونال مورد استفاده بر ضد CD۱۶ در این مطالعه علاوه بر نوتروفیل و NK cell با بازوفیل‌ها نیز واکنش می‌دهد بنابراین آن دسته از سلول‌های موجود در جمعیت گرانولوسیتی یعنی سلول‌های با فنوتیپ CD۱۵/CD۱۶ ممکن است ائوزینوفیل‌هایی باشند که احتمالاً در گروه بیماران، بیش از حد طبیعی بوده و در نتیجه از تعداد سلول‌های $CD۱۵^{+}/CD۱۶^{+}$ کاسته است.

در ۴۹/۳٪ از کل بیماران که نوتروفیل بیش از حد طبیعی در جمعیت گرانولوسیتی داشتند نیز ممکن است این حالت پاسخی از سوی سیستم ایمنی به التهاب و عفونت باشد زیرا یکی از مشکلات عزیزان جانباز در رابطه با اثرات

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

دیررس خردل گوگردی ابتلا بـه عفونت‌هـای فرصت‌طلـب و مکرر می‌باشد.

در بررسی عمل‌کرد نوتروفیل‌ها بـاید بـه ۲ نکتـه اشـاره کـرد کـه یکـی از آن‌هـا آزمـایش احیـای NBT اسـت. ایـن آزمایش با وجود گزارش‌های فراوان مبنی بر نتایج مثبـت و منفی کـاذب در آن، از سـوی سـازمان بهداشـت جـهانی بـه عنوان آزمون غربال‌گری در افرادی کـه بـا هـر نـوع عـامل سمی برای سیستم ایمنی(Immunotoxic) مواجه می‌شوند، قابل استفاده است(۱۵).

نکته دیگر ایـن کـه نتایج حـاصل از آزمـایش NBT در ایـن تحقیـق بـا مطالعـات کوتـاه مـدت و بـا مـدت متوسط روی بیماران شیمیایـی شده بـا خـردل هم‌خوانـی دارد(۵، ٦و ۷).

به عنوان یک نتیجه‌گیری کلـی می‌تـوان گفت کـه وجـود لکوسـیتوز در مصدومـان شـیمیایی ممکـن اسـت بـه علـت عفونت‌های مزمن و تکرار شونده بیماران ایجـاد شـود. ایـن عفونت‌ها به خصوص در بافت ریه فراوان و معمول بـوده و گزارش‌های قبلی وجود عوارض دیررس گاز خردل بر ریـه، مـانند برونشـیت مزمـن، آسـم برونشـیک، آمفـیزم و ... را نشان داده‌اند و مطالعه حاضر نیز گزارش‌های قبلی را تـأیید نموده است(۱٦).

ایـن مطالعـه نشـان داد کـه اثـرات دیـررس گـاز خـردل(۱۰ سـال پـس از مصدومیـت) بـر سـلامت نوتروفیل‌هـا چـه از نظـر کیفـی در فعالیـت انفجـار تنفسـی و چـه از نظـر کمـی در تعـداد آن‌هـا تأثیـری ندارد.

با وجـود ایـن، بیمـاران مـورد مطالعـه و بسـیاری از افـراد کـه در معـرض گـاز خـردل قـرار گرفته‌انـد بـا مشکلات متعـدد و پیش‌رونـده دسـت به گریبان هستنـد و سیسـتم ایمنـی بـه طـور مسلـم دارای اختـلال می‌باشـد.

با توجه به نتایج حاصل از ایـن تحقیـق، بـاید اختـلال در سیستم ایمنی اختصاصی را توسط بررسـی سـالیانه مـورد بحث، جستجو کرد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمام همکارانی که در اجـرای ایـن تحقیـق کمک و یاری نموده‌اند به ویژه همکـار محـترم خـانم هـایده صمیم در بخـش پزشـکی هسـته‌ای بیمارسـتان شـریعتی و خانم نوذری در بخش عفونی بیمارسـتان ساسـان تشـکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

۱- مرزبان‌راد ـ سعید. درمان مجروحین شیمیایی، چـاپ اول، تهران، واحـد انتشـارات بخـش فرهنگـی دفـتر مرکـزی جهاد سازندگی، ۱۳٦۸، صفحه ۳۵.

2- Somani SM. Chemical warfare agents, 1st ed, USA, Copyright by Academic Press, 1992, PP: 27-31.

۳- آذرنیا ـ مهناز. اثرات گاز خردل بر سیستم خونسـاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تـهران، ۱۳٦٦، صفحه: ٤.

4- Griswold JA. White Blood cells, response to burse injury, semin Nephro, 1993, 13(4): 1843-72.

۵- بهار ـ کمال، دیهیمی ـ ایرج، الیاسی ـ حسین. بررسـی اجزاء سیسـتم ایمنـی در مصدومیـن شـیمیایی بـا سـولفور موستارد، اولین کنگره بین‌المللی گازهای شیمیایی جنگی در ایران، مقاله شماره ۱۲، مشهد، خرداد ۱۳٦۷، صفحه:۷۱-٦۳.

٦- کیـهانی ـ عبدالحسـین. بررسـی ایمنـی سـلولی در مجروحین ایرانی آلوده بـه خـردل، اولیـن کنگـره بین‌المللـی پزشکی گازهای شیمیایی جنگی در ایران، مقاله شـماره ٦۰، مشهد، خرداد ۱۳٦۷، صفحه: ۳۳٤-۳۲٦.

۷- زندیه ـ طاهره. تغییرات ایمونولوژیـک در مجروحیـن شیمیایی، مجموعه مقالات اولین کنگره بیوشـیمی جمـهوری

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

اسلامی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انستیتو پاستور، چاپ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه: ۱۳۷-۱۳۱.

8- Emad Ali., Rezaian Gh R. Immunoglobulins and cellular constituents of the BAL fluid of patients with sulfur mustard gas induced pulmonary fibrosis, Chest, 1999, 115: 1346-1351.

9- Segal AW. Nitroblue Tetrazolium test, Lancet, 1974, 23: 1252-74.

10- Edberg JC., Redecha PB., Salmon JE., Kimberly RP. Human FcγRIII(CD16) isoforms with distinct allelic expression, Extracellular domains and membrane linkage on PMN and NK cells, J. Immunol, 1989, 143: 1642-9.

11- Miller LE., Peacock JE. Manual of laboratory Immunology, Second Edition, Philadelphia, Lea & Feliger, 1991, PP: 232.

12- Ueda E., Kinoshita T., Nojima J., Inoue K., Kitani T. Different membrane anchors of FcγRIII(CD16) on K/NK Lymphocytes and neutrophils, J. Immunol, 1989, 143: 1274-77.

۱۳- فرهودی ـ محمود، طبرستانی ـ مجتبی، بلالی ـ مهدی. اختلالات سلولی srem cell و پری‌کورسورهای اریتروبید در سه شهید مسموم با گاز خردل، اولین کنگره بین‌المللی پزشکی گازهای شیمیایی جنگی در ایران، مشهد. خرداد ۱۳٦۷، مقاله شماره ۱۰، صفحه: ۲۲-۱۷.

14- Coulter. Human Leukocyte differentiation Antigans, 6th ed, HLDA Workshop, Kobe, 1996, PP: 1-2.

15- World Hygiene Organization, Principles and Methods for assessing direct immunotoxicity associated with exposure to chemicals, IPCS.(International Programme on Chemical Safety), Marcel Dekker, Geneva, 1996, PP: 226-44.

۱٦- سهراب‌پور ـ حمید، مسعود ـ احمد، فرهودی ـ محمود، ابراهیمی‌فرد ـ محمدرضا. بررسی عوامل سیستم ایمنی هومورال در ۱۷۹ تن از جانبازان شیمیایی که بیش از ۳ سال از مصدومیت آنها گذشته است و مقایسه با گروه شاهد، سمینار اثرات جنگ‌های شیمیایی بیولوژیک بر انسان، محیط و جامعه، دانشکده فنی دانشگاه تهران، آذر ۱۳۷۱، صفحات ٥٥-٤٠.

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

Study of the Effects of Chemical Warfare(Mostly Sulfur Mustard) on Neutrophils in Chemical Injuries Ten Years After Exposed War

E. Hooshiar, Ph.D.[I] ***Z. Mohammad Hassan, Ph.D.***[II]
A. Salek Moghadam, MD, Ph.D.[III] ****Z. Shaker, MSc***[IV] ***M. Ebtekar, Ph.D.***[V]

Abstract

The incidence of recurrent infections in chemical injuries made us guess that phagocytic system of these patients has been disordered. On the other hand, deficiency of phagocytic function in scalds has been proved and superficial burns seen in these subjects also encouraged us to study the condition of their neutrophils. Neutrophils are one of the main members of natural immunity and have an important role in host's defense especially against bacterial infections. In this study, 75 chemical weapon victims of the war between Iran and Iraq were divided into three groups of 25 depending on the severity of the complications(mild, moderate and severe). In addition, 10 subjects who were not exposed to sulfur mustard were considered as the control group. 5ml of peripheral blood was collected from 85 subjects and analysed for complete blood count, cell morphology and flow cytometry. Cell morphology was analysed by blood smear preparation and light microscopic examination under 100X objective. Blood parameters including WBC, RBC, platelet counts and hemoglobin concentration were calculated using Sysmex K-1000. Besides, blood cells were analysed for CD45, CD15 and CD16 cell markers and the neutrophils were regarded as $CD45^+/CD15^+/CD16^+$. The reduction of NBT and converting of clear and soluble nitrotetrazolium blue(NBT) to insoluble and precipitated furmazane in cell was regarded as function of neutrophils. Statistical analysis of data was performed using analysis of variance(ANOVA), and Scheffe test. There weren't any significant differences in percentage and absolute numbers of expression of $CD45^+/CD15^+$ and $CD45^+/CD15^+/CD16^+$ cells and mean of NBT percentage in patient and normal groups.

Key Words: 1) Sulfur Mustard 2) Chemical victims 3) Neutrophils

[Downloaded from rjms.iums.ac.ir on 2026-11-21]

This article is a summary of the thesis by E. Hooshiar, Ph.D. for the degree of Ph.D. in Laboratory Sciences under supervision of Z. Mohammad Hassan, Ph.D. and consultation with A. Salek Moghadam, MD, Ph.D., 1997.

I) *Ph.D. in Laboratory Sciences.*
II) *Professor of Immunology. Tarbiat Modarress University, Tehran, Iran.*
III) *Professor of Immunology. Iran University of Medical Sciences and Healh Services. Tehran, Iran.*
IV) *MSc in Immunology. Instructor of Artesh University of Medical Sciences and Healh Services, North Kargar Ave., Tehran, Iran(*Corresponding Author).*
V) *Associate Professor of Immunology, Tarbiat Modarress University, Tehran, Iran.*