

# اثرات ریفامپین و کلوگزاسیلین بر روی حاملین بینی استافیلوکوک طلائی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

## چکیده

به منظور مقایسه بین ترکیب ریفامپین و کلوگزاسیلین و هر یک از دو دارو به تنهایی در درمان حالت ناقل بینی استافیلوکوک طلائی مطالعه حاضر بصورت کارآزمایی بالینی دو سوکور کاملاً اتفاقی بر روی ۴۵ نفر از کارکنان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) که ناقل بینی استافیلوکوک طلائی بوده‌اند انجام شده است. ۴۵ نفر بصورت اتفاقی به ۳ گروه ۱۵ نفره تقسیم شدند در یک گروه ترکیب ریفامپین و کلوگزاسیلین، در گروه دیگر ریفامپین و دارونمای کلوگزاسیلین و در گروه سوم کلوگزاسیلین و دارونمای ریفامپین بکار برده شد، مدت مصرف داروها ۴ روز بود.

در بررسی نتایج، ۷ نفر بدلائل متعدد در انتهای تحقیق از مطالعه خارج شدند و از ۳۸ نفر باقیمانده، ۳ هفته پس از اتمام مصرف داروها نمونه‌گیری بعمل آمد که در گروه اول از ۱۴ نفر تمام افراد کشت منفی داشتند (۱۰۰ درصد) در گروه دوم از ۱۴ نفر، ۱۰ نفر کشت منفی داشتند (۷۱ درصد) و در گروه سوم از ۱۰ نفر، ۵ نفر کشت منفی داشتند (۵۰ درصد) برای وجود اختلاف بین سه گروه از تست *Kruskal-wallis* استفاده شد که  $P < 0.017$  بدست آمد. در مقایسه بین گروهها از تست *Mann-whitney* استفاده شد که برای اختلاف گروه اول و دوم (۲۹ درصد)  $P < 0.033$  و اختلاف گروه اول و سوم (۵۰ درصد)  $P < 0.0036$  و اختلاف گروه دوم و سوم (۲۱ درصد)  $P < 0.29$  بدست آمد.

ترکیب ریفامپین و کلوگزاسیلین برای مدت ۴ روز یک ترکیب مناسب برای از بین بردن حالت ناقل استافیلوکوک طلائی می‌باشد و این ترکیب نسبت به تجویز هر یک از دو دارو به تنهایی اثر بیشتری دارد ولی نتایج حاصله اجازه مقایسه بین ریفامپین و کلوگزاسیلین هر کدام به تنهایی را نمی‌دهد.

۲- ناقلین بینی

۴- ریفامپین

کلید واژه‌ها: ۱- استافیلوکوک طلائی

۳- کلوگزاسیلین

دکتر سیدجمال‌الدین سجادی\*

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی\*\*

دکتر کاوه اسدی\*\*\*

## مقدمه

استافیلوکوکهای مقاوم به پنی‌سیلینهای نیمه صناعی برای اولین بار در سال ۱۹۶۱ در انگلستان گزارش شدند.<sup>(۱)</sup> امروزه

سوسپانسیونهای کمی از استافیلوکوک طلائی حساس به پنی‌سیلین می‌باشد. (حدود ۱۵-۱۰ درصد) و به همین جهت

\* دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

\*\* استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

\*\*\* پزشک عمومی

بهبتری وجود داشت. (۱۵) البته امروزه پماد آنتی‌بیوتیک جدیدی بنام *Mupirocin* ساخته شده‌است که در درمان حاملین استافیلوکوک بسیار موفق بوده‌است. (۱۷، ۱۶، ۵) درمانهای سیستمیک متعددی برای از بین بردن حالت ناقل نیز مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. (۳۲، ۳۱) ریفامپین ممکن است اثرات قابل توجهی در از بین بردن استافیلوکوکهای موجود در بینی داشته باشد. (۲۱) بیشتر گونه‌های استافیلوکوک طلائی به غلظتهای پائین ریفامپین حساس می‌باشند. (۳۳) این دارو به خوبی به داخل ترشحات بینی و حلق نفوذ می‌کند. (۱۲) و به نظر می‌رسد گسترش گونه‌های مقاوم به ریفامپین کم باشد. (۲۱) وقتی که به تنهایی بکار رود مقاومت زودرس ایجاد می‌شود، به این دلیل اهمیت دارد که این دارو را همیشه با یک داروی ضد استافیلوکوک دیگر بکار ببریم. (۲۰)

این تحقیق به منظور بررسی چند ترکیب دارویی در درمان حالت ناقل بینی استافیلوکوک طلائی انجام شده‌است. برای این منظور داروی ریفامپین بعنوان یکی از ترکیبهای دارویی که اثربخشی آن در این موضوع مشخص شده‌است استفاده گردید. (۲۷، ۲۰) و برای جلوگیری از ایجاد مقاومت از یک داروی ضد استافیلوکوک دیگر یعنی کلوگزاسیلین استفاده شد. در این تحقیق از ترکیب ریفامپین با کلوگزاسیلین استفاده شد و این ترکیب با هر یک از این داروها به تنهایی نیز مقایسه شد. البته در مطالعه مشابه که توسط *Wheat* و همکاران در سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۳ انجام شده‌است ترکیب ریفامپین و کلوگزاسیلین بعنوان بهترین ترکیب شناخته شده‌است. (۲۷، ۲۶)

### روش بررسی

بدنبال انجام یک مطالعه توصیفی برای تعیین فراوانی حاملین بینی و حلق استافیلوکوک طلائی در ۳ بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران افرادی که حاملین بینی استافیلوکوک طلائی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شناخته شدند برای انجام این طرح تحقیقاتی در نظر گرفته شدند. تعداد این افراد ۶۶ نفر بودند. نمونه‌گیری بصورت آسان (*Convenient*) صورت گرفت.

از ۶۶ نفری که برای این مطالعه در نظر گرفته شده بودند

برای درمان عفونت این پاتوژن از یک آنتی‌بیوتیک که مقاوم به بتا - لاکتاماز باشد بایستی استفاده کرد در بیمارانی که به پنی سیلین حساس هستند می‌توان از وانکومايسين يا اريترومايسين استفاده کرد. وقتی که پنی‌سیلینهای مقاوم به پنی‌سیلیناز متی‌سیلین، نفسیلین و کلوگزاسیلین، و همچنین سفالوسپورینها در سال ۱۹۶۰ کشف شدند، این تصور پیش آمد که استافیلوکوک مقاوم به آنتی‌بیوتیک مسئله‌ای حل شده‌است. ولی امروزه موارد استافیلوکوک طلائی مقاوم به این آنتی‌بیوتیکها در حال افزایش است. کوتریموکسازول نیز دارای یک طیف گسترده بر ضد استافیلوکوک طلائی بوده و در برابر پنی‌سیلیناز مقاوم می‌باشد. در مورد آمینوگلیکوزیدها که فعالیت مناسبی بر ضد استافیلوکوک دارند و می‌توانند به همراه آنتی‌بیوتیکهای دیگر بر ضد دیواره سلول بکار روند هنوز توافق وجود ندارد. اگر بخواهیم موارد مقاوم بتا - لاکتاماز را درمان کنیم در ابتدا از وانکومايسين استفاده می‌کنیم. یکی دیگر از داروهای مورد استفاده در این زمینه ریفامپین است. در مواردی که هیچ داروی دیگری حساس نباشد می‌توان از کلرامفنیکل و یا تتراسیکلین استفاده کرد که بر بعضی از سوشهای مقاوم مؤثرند. (۲۰) قسمت قدامی بینی محل ذخیره استافیلوکوک طلائی می‌باشد و پخش این ارگانيسم توسط ناقلین، یک عامل عمده در گسترش بیماریهای ناشی از این ارگانيسم می‌باشد. (۲۸، ۲۱، ۳۰) استافیلوکوکها عامل بیش از ۸۰ درصد بیماریهای عفونی در برخوردهای روزمره پزشکی می‌باشد. (۲۹) بیماران غیر ناقل در هنگام ورود به بیمارستان ممکن است توسط پرسنل آلوده شوند. (۱۳) درمانهای متعدد موضعی و خوراکی برای کاهش حالت ناقل مورد آزمون قرار گرفته‌اند. (۲۵، ۱۱، ۷) ابتدا درمانهای موضعی پیشنهاد شده است. (۲) ولی عمدتاً نتایج مطلوبی دیده نمی‌شود. (۱۶) با اینکه در دو مطالعه در دهه ۱۹۵۰ گفته شده بود که پماد *Bacitracin* می‌تواند در کنترل حالت ناقل مؤثر باشد. (۲۴، ۱۹) و بعضی دیگر از مطالعات نیز چنین توصیه‌ای می‌کردند (۲۳، ۲۲، ۱۸) ولی سئوالات بسیاری در مورد اثربخش بودن پماد *Bacitracin* و حتی دیگر پمادهای موضعی وجود دارد. (۳۰، ۱۲، ۴۸) در یک مطالعه *Bacitracin* به همراه ریفامپین بکاررفته که اثرات

زیاد نبود و بعلت اینکه اگر بنا بود از تست کای دو  $\chi^2$  برای آنالیز استفاده شود، تعداد فراوانیهای مورد انتظار (*expected frequencies*) در بیش از ۵۰ درصد از خانه‌ها کمتر از ۵ بود، لذا بعلت عدم وجود پیش فرض مورد نظر استفاده از این تست میسر نشد و بجای آن از تست غیر پارامتری *Kruskal-wallis* که برای موارد مشابه تصحیح شده بود (*Corrected for ties*) و برای پیدا کردن تفاوت معنی دار از تست *Wilcoxon Rank sum test (Mann-whitney Utest)* برای مقایسه دو گروه استفاده شد. آنالیز مورد نظر توسط نرم افزار *SPSS for windows version 5* انجام گردید.

### نتایج

از ۴۵ نفری که وارد مطالعه شده بودند ۳۸ نفر مطالعه را بطور کامل به پایان رساندند، یک نفر بعلت ایجاد راش از مصرف دارو خودداری کرده بود و دو نفر بعلت تغییر رنگ ادرار با وجود توضیح قبلی از مصرف داروها خودداری کرده بودند و ۳ نفر نیز به گفته خودشان دارو را مصرف نکرده بودند و یک نفر با مصرف داروهای خانگی خود و بیش از حد تعیین شده از مطالعه خارج شد. به غیر از موارد ذکر شده در بالا و ایجاد تغییر رنگ ادرار در ۲ نفر دیگر عارضه دیگری رخ نداده بود. در گروه اول که داروی ریفامپین و کلوزاسیلین مصرف می‌کردند ۱۴ نفر قرار داشتند که هر ۱۴ نفر دارای کشت منفی بودند و ۱۰۰ درصد پاسخ به دارو داده بودند در گروه دوم که ریفامپین و دارونمای کلوزاسیلین مصرف می‌کردند ۱۴ نفر قرار داشتند که از این عده ۱۰ نفر پاسخ داده بودند تا کشت آنها منفی شود یعنی ۷۱/۵۶ درصد پاسخ به دارو داده بودند. در گروه سوم که دارونمای ریفامپین و کلوزاسیلین را مصرف کرده بودند ۱۰ نفر قرار داشتند که ۵ نفر دارای کشت منفی بودند و ۵۰ درصد پاسخ به دارو داده بودند. نتایج در نمودار ۱ و جدول ۱ آمده است.


بعلت عدم رضایت عده‌ای و باردار بودن چند تن از نمونه‌ها تعداد افراد مورد مطالعه به ۴۵ نفر تقلیل پیدا کرد. این مطالعه بصورت یک کارآزمایی بالینی دوسوکور (*Double Blind*) کاملاً اتفاقی (*Randomized*) انجام شد و طی آن ۴۵ نفر حاملین بینی استافیلوکوک طلائی به سه گروه تقسیم شدند که مبنای این تقسیم‌بندی *Randomization* بود. گروه اول داروی ریفامپین و کلوزاسیلین را دریافت می‌کردند. گروه دوم از داروی ریفامپین و دارونمای کلوزاسیلین استفاده کردند و گروه سوم داروی کلوزاسیلین و دارونمای ریفامپین دریافت می‌کردند، داروی کلوزاسیلین بصورت کپسول ۳۰۰ میلی‌گرمی، ۲ کپسول در روز به مدت ۴ روز مصرف شد و داروی کلوزاسیلین بصورت کپسول ۵۰۰ میلی‌گرمی ۴ کپسول در روز به مدت ۴ روز مورد استفاده قرار گرفت. دارونما بصورت یک پودر سفید رنگ بدون اثر فارماکولوژیکی بود که در داخل کپسولهای ریفامپین و کلوزاسیلین قرار داده شده بود.

افراد مورد آزمون به مدت ۴ روز داروها را مورد استفاده قرار دادند ۳ هفته بعد از اتمام مصرف داروها از ناحیه قدامی بینی با *swab* نمونه گرفته شد و نمونه‌های مورد نظر بر روی محیط *Mannitol-Salt-Agar* انتقال یافته و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار گرفتند. قبل از این مدت آن محیط‌هایی که در آن کلونی استاف رشد کرده بودند، جدا شدند و آزمایش *Coagulase* بر روی آنها انجام شد تا بدین ترتیب مورد استفاده استافیلوکوک طلائی جدا شوند سپس این کلونی‌ها بر روی محیط کشت *Muller - Hinton* انتقال یافتند و دیسکهای آنتی‌بیوتیکی *Vancomycin*، ریفامپین و کلوزاسیلین در محیط کشت قرار گرفتند و سپس هاله دیسکها بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری شد. (جدول شماره ۲)

در بررسی آماری از آنجا که تعداد حجم نمونه‌ها چندان

جدول ۱- جواب کشت و درصد پاسخ مثبت به دارو در هر یک از سه گروه

ترکیب دارویی	تعداد نمونه‌ها	کشت منفی	کشت مثبت	درصد پاسخ مثبت به دارو
<i>Rifampin + Cloxacillin</i>	۱۴	۱۴	-	۱۰۰
<i>Rifampin + Placebo</i>	۱۴	۱۰	۴	۷۱/۵۶
<i>Cloxacillin + Placebo</i>	۱۰	۵	۵	۵۰



نمودار شماره ۱

جدول ۲- نتایج حاصل از آنتی‌بیوگرام در ۹ مورد کشت مثبت بر حسب قطر هاله دیسک

Vancomycin	Cloxacillin	Rifampin	
۱۳	۲۳	۲۷	گروه سوم
۱۵	۱۴	۲۳	
۱۴	۲۱	۳۳	
۱۳	۲۳	۳۰	
۱۴	۲۵	۲۹	
۱۳/۸	۲۱/۵	۲۸/۶	میانگین
۱۴	۱۶	۲۷	گروه دوم
۱۳	۲۲	۲۲	
۱۵	۲۵	۳۰	
۱۵	۲۳	۳۳	
۱۴/۲۵	۲۱/۵	۲۸	میانگین

بحث

با توجه به نتیجه تست  $Kruskal-wallis$  ( $P < 0.017$ ) می‌توان نتیجه گرفت که حداقل یکی از گروه‌های ۳ گانه با

نتیجه تست  $Kruskal-wallis$  ( $P < 0.0017$ ) بود و نتایج تست  $Mann-whitney$  برای گروه اول و دوم ( $P < 0.033$ ) گروه اول و سوم ( $P < 0.0036$ ) و گروه دوم و سوم ( $P < 0.29$ ) بود.

فرضیه صفر نیز با اشکال مواجه می‌شود و بدین ترتیب در این قسمت یک *inconclusive clinical trial* حاصل می‌شود یعنی در مورد تفاوت و عدم تفاوت ریفامپین و کلوگزاسیلین نمی‌توان اظهار نظر کرد لذا ترکیب ریفامپین و کلوگزاسیلین ترکیب مناسبی برای از بین بردن حالت ناقل در کوتاه مدت می‌باشد. البته بایستی توجه داشت که نتایج این مطالعه در دراز مدت و مثبت شدن مجدد افرادی که بهبود یافته‌اند نامشخص است. هرچند که مطالعات مشابه در سایر کشورها بررسی مجدد ناقلی در مدت طولانی‌تر را توصیه و پیگیری نموده‌اند بنابراین در صورت بروز حالت ناقلی در پرسنل بیمارستان توصیه این تحقیق استفاده از ترکیب ۲ دارو می‌باشد.

حداقل یک گروه دیگر اختلاف معنی‌داری دارد. با توجه به نتایج تست *Marnn-whitney* متوجه می‌شویم که اختلاف بین گروه اول و گروه دوم یعنی ( $P < 33\%$ ) و همچنین در مقایسه گروه اول و سوم اختلاف  $50\%$  ( $100-50$ ) با وجود ( $P < 0.0036$ ) و در سطح مناسب از نظر آماری معنادار می‌باشد که نشان‌دهنده اثربخشی بیشتر ترکیب دو داروی ریفامپین و کلوگزاسیلین نسبت به هر یک از داروهای مورد نظر می‌باشند. در مقایسه گروه دوم و سوم اختلاف  $21\%$  ( $76-50$ ) با توجه به ( $P < 0.29$ ) نمی‌تواند از نظر آماری معنی‌دار باشد که بین ترتیب فرضیه صفر عدم تفاوت بین ریفامپین و کلوگزاسیلین به تنهایی، رد نمی‌شود و از طرف دیگر با توجه به حجم نمونه پائین و کم بودن قدرت تست، قبول

## References

- 1) Babrber, M; *Methicillin-risistant-staphylococci*; *J.clin. Pathol* 1961,14; 385-393
- 2) Bartzokas, C.A et al.; *Control & Eredication of methicillin resistant staphylococcus aureus on a surgical unit*.*N.Engl J. Med*, 1984, 311;4422-1425
- 3) Brentsen, L.A, and W. me Dermptt; *Increased transmissability of staphylococci to patients receiving an antimicrobial drug*; *N. Engl. J. Med*. 1960, 292; 771-784
- 4) Bryan et al; *Topical antibiotic ointments for, staphylococcal nasal carriers survey of curred patients and comparison of bacitracin and veramycin ointment*; *Infection control*; 1980, 1: 153-156
- 5) Cadeweu. Mw , *Elimination of nasal carriage of S. aureus with chem*. 1986, 17: 365-372
- 6) Cadeweu, MW. *Mupirocins; A promicing new antimicrobial agent*, of *Antivicrob. chem other*, 1987, 1-5
- 7) Chow JW, YU, VL; *Staphylococcus aures nasalcarriage in hemodialysis patients, its role in infection and approaches to prophylaxis*, *Arch In Med*, 1989, 149: 1258-62
- 8) Craver D. et al; *A large outbreak of infection caused by a strain of staphylococcus aureus resistant to aminoglycosides*; *A JM*; 1981, 71: 53-85
- 9) Doebbleing BN; *Elimination of staphylococcus aureus nasal carriage in health care workers analysis of six clinical trials with caleium moprococin ointment*, *Clin. Infec Dis J* , 174: 466-474
- 10) Ehrerkrana N.J.; *Person to person tramsmission of staphylococcus aureus*; *N.Engl. J. Med*; 1964, 271: 225-230
- 11) Gould. J. C. *The effect of local antibiotic on nasal carriage of staphylococcus pyogens*; *J Hyg* 1955, 953: 379-385
- 12) Hoepeicl, P.D. *Prediction of antjmening-ococcic chemoprophylactic* *J. Infect*. 1971, 123: 12-133
- 13) Lidweudm, Polakoff S, Jeuns MP, et al; *Nasal a quistion of staphlycoccus aureus in a subdivided &*

- Mechanically ventilated ward J Hyg 1970, 68: 417-433*
- 14) Loksley. R.M et al. Multiply antibiotic resistant staphylococcs aureus introduction, transmission and evaluation of nosocomial infection; *Ann Internal, Med*; 1982, 97: 3173
- 15) Me Arelly; Effect of rifampin and bacitracin in nasal carriers of staphylococcus aureus; *Antimicrob Agents and chemother* 1984, 25: 422-429
- 16) Pearnang J. W, et al; Control of methicillin resistant staphylococcus aureus in a metropolitan eaching hospital; *Med. J. Aust*, 1985; 142: 103-108
- 17) Reaar D; Elimination of coincident staphylococcus nasal and hand carriage with intranasal application of mupirocin caleium ointment; *Ann Intern Med*; 1991 144: 101-106
- 18) Report of the comittee on infectious diseases 19 th ed 1928 P: 241 American Academy of peditrics, Evanston Ill
- 19) Rountree, RM et al, Control of staphylococcal infection of the of the newborn by the treatment of nasal carriage of the staff.; *med, J. Austy* 1; 1956, 825-832
- 20) Sheagren J.; *Staphylococcus aureus*. *New Engl J Med*. 1989, 310: 1437-1442
- 21) Sanade M.A, and marden B.L; Effect of rifampin on nasal carriage of staphylococcs aureus; *Actimicrob. Agerts Chemother*, 1975, 7: 294-297
- 22) Stamm, W.E et al, Selected infections of skin and eye. *Hospital infections*, 1979, 355-380
- 23) Swell, cm et al. *Staphyloccocal nasal carriage, and subsequent infection in peritoneal dialysis patients, JAMA*; 1982; 248-1495
- 24) Wein stein , H . ; Control of nasal staphylococcal-carrier states. *N. Engel. J.Med*; 1959, 260: 1308-1310
- 25) Wheat Ig, et al, Prevention of infections of skin structures *A J M*, 1984, 79; 187-190
- 26) Whear, L.J; Long term studies of the effect of rifampin on nasal carriage of cogulase-positive staphylococi, *Rev-Infec-Dis suppl*, 1983, 35: 459-462
- 27) Wheat, H,J. Effect of rifampin on nasal carriers of coagulase positive staphylococci, *J.Inf. Did*; 1981, 144:177
- 28) Williams R.E. O; Healthy carriage of staphylococcus aureus its prevalence. & importance; *Bacteriol. Rev*. 1963; 27; 56-71
- 29) willet, H.P. *Staphylococcus*, 1980, P: 532-552: *In zinsser microbiology*
- 30) Williams S.J.D et al; Trials of five antibacterial creams in the control of nasal carriage of staphylococcus aureus. *Lancet* 1967, 309-392
- 31) Wilson, S,Z et al, In vivo effects of gentamycin, erythromycin, and placebo therapy on nasal carriage of staphylococcus aureus; *Amomicrob. Agents. chemother*, 1977, 11: 407
- 32) Wilson, S.Z. In vivo effects of erythromycin, cultures from carriers of staphylococcs aureus, oral therapy with erythromycin, rosamycin, and placebo; *Antimicrob*. 1979, 15: 379-383
- 33) Za K, C et al, Sensitivity of staphylococcus aureus to 30 antibiotics, *Chemotherapy*, 1969, 14: 7-22

---

**EFFECT OF RIFAMPIN AND CLOXACILLINE ON  
STAPH. AUREUS NASAL CARRIERS IN HAZRAT-E RASOOL  
TEACHING HOSPITAL**

*S.J. Sadjadi, M.D.\**

*S.K. Soltani Arabshahi, M.D.\*\**

*K.Asadi, M.D\*\*\**

**ABSTRACT**

45 health personnels who were nasal carriers of staph aureus entered in this trial, seven subjects were omitted for various reasons, remainders randomly divided to 3 groups and were treated orally for 4 days.

- group I with rifampin & cloxacilline
- group II with rifampin & placebo
- group III with cloxacilline & placebo

All subjects were recultured 3 weeks after the completion of treatment. In group I, all 14 subjects were culture negative (100% cure), in group II 10 out of 14 were culture negative (71% cure) and, in group III 5 out of 10 (50%), were cultur negative.

K.K statistical analysis method gave a  $P < 0.017$ .

For comparison of three groups mamm-whitny test was used that yeilded following results:

- difference between group I & II ( $P < 0.033$ ) 29%
- difference between group I & III ( $P < 0.036$ ) 50%
- difference between group II & III ( $P < 0.29$ ) 29%

In conclusion, oral use of rifampin and cloxacilline for four days is a suitable combination for treatment of staph aureus carriers.

\*(comparision between the use of rifampin and cloxacillin alone was not possible due to low number of subjects)

**Key Words: 1) Staph aurues**

**2) Nasal carriers**

**3) Cloxacillin**

**4) Rifampin**

---

\* Associate professor of Medicine, Iran University of Medical Sciences and Health Services

\*\* Assistant Professor of Medicine, Iran University of Medical Sciences and Health Services

\*\*\* General Physician