

# بررسی اثر هورمونهای جنسی آندوژن بر حساسیت به درد در موشهای صحرائی ماده

چکیده

دکتر حمیدرضا صادقی پور رودسری\*

علیرضا کرد\*\*

به منظور نشان دادن اثر هورمونهای جنسی در تنظیم ترشح اوپیوئیدهای آندوژن و بتا آندورفینها مطالعه حاضر صورت گرفته است. در این بررسی در مراحل مختلف سیکل استروس با استفاده از تست فرمالین و تست صفحه داغ (Hot plate) زمان پاسخ به درد مورد سنجش قرار گرفت. همچنین با برداشت تخدانها که منجر به افزایش قابل ملاحظه LH می‌گردد نقش این هورمون نیز بر روی درد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در تست درد حاد و مزمن در مرحله مت استروس میزان پاسخ به درد از بقیه مراحل سیکل کمتر و در مرحله پرواستروس بیشتر بوده بطوری که زمان لیسیدن در تست فرمالین و در مرحله استروس  $15/84 \pm 0/35$  ثانیه در مرحله اول و  $45/32 \pm 0/35$  ثانیه در مرحله دوم ( $P < 0.001$ ), در حالی که در پرواستروس این زمان در مرحله اول  $2/60 \pm 0/75$  ثانیه و در مرحله دوم  $45/32 \pm 0/35$  ثانیه شد. ضمناً پس از برداشت تخدانها با گذشت زمان پاسخ به محرك دردزا نیز شدیدتر گردید ( $P < 0.001$ ).

۲- درد

کلید واژه‌ها: ۱- هورمونهای جنسی آندوژن

۴- تست فرمالین

۳- سیکل استروس

## مقدمه

برای پی بردن به نقش هورمونهای جنسی در پاسخ به درد، مدل حیوانی رایج متکی به حذف غدد جنسی و سپس تزریق هورمونهای مربوطه می‌باشد که عملاً تنظیم غلظت فیزیولوژیک این هورمونهای غیرممکن است. در این پژوهش مدل حیوانی جدیدی را معرفی می‌کنیم که نه تنها تخدانها حذف نشند بلکه با انجام آزمایش در مراحل مختلف سیکل استروس به نقش فیزیولوژیک تعدادی از هورمونهای جنسی در پاسخ به درد پی می‌بریم. استروس در لغت به معنی هیجان و التهاب شدید بویژه از نظر جنسی است و این دوره را بعلت التهاب شدید جنسی در زمان تخمک‌گذاری که بطور طبیعی

در مراحل مختلف سیکل جنسی ترشح اوپیوئیدهای آندوژن و پاسخ به درد تغییر می‌یابد. درد نوعی حس ناخوشایند است که در غالب موارد زیان‌آور بوده و با آسیب بافتی همراه می‌باشد. از لحاظ مکانیسم ایجاد درد را به دو دسته تقسیم می‌کنند: ۱- درد حاد، سریع یا درد سوزنی که در مدت یک دهم ثانیه بعد از وارد آمدن یک محرك دردزا بوجود می‌آید. ۲- درد آهسته یا درد سوزشی که یک ثانیه یا بیشتر بعد از وارد آمدن یک محرك دردزا شروع شده و سپس شدت آن به آهستگی در طی ثانیه‌ها و یا حتی دقیقه‌ها افزایش می‌یابد و معمولاً با انهدام بافت همراه است.

\* دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

\*\* کارشناس ارشد فیزیولوژی

آنها که وزنشان ثابت مانده و یا کاهش وزن داشته‌اند حذف نمودیم. سپس موش‌ها را به دو دسته کلی تقسیم کردیم: الف - موشهایی که تخدمان آنها را خارج نموده بودیم (Ovariectomy) که پس از ۲۰، ۱۰، ۳۰ روز آزمایشات مربوطه را انجام دادیم (هر گروه ۷ عدد).

ب: موشهای این گروه به عنوان شاهد بوده و ماده‌ای به آنها تزریق نکردیم. از این موشها ابتدا اسمیرواژن تهیه تا مراحل مختلف سیکل استتروس را مشخص نمائیم سپس آنها را در هر مرحله از سیکل به گروههای ۷ تائی تقسیم نمودیم. قابل ذکر است که فقط از موشهایی استفاده کردیم که حداقل سه دوره متوالی سیکل را بطور منظم طی کرده‌بودند.

تهیه اسمیرواژن: این عمل برای تشخیص مراحل مختلف سیکل استتروس بکار می‌رود در این روش به کمک قطره چکان سرم فیزیولوژی را در واژن موش بالغ تخلیه نموده و با مکش مجدد محتويات واژن و سلولهای مخاطی را بر روی لام قرار دادیم تا با استفاده از میکروسکوپ و مشاهده سلولها، مرحله سیکل را مشخص کنیم.

حذف تخدانها (Ovariectomy): موشهای دسته الف را با اتر بیهوش نموده سپس حیوان را به پهلو خواباندیم. موهای محل جراحی تراشیده و پس از ضد عفونی محل (زیر آخرین دنده بفاصله  $1/5\text{ cm}$  از ستون مهره‌ها) و ایجاد شکافی کمتر از یک سانتیمتر با استفاده از پنس، پوست ناحیه جراحی را بلند نموده با کمک قیچی پوست را از غلاف و عضلات دیواره شکم و صفاق جدا نمودیم. پس از آن تخدان را خارج کرده و رگهای خونی تخدان بوسیله نخ مسدود شد تا پس از برداشت تخدان خونریزی رخ ندهد. آنگاه محل شکاف با گراف فلزی بسته شد.

تست فرمالین (Formalin-test): در این تست حیوان در جایگاه مخصوص که شامل یک چهارپایه آلومینیومی که روی آن صفحه شیشه‌ای قرار دارد مستقر می‌شود بر روی صفحه شیشه‌ای قیفی با دهانه گشاد قرار می‌گیرد، در زیر صفحه شیشه‌ای، آئینه‌ای با زاویه  $45^\circ$  قرار گرفته است که مشاهدات را آسانتر می‌کند. قبل از هر آزمایش حیوان مدتی زیر قیف قرار

تنها زمانی است که میل جنسی حیوان ماده برانگیخته می‌شود، دوره استتروس (Estrous cycle) نامیده‌اند،<sup>(۳)</sup> که حدوداً ۴-۵ روز طول می‌کشد و شامل مراحل زیر است:

۱- پرواستتروس (Proestrous): مدت آن ۱۲-۱۷ ساعت می‌باشد<sup>(۴)</sup> در ابتدای صبح یعنی زمان انجام تجربیات غلظت هورمونهای LH و FSH بسیار پائین بوده و تغییرات معنی‌داری را نشان نمی‌دهد. در این مرحله از سیکل میزان استروژن بالا و غلظت پروژسترون پائین می‌باشد.<sup>(۱۲)</sup> همچنین در دوره سیکل استتروس آنکفالین‌ها، بتاندوورفین‌ها و سایر پیتیدهای اوپیوئیدی نیز دچار تغییراتی در هیپوتالاموس میانی قاعده‌ای و هیپوفیز می‌شود.<sup>(۱۲)</sup>

۲- استتروس (Estrous): در این مرحله در صبح زود غلظت پروژسترون پائین می‌باشد. استروژن تا حدودی افزایش غلظت نشان می‌دهد اما نسبت به مرحله پرواستتروس پائین‌تر است.<sup>(۱۲)</sup>


۳- متاستتروس (Metestrous): در این مرحله پروژسترون دارای حداکثر میزان ترشح در صبح می‌باشد و در همین زمان استروژن دارای غلظت پائینی است.

۴- دیاستتروس (Diestrous): غلظت هورمون پروژسترون پائین می‌باشد و در همین زمان استروژن غلظت بالاتی دارد. لازم به تذکر است که در زمان فوق غلظت پلاسمائی استروژن کمتر از مرحله پرواستتروس و غلظت پروژسترون بیشتر می‌باشد.<sup>(۱۲)</sup>

## روش بررسی

گروههای تجربی: موشهای صحرائی ماده از نژاد Ratus-Ratus با سن تقریبی ۳۰ روز و وزن متوسط ۷۵ گرم از انتستیو پاستور ایران خریداری و در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده پزشکی تهران تحت شرایط ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی در دمای  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  نگهداری نمودیم تا به وزن مناسب بیش از  $160$  گرم برسد. در شرایط فوق موش‌ها به سن بلوغ رسیده و به شرایط آزمایشگاه نیز سازش حاصل نمودند و در این مدت یک روز در میان وزن حیوانات کنترل شده و


در موشهای فاقد تخدمان (OVX) میزان حساسیت به درد (بصورت لیسیدن) در مرحله اول بیشتر از مرحله دوم می‌شود هرچه از مدت زمان حذف تخدمان می‌گذرد حساسیت نسبت به درد در هر دو مرحله افزایش می‌یابد. همانطور که در نمودار شماره یک مشخص است در هر دو مرحله باگذشت زمان پاسخ به درد افزایش می‌یابد ( $P<0.001$ ).



نمودار ۱- مدت زمان پاسخ به درد (عمل لیسیدن) در موشهای فاقد تخدمان (تست فرمالین - مراحل یک و دو)

$$n = 8 \text{ Mean} \pm \text{SEM} \quad *** \quad (P<0.001)$$

الف - ۲: تست صفحه داغ (Hot plate test): این آزمون نشان می‌دهد که هرچه زمان حذف تخدمانها بیشتر می‌شود تحمل نسبت به حرارت صفحه داغ کاهش می‌یابد یا بعبارتی زمان تأخیر در پاسخ به درد (Response latency) (Response latency) کمتر خواهد بود (نمودار شماره ۲).



نمودار ۲- مدت زمان تأخیر در پاسخ به درد پس از حذف تخدمانها (تست صفحه داغ در زمانهای مختلف)

$$n = 8 \text{ Mean} \pm \text{SEM} \quad *** \quad (P<0.001)$$

می‌گیزد، سپس محلول تزریقی فرمالین ۵ درصد به مقدار ۱۰۰ میکرولیتر به عنوان عامل ایجادکننده درد بکار می‌رود که توسط سرنگ انسولین به طریق زیرجلدی به کف پای راست حیوان تزریق می‌گردد بلا فاصله پس از تزریق، پاسخ به درد در محدوده زمانی ۴۰ دقیقه ثبت می‌شود. پاسخ عبارت از مجموع زمانهایی که بصورت لیسیدن، گازگرفتن پای تزریق شده و یا پریدن است. تست فرمالین دارای دو مرحله می‌باشد از ۵-۰ دقیقه مرحله اول که بیانگر درد حاد و از دقیقه ۱۵-۴۰ که نشان‌دهنده درد مزمن است که آن را مرحله دوم می‌گویند. در این دو دوره مدت زمانی که حیوان عمل لیسیدن پا را انجام می‌داد ثبت می‌گردید (۱۲).

تست صفحه داغ (Hot-plate-test): این تست نیز مانند تست فرمالین باید در محیطی کاملاً آرام صورت گیرد، موش‌ها را بر روی یک صفحه داغ که به طور الکتریکی دمای آن کنترل می‌شود قرار دادیم. دمای مناسب جهت انجام تست صفحه داغ  $55\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  می‌باشد همزمان با قراردادن موش بر روی صفحه در پوش شیشه‌ای را برروی آن قرار داده و با استفاده از کرونومتر زمان تأخیر در اولین پاسخ آنها که بصورت لیسیدن پاها، پرش یا کوبیدن سریع پاها می‌باشد ثبت گردید (۲).

تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه و تحلیل آماری با کمک کامپیوتر و نرم‌افزار SPSS صورت گرفت و جهت آزمون فرضیه‌ها ملاک‌های  $\chi^2$  و  $T$ -Test و روش Anova مورد استفاده قرار گرفت.

## نتایج


نتایج بدست آمده از تجربیات را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

**الف - اثر حذف تخدمان بر روی درد در موش صحرائی ماده** (تست فرمالین و تست صفحه داغ):

این تجربیات بر روی موش‌های دسته الف صورت گرفته است.

**الف - ۱- تست فرمالین (Formalin test)**

در لیسیدن پنجه‌های پا در مرحله پرواستروس و دی استروس بسیار پائین و در مرحله متاستروس بسیار بالاست. نتایج منطبق بر همان نتایج حاصله از تست فرمالین است. بنابراین در هر دو تست به ترتیب میزان پاسخ به درد در  $P < E < D$  می‌باشد (نمودار شماره ۴).



نمودار ۴- مدت زمان تأخیر در پاسخ به درد در مراحل مختلف سیکل استروس (تست صفحه داغ)

(n= ۸ Mean ± SEM \*\*\* P<0.001)


### بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به مطالعات انجام شده مشخص گردیده است که در زمان پرواستروس هورمون استروژن بالا بوده و در مرحله متاستروس به حداقل میزان در طی سیکل استروس خواهد رسید در حالی که در این مرحله غلظت پروژسترون بالاتر از سایر مراحل می‌باشد.<sup>(۱۱، ۱۲)</sup> با توجه به زمان انجام آزمایش که در اوایل ساعات صبح انجام گردید به ترتیب در مراحل مت استروس، استروس و دی استروس تحمل به درد نسبت به پرواستروس بالا می‌باشد. بنابراین می‌توان به نقش فیزیولوژیک استروژنهای مترشحه از تخدانها در افزایش پاسخ به درد و اهمیت ترشح فیزیولوژیک پروژسترون در کاهش پاسخ به درد پی برد.

در مورد موشهایی که تخدانهای آنها خارج شده بود LH (OVX) با توجه به فیدبک منفی ایجاد شده غلظت FSH و LH افزایش می‌یابد ولی با درنظر گرفتن نیمه عمر این دو هورمون غلظت LH در پلاسمای سه برابر FSH می‌باشد بنابراین هرچه از زمان برداشت تخدانها می‌گذرد تحمل به درد نیز کمتر خواهد شد. چون LH می‌تواند منجر به افزایش پروستاگلاندین‌ها گردد

ب - اثر هورمونهای جنسی فیزیولوژیک (درونز) بر روی درد در موش صحرائی ماده:

ب-۱- تست فرمالین: تجربیات بر روی موش‌های دسته ب انجام گردید این مقایسه بین مراحل مختلف سیکل استروس صورت گرفت مقایسه زمان لیسیدن بر حسب ثانیه در مراحل مختلف سیکل نشان داد که در مرحله پرواستروس از همه بیشتر (۷۵±۰/۶۰ ثانیه در مرحله اول و ۹۵±۰/۲۱ در مرحله دوم) و در مرحله متاستروس (۳۵±۰/۸۴ ثانیه) در مرحله اول و ۳۵±۰/۴۵ ثانیه در مرحله دوم) از بقیه مراحل پائینتر می‌باشد یا به عبارتی تحمل نسبت به درد در مرحله پرواستروس از همه کمتر و در مرحله مت استروس از بقیه بیشتر می‌باشد. بعد از مرحله پرواستروس به ترتیب مراحل دی استروس و استروس بالاترین میزان شدت درد را نشان دادند. همانطور که در نمودار شماره ۳ مشخص می‌باشد در مرحله پرواستروس شدت میزان درد در مرحله دوم بیشتر از مرحله اول و در بقیه مراحل سیکل، میزان شدت درد در فاز اول بیشتر از فاز دوم است. آنالیزهای آماری نشان می‌دهد که زمان مرحله اول در مراحل مختلف سیکل با یکدیگر بطور معنی دار تفاوت دارند (P<0.001).



نمودار ۳- مدت زمان پاسخ به درد (عمل لیسیدن) در مراحل مختلف سیکل استروس (تست فرمالین - مراحل یک و دو)

کلیه مراحل در هر دو دوره با P<0.001  
پرواستروس با دی استروس در مرحله اول با Mean ± SEM (n= ۸ P<0.01)

ب - ۲: تست صفحه داغ (Hot plate): مقایسه میزان درد حاد بین مراحل مختلف سیکل استروس نتایج نشان می‌دهد که تأخیر

استروس و نقش این ترکیبات در تنظیم ترشح اوپیوئیدهای آندوژن و تنظیم بتا - آندورفینها<sup>(۹)</sup> بر آن شدید تا اثر این هورمونها را در پاسخ به درد مورد بررسی قرار دهیم.

در تجربیات انجام شده مشخص شد که درد حاد و مزمن در مرحله پرواستروس و دی استروس بسیار شدید بوده که می توان آن را به بالابودن میزان استروژن و پائین بودن غلظت پروژسترون در این مراحل نسبت داد و از طرفی در متاستروس غلظت بالای پروژسترون منجر به کاهش پاسخ به درد می گردد، زیرا استروژن می تواند غلظت بتا آندروفین را در هیپوتالاموس مoshهای فاقد تخدمان کاهش دهد.<sup>(۱۰)</sup>

استرادیول غلظت بتا آندروفین را در تalamوس، آمیگدال و مغز میانی نیز کاهش می دهد زیرا استروژن فعالیت ژنومیک بر روی سیستم اوپیوئیدی در مغز دارد بطوری که سبب افزایش فعالیت آنزیم RNA پلی مراز و سنتز پروتئین ها در هیپوتالاموس می شود. همچنین استروژن از طریق باند شدن با گیرندهای اوپیوئیدی در مغز قادر به تعدیل اثرات اوپیوئیدی است این احتمال وجود دارد که اثر استرادیول بر روی بتا - آندروفین هیپوتالاموس از طریق دوپامین میانجیگری شود.<sup>(۱۰)</sup> از طرفی اوپیوئیدها نقش فیزیولوژیکی مهمی را در سیکل قاعدگی بازی می کنند. در تحت شرایط فیزیولوژیک تغییری در فعالیت سیستم اوپیوئیدی در مراحل مختلف سیکل جنسی و در طی یائسگی مشاهده می شود، بطوری که بیشترین فعالیت اوپیوئیدی در فاز لوتل و کمترین آن در زمان قاعدگی دیده می شود. این امر نشان می دهد که اوپیوئیدها در مکانیسم تخدمک گذاری دخالت دارند. همچنین مهار ترشح گنادوتروپین ها در زنان در هنگام مصرف قرص های ضد بارداری ممکن است با افزایش فعالیت اوپیوئیدها، و یا در زنان یائسه افزایش ترشح گنادوتروپین ها با کاهش فعالیت اوپیوئیدی همراه باشد، تمامی این نتایج بیانگر آن است که هورمون پروژسترون که میزان آن در فاز لوتل و نیز بهنگام استفاده از قرص های ضدحملگی افزایش می یابد سبب بالارفتمن مقدار بتا آندروفین هیپوتالاموس و در نتیجه کاهش میزان درد می شود.<sup>(۱۱)</sup>

و یکی از عوامل ایجادکننده درد پروستاگلاندین و هیپرآلثزیای ناشی از آن می باشد.<sup>(۱۵)</sup> علت این امر را می توان به افزایش LH نسبت داد. قابل ذکر است که تزریق پوستی PGE<sub>2</sub> منجر به افزایش هیپرآلثزیا می گردد که بوسیله گیرنده مهار می شود. شواهدی در دست است که نشان می دهد التهاب حاصل از هیپرآلثزیا نه تنها مستقیماً با تأثیر بر روی ترمینالهای منحيطی اعصاب آوران، درد ایجاد می کند بلکه بطور غیرمستقیم نیز بوسیله تحریک نورونهای پس گانگلیونی سمپاتیک بعلت آزادسازی موادی که می توانند بر روی فیبرهای آوران اثر نمایند بر تحمل به درد تأثیر می گذارد. ثابت شده که تولید پروستاگلاندین بوسیله برادی کینین بوده و توسط یک G پروتئین تحریکی (Gs) تنظیم می شود که فسفولیپاز A<sub>2</sub> را جهت آزادسازی اسید آراشیدونیک فعال می کند.<sup>(۱۵)</sup>

بررسی ها و تجربیات ما نشان داد که هرچه از زمان برداشتن تخدمانها می گذرد شدت درد در تست درد حاد و مزمن افزایش می یابد. یکی از عوامل دخیل در این امر ترشح بالای LH در حیوانات بدون تخدمان می باشد زیرا بین میزان ترشح و اوپیوئیدهاو LH ارتباط وجود دارد. ترشح هورمونهای هیپوفیزی نظیر گنادوتروپین ها از طریق تحریک هیپوتالاموس و نیز از طریق نوروترانسمیتر کلاسیک مانند نوراپسی نفرین، دوپامین، سروتونین و سایر پپتیدها تنظیم می گردد.<sup>(۷)</sup> ضمناً سیستم اوپیوئیدی واقع شده در هیپوتالاموس در بروز اثرات مهاری یا تحریکی ناشی از استروئیدهای جنسی در ترشح LH دخیل است. مشخص گردیده است که در بعداز ظهر روز پرواستروس کاهش چشمگیر غلظت متانکفالین سبب ترشح بالای LH می گردد.<sup>(۱۶)</sup> بنابراین می توان گفت اوپیوئیدهای درون زا سبب برقراری ترشح نرمال هورمونهای محور هیپوتالاموس - هیپوفیز و تخدمانها می گردد. نتیجه آنکه کاهش اوپیوئید توأم با افزایش LH در نهایت با افزایش حساسیت به درد همراه است.<sup>(۲)</sup> این تجربیات نشان می دهد که LH می تواند در روند ایجاد دردهای مختلف در خانم های یائسه نقش داشته باشد.

**با توجه به تغییرات میزان هورمونهای جنسی در سیکل**

## References

- 1) Butcher. R.L and Fugo.N.W; plasma concentration of LH, FSH, prolactin, progesteron and estradiol- 17-B throughout 4-day estrous cycle of the rat; *Endocrinology* 1974, 94(6) PP: 1704-8
- 2) Carler. Richard.B; Differentiating analgesic and non-analgesic drug activities on rat hot plate; pain, 1991, 47; PP: 211-20
- 3) Ganong william F: *Review of Medical physiology*; 16 ed, Appleton and lange 1993; PP: 398-399
- 4) Guasti.A. Fernandez and pieozo, O; Changes in Burying behavior during the estrous cycle. *Psychoneuro endocrinology* 1992; 17(6); PP: 681-9
- 5) Jing-Ying in and JENN-TSER PAN; Effects of endogenous opioid peptides and their analogs on the Activities of hypothalamic arcuate neurons in brain slices from diestrous and ovariectomized rats; *Brain research bultein*; 1995 (36,3) PP: 225-233
- 6) Kimura, fukuko and Jinnai, Kayako; Bicacaline in fusions advance the timing of LH surge an proestrus rats, comparison with naloxane effects; *Hormones and Behavior* 1994; 28: 424-30
- 7) Kumar; M.S.A and chen; Changes in the pituitary Hypothalamic of met-enkephalin during the estrous cycle of rat; *life scince*; 1979(25) PP: 1687-1696
- 8) Maggi-R;Modulation of binding characteristic of hypothalamic  $\mu$ -opioid receptor in rats by gonadal steroide; *Steroid-Bioche-biol-1991* (40) 113-21
- 9) Ratka, A. and simpkins. J.W; Effect of estradiol and progesterone on the sensitivity to pain and morphine induce antinociception in female rats; *Hormone and Behav* 1991 (45) 217-27

---

# EVALUATION OF ENDOGENOUS SEXUAL HORMONES EFFECTS ON PAIN PERCEPTION IN FEMALE RATS

*H.R. Sadeghipour Roudsari, Ph.D.\* A.R. Kord, MSC. \*\**

## ABSTRACT

*In this research the effect of endogenous sexual hormones on pain perception during the estrus cycle in female rats has been evaluated, different stages of estrus cycle has been determined by vaginal smears, and the rate of pain responses and susceptibility tests has been determined with formalin and hot plate tests.*

*In this regard, the increase and decrease of response to pain is an indication of female sexual hormones activity. Meantime, with the help of ovariectomy we succeeded to increase the rate of LH notably, and as a result, we could succeed in evaluation of LH effect on pain response too. Our results showed that, in respect to female sexual hormones activity the acute and chronic pain decreased during the metestrus cycle and increased in proestrus stage. (Licking time in formalin test during the stage of estrus were  $15.74 \pm 0.35$  seconds in the first step and  $75.32 \pm 0.35$  seconds in the subsequent step, ( $P < 0.001$ ). Meanwhile these values were  $60.75 \pm 0.2$  and  $45.32 \pm 0.35$  seconds respectively during the proestrus. We could state that as far as the ovariectomy lasts longer, the responses to pain producing factors intensifies.*

**Key Words:** 1) Pain                                    2) Endogenous sexual hormones  
    4) Rat  
    3) Estrus cycle

---

\* Faculty Member of Tehran University of Medical Sciences and Health Services

\*\* Master of Science in Physiology