

فارنژیت استرپتوکوکی در کودکان (بررسی ۱۰۰ مورد)

چکیده

به منظور بررسی میزان فارنژیت استرپتوکوکی در گلودردهای کودکان و همچنین یافتن رابطه‌ای بین علائم بالینی و نتایج کشته گلو یک مطالعه آینده‌نگر بر روی کودکان در سن ۵ تا ۱۵ سال که با شکایت گلودرد به درمانگاه اطفال مراجعه می‌کردند صورت گرفت. این مطالعه به مدت یکسال و از تاریخ اول مهر ۱۳۷۱ تا ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ بطول انجامید. از مجموع ۴۴۳ کودک با شکایت گلودرد ۱۰۰ نفر (۲۲/۵ درصد) دارای کشته مثبت گلو از نظر استرپتوکوک بتاهمولی‌تیک گروه A شدند. ۵۳ درصد از بیماران پسر و ۴۷ درصد دختر بودند. سن متوسط بیماران ۸/۸ سال بود. شایع‌ترین علائم بالینی به ترتیب عبارت بودند از: قرمزی گلو ۹۹ درصد، شیوع ناگهانی ۸۶ درصد، تب ۸۴ درصد، اگزودای روی لوزه‌ها ۶۹ درصد، حساسیت و درناکی غدد لنفاوی قدامی گردن ۳۰ درصد و علائم گوارشی همراه ۲۲ درصد. شیوع فصلی بیماری به ترتیب زیر بود: بهار ۳۵ درصد، زمستان ۳۴ درصد، پائیز ۲۸ درصد و تابستان ۳ درصد. ۵۳ درصد از بیماران دارای ۵ علامت بودند، وجود ۵ علامت گلودرد + تب + شروع ناگهانی + قرمزی گلو + اگزودا در غیاب علائم ویرال دارای حساسیت ۵۷ درصد، اختصاصیت ۹۸ درصد، ارزش پیش‌بینی کننده مثبت ۸۹ درصد، ارزش پیش‌بینی کننده منفی ۸۹ درصد و کارآئی ۸۹ درصد می‌باشد. این مطالعه نشان داد که در صورت فقدان امکانات آزمایشگاهی با دقت به علائم بالینی می‌توان به تشخیص نسبتاً صحیح و دقیقی از فارنژیت استرپتوکوکی رسید.

۳- گلودرد

۲- کشته گلو

کلید واژه‌ها: ۱- فارنژیت استرپتوکوکی

مقدمه

فارنژیت حاد به همه عفونت‌های حاد حلق شامل عفونت و التهاب لوزه‌ها (Tonsilitis) و فارنگوتانسیلیت اطلاق می‌شود. وجود یا عدم وجود لوزه‌ها تأثیری بر تعداد دفعات عفونت، حساسیت به عفونت، سیر و عوارض بیماری ندارد. فارنژیت حاد اعم از تبدار یا بدون تب معمولاً به علت ویروس است، (۷۰ درصد موارد) و استرپتوکوک بتاهمولی‌تیک گروه A تنها عامل باکتریال شایع می‌باشد. در بیمارانی که در شرایط اسپورادیک و آندمیک فارنژیت دارند در هردو گروه A کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استرپتوکوک گروه A

عفونت‌های تنفسی فوقانی عفونت‌هایی هستند که ساختمان‌های دستگاه تنفسی را در بالاتر از حد حنجره گرفتار کرده و از علل شایع مراجعه کودکان به درمانگاه‌های اطفال می‌باشند. قسمت اعظم عفونت‌های تنفسی فوقانی به استثناء اپی‌گلوتیت توسط ویروس‌های مانند پارا‌آنفلوانزا، آنفلوانزا، آدنو‌ویروس‌ها، رینو‌ویروس‌ها، RSV و کوکساکی A و B ایجاد می‌شود. با ریشه‌کن شدن دیفتری توسط واکسیناسیون، استرپتوکوک بتاهمولی‌تیک گروه A تنها عامل باکتریال عفونت‌های ناحیه حلق محسوب می‌شود.

* دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، فوق تخصص قلب کودکان

** کارشناس میکروب شناسی، مرکز پزشکی آبت‌ا... طالقانی

*** مدیر خدمات پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

علامت تشخیصی ولی نادر فارنژیت استرپتوکوکی محسوب می‌گردد.

تشخیص قطعی فارنژیت استرپتوکوکی با کشتن گلو داده می‌شود که کلندی‌های میکروب در محیط آگارخون دار و در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد حاوی ۵ درصد گاز CO_2 بعد از ۲۴ ساعت رشد می‌کند. روش‌های تشخیص آزمایشگاهی سریع بصورت جستجوی آنتی‌ژن استرپتوکوک از طریق آگلوبینیاسیون روی اسالاید نیز وجود دارد که دارای حساسیت ۹۰٪ تا ۹۰ درصد و اختصاصیت (Sensitivity) ۷۰٪ تا ۱۰۰ درصد می‌باشد که در صورت مثبت بودن می‌توان اقدام به درمان بیمار نمود و در صورت منفی بودن باید بوسیله کشت تأیید شود.^(۱) تست‌های جستجوی سریع آنتی‌ژن استرپتوکوک گران بوده و دسترسی به آنها مشکل است. اهمیت تشخیص و درمان صحیح فارنژیت استرپتوکوکی در پیش‌گیری از تب روماتیسمی است که مهم‌ترین عامل بیماریهای اکتسابی قلب در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در کشور ما که تب روماتیسمی و تظاهرات قلبی آن شایع بوده و امکانات تشخیص آزمایشگاهی فارنژیت استرپتوکوکی در اکثر نقاط شهری و روستائی آن وجود ندارد، دقت به علائم کلاسیک بالینی که قبل‌اً ذکر گردید می‌تواند راهنمای تشخیصی خوبی برای اقدام به درمان با بنزاتین پنی‌سیلین تزریقی باشد. مطالعه زیر به منظور بررسی میزان شیوع فارنژیت استرپتوکوکی و همچنین نحوه ظاهر شدن تظاهرات بالینی آن در اجتماع ما صورت گرفته است.

روش بررسی

این مطالعه بصورت آینده‌نگر (Prospective) و در طول مدت یکسال (مهرماه سال ۱۳۷۱ لغایت شهریورماه ۱۳۷۲) بر روی کودکان ۵ تا ۱۵ ساله که با شکایت گلودرد به درمانگاه اطفال بیمارستان آیت‌الله طالقانی و درمانگاه طالقانی وابسته به بهداری استان تهران (واقع در میدان تجریش) در شیفت کاری صبح مراجعه می‌نمودند صورت گرفت. نمونه‌گیری توسط کارورزان بخش اطفال انجام می‌گرفت. برای کلیه کارورزان همکار طرح یک جلسه یک ساعته ابتدا بصورت تئوری علائم عفونت‌های تنفسی فوقانی و فارنژیت

۳۰ درصد موارد فارنژیت کودکان را تشکیل می‌دهد.^(۲) دوره کمون بیماری چند ساعت تا ۳ یا ۴ روز است. شدت بیماری بسیار متغیر است و از عفونت ساب کلینیکال یا بدون علامت ۱۳ موارد^(۳) تا فرم توکسیک شدید (۱۰ درصد موارد) دیده شده است. شروع بیماری معمولاً حاد است و با گلودرد، سردرد، تب و دردشکم (بخصوص در کودکان) همراه است. حلق و لوزه‌ها ملتهب و قرمز بوده و در ۵۰ تا ۸۰ درصد موارد دارای اگزودا هستند که معمولاً در روز دوم بیماری دیده می‌شود. تورم و حساسیت غدد لنفاوی گردن در ۳۰ تا ۶۰ درصد بیماران دیده می‌شود. علائم بالینی بیماری ظرف ۳ تا ۵ روز فروکش می‌کند مگر آنکه عوارض چرکی شدید مانند آبسه‌های اطراف حلق یا پشت حلق ایجاد شود. دو عارضه غیرعفونی یا غیرچرکی مهم آن یکی نفریت حاد است که ۱۰ روز بعد از بیماری ظاهر می‌شود و دیگری تب روماتیسمی است که پس از یک دوره کمون ۱۸ روزه ظاهر می‌کند و شایع‌ترین علت بیماری‌های اکتسابی دریچه‌ای قلب در کشورهای جهان سوم می‌باشد.^(۴)

پژشک می‌تواند عفونت استرپتوکوکی گلو را بصورت بالینی در ۵۵ تا ۷۰ درصد موارد تشخیص دهد. مشکل عدمه، تشخیص افتراقی عفونت استرپتوکوکی خفیف از عفونت ویروسی مجاری تنفسی فوقانی است. تصویر کلاسیک یک فارنژیت استرپتوکوکی حاد براساس معیارهای اپیدمیولوژیکی و بالینی به شرح زیر است:

۱- شروع ناگهانی

۲- سن ۵ تا ۱۵ سال (عمدها ۱۱ تا ۱۵ سال)

۳- مراجعه در اوخر زمستان و اوایل بهار

۴- تب و سردرد

۵- گلودرد

۶- حساسیت و بزرگی غدد لنفاوی قدامی گردن

۷- قرمزی گلو و بزرگی لوزه‌ها

۸- اگزودا روی لوزه‌ها

۹- دردشکم و حالت تهوع و استفراغ

۱۰- فقدان علائم عفونت تنفسی ویروسی مانند سرفه، خشونت صدا، آبریزش بینی و التهاب ملتحمه^(۷)

وجود پتشی در کام و راش مخلکی در پوست نیز دو

انکوباتور حاوی ۵ درصد CO_2 و در حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد قرار می دادند. پس از این مدت ناحیه ممانعتی ($I-Z$ Inhibition Zone) ایجاد شده توسط هر کدام از دیسک های فوق مورد بررسی قرار می گرفتند. برای دیسک باستیراسین چنانچه قطر Z -احداقل ۱۲ میلی متر بود، باکتری، استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A گزارش می شد و چنانچه اطراف دیسک باستیراسین باکتری رشد کرده بود استرپتوکوک بتاهمولیتیک غیرگروه A تلقی می گردید. در اکثر نمونه های ارسالی $I-Z$ ایجاد شده در اطراف دیسک باستیراسین ۱۴ میلی متر بوده است. غلظت دیسک باستیراسین مورد استفاده ۰/۰۴ واحد بود. در مورد دیسک پنی سیلین $I-Z$ بیش از ۲۲ میلی متر حساسیت کامل و $I-Z$ بین ۱۲ تا ۲۱ میلی متر حساسیت نسبی و کمتر از ۱۲ میلی متر مقاوم تلقی گردید. در مواردی که همولیز ایجاد شده توسط کلنی های استرپتوکوک ناقص و به رنگ سبز بودند تعدادی از کلنی های فوق را با لوب استریل برداشت کرده و روی محیط آگارخون دار دیگری پخش می کردند و یک دیسک Optochin روی آن گذاشته و پلیت را طبق شرایط قبلی داخل انکوباتور قرار می دادند. بعد از ۲۴ ساعت چنانچه $I-Z$ ایجاد شده برای دیسک های ۱۰ میلی متری حداقل ۱۴ میلی متر بود، باکتری، استرپتوکوک پنومونیه یا پنوموکوک گزارش می شد و در صورت عدم ایجاد $I-Z$ در اطراف دیسک Optochin، باکتری، آلفا استرپتوکوک گزارش می گردید. از کشت گلوی بعضی از بیماران ارگانیسم های دیگری کشت داده شده در آمار آمده است.

نتایج

از مجموع ۷۸۳۶ کودک مراجعه کننده به دو درمانگاه مجری طرح (درمانگاه بیمارستان آیت‌الله طالقانی ۲۷۷۱ نفو و درمانگاه طالقانی ۵۰۶۵ نفو) ۴۴۳ نفر (۵/۷ درصد) از آنها در گروه سنی ۵ تا ۱۵ سال با شکایت گلودرد مراجعه کرده بودند که از آنها کشت گلو گرفته شد. نتایج حاصل از کشت گلوی بیماران به شرح زیر می باشد:

- ۱- استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A ۱۰۰ مورد ۵/۲۲ درصد)
- ۲- استرپتوکوک بتاهمولیتیک غیرگروه A ۳۹ مورد

استرپتوکوکی و اهداف طرح و نحوه پرکردن فرم های مخصوص مطالعه که شامل مشخصات فردی و مشخصات بالینی بیماران بود توضیح داده می شد و در یک جلسه دیگر نحوه گرفتن کشت صحیح گلو بصورت عملی تعلیم داده می شد و سپس طبق یک برنامه زمان بندی شده به درمانگاه های فوق اعزام می گردیدند. بر طبق هماهنگی که قبلًا با مسئولین درمانگاه ها به عمل آمده بود کلیه کودکانی که شکایت اصلی آنها در موقع مراجعة گلودرد بود جهت نمونه گیری به کارورزان مذبور ارجاع داده می شدند. ابتدا با گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی فرم یکنواختی که شامل مشخصات فردی و علائم بالینی سری الف (علائم کلاسیک فارنژیت استرپتوکوکی) و سری ب (علائم کلاسیک فارنژیت ویروسی) بود برای هر بیمار بطور جداگانه پر می شد و سپس نمونه با یک سوآپ (Swab) استریل از انتهای حلق و روی لوزه های آنها برداشته و در داخل محیط ترانسپورت Stuart قرار می گرفت. لوله های محیط ترانسپورت به تعداد مورد نیاز مصرف هفتگی در یخچال درمانگاه های همکار طرح نگهداری و مورد استفاده قرار می گرفت. بعد از قرار دادن نمونه کشت گلو در محیط ترانسپورت و نوشتن نام بیمار و تاریخ بر روی آن لوله های حاوی نمونه، ظهر همان روز به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان آیت‌الله طالقانی و به تکنسین همکار طرح تحويل داده می شد. فرم های حاوی اطلاعات بالینی و فردی بیماران در یک پوشه مخصوص در درمانگاه اطفال بیمارستان آیت‌الله طالقانی قرار می گرفت. بعد از رسیدن نمونه به آزمایشگاه آن را روی محیط آگارخون دار (Blood agar) که محیط اختصاصی برای کشت استرپتوکوک است می برند. بعد از کشت نمونه بر روی پلیت، آن را در Candle jar یا انکوباتور حاوی ۵ تا ۱۰ درصد گاز CO_2 در درجه حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار می دادند. ۲۴ ساعت بعد از اتووگذاری، پلیت ها از نظر وجود باکتری های بتا یا آلفا همولیتیک بررسی می شدند. چنانچه اطراف کلنی های همولیز کامل و شفاف بود، همولیز بتا تلقی شده و تعدادی از کلنی های فوق را با لوب یا Swab استریل به محیط آگارخون دار دیگری منتقل و کاملاً پخش می کردند و دیسک های باستیراسین و پنی سیلین و باکتریم را بر روی آنها گذاشته و به مدت ۲۴ ساعت در Candle jar یا

در کودکان مبتلا به فارنژیت استرپتوکوکی (بتاباهمولیتیک گروه A) ۵۳ نفر (۵۳ درصد) مذکر و ۴۷ نفر (۴۷ درصد) مؤنث بودند. سن متوسط بیماران ۸/۸+۳ سال بود و ۴۱ نفر (درصد) از آنها در گروه سنی ۵ تا ۷ سال قرار داشتند. جدول شماره ۱ توزیع سنی و جنسی این بیماران را نشان می‌دهد.	(۸/۸ درصد)
۳- استرپتوکوک آلفا همولیتیک	۲۹۰ مورد
۴- میکرو ارگانیسم‌های دیگر مانند پنوموکوک ، استافیلوکوک اورئوس ، استافیلوکوک اپیدرمیدیس و باسیل گرم منفی	(۶۵/۵ درصد)
جدول شماره ۱- توزیع سنی و جنسی بیماران مبتلا به فارنژیت استرپتوکوکی	(۱۴ مورد (۳/۲ درصد)

Downloaded from http://journals.tums.ac.ir/ at 11:15 IRDT on Saturday July 7th 2012

جمع		مؤنث		ذکر		جنس گروه سنی (سال)
درصد	مطلق	درصد	مطلق	درصد	مطلق	
۴۱	۴۱	۳۴	۱۶	۴۷	۲۵	۵-۷
۲۴	۲۴	۲۶	۱۲	۲۳	۱۲	۸-۱۰
۲۳	۲۳	۲۵	۱۲	۲۱	۱۱	۱۱-۱۳
۱۲	۱۲	۱۵	۷	۹	۵	۱۴-۱۵
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۷	۱۰۰	۵۳	جمع

مشاهده نشد. هیچ بیماری دوعلامت غیرکلاسیک را با هم نداشت.

بیمارانی که فاقد علائم چهارگانه سرفه ، کوریزا، خشونت صدا و کثرنکتیویت بودند بر حسب وجود تعداد علائم نه گانه فارنژیت باکتریال (شروع ناگهانی ، تب ، گلودرد، قرمزی گلو، اگزودا، حساسیت و بزرگی غدد لنفاوی تحت فکی ، علائم گوارشی همراه ، پتشی روی کام و راش محملکی) در جدول شماره ۲ نشان داده شده‌اند و همان گونه که مشاهده می‌شود ۵۳ درصد بیماران ۵ علامت را داشته‌اند.

میزان شیوع علائم کلاسیک فارنژیت استرپتوکوکی در این بیماران به ترتیب زیربود: قرمزی گلو ۹۹ نفر (۹۹ درصد)، شروع ناگهانی ۸۶ نفر (۸۶ درصد) تب ۸۴ نفر (۸۴ درصد)، اگزودا ۶۹ نفر (۶۹ درصد)، حساسیت و دردناک بودن غدد لنفاوی قدامی گردن ۳۰ نفر (۳۰ درصد)، پتشی روی کام ۳ نفر (۳ درصد)، راش محملکی ۱ نفر (۱ درصد) و علائم گوارشی همراه مانند دل درد و حالت تهوع و استفراغ در ۲۲ مورد (۲۲ درصد) مشاهده شد. میزان شیوع علائم غیرکلاسیک در این بیماران به ترتیب زیربود: سرفه ۱۲ درصد، آب ریزش بینی ۱۰ درصد، گرفتگی صدا ۸ درصد و کثرنکتیویت در هیچ موردی

جدول شماره ۲- تعداد مبتلایان به فارنژیت استرپتوکوکی بر حسب وجود تعداد ۹ علامت مشخصه فارنژیت

تعداد علائم	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	جمع
تعداد مبتلایان	۰	۱	۵	۲۰	۵۳	۶	۱۲	۲	۱	۱۰۰
درصد	-	۱	۵	۲۰	۵۳	۶	۱۲	۲	۱	۱۰۰

شروع ناگهانی + قرمزی گلو + اگزودا بدون علائم ویرال دارای حساسیت (Sensitivity) ۵۷ درصد ، اختصاصیت (Specificity) (Positive Predictive) ۹۸ درصد، ارزش پیش‌بینی کننده مثبت

میزان قدرت تشخیصی علائم دال بر فارنژیت استرپتوکوکی بر حسب تعداد علائم در جدول شماره ۳ نمایش داده شده است و همانگونه که مشاهده می‌شود وجود ۵ علامت گلودرد + تب +

و تابستان ۳ نفر (۳ درصد). بیشترین تعداد موارد مثبت در ماههای اردیبهشت (۲۵ نفر) و دی (۲۳ نفر) ثبت گردید.

در مجموع ۱۳ نفر از بیماران قبل از مراجعت آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند که اکثرًا بصورت مصرف چند عدد کپسول آمپی سیلین یا آموکسی سیلین یا اریتروماکسین بود. تمام

جدول شماره ۳- میزان قدرت تشخیصی علائم دال بر فارنژیت استرپتوکوکی بر حسب تعداد علائم

(Negative Value) ۸۹ درصد، ارزش پیش‌بینی کننده منفی (Negative Value)

۸۹ Predictive Value) درصد و کارآئی (Efficiency)

درصد می‌باشد.

شیوع فصلی بیماری به ترتیب زیر بود : بهار ۳۵ نفر (۳۵)

درصد)، زمستان ۳۴ نفر (۳۴ درصد)، پائیز ۲۸ نفر (۲۸ درصد)

EFF.	N.P.V	P.P.V.	Spec.	Sens.	قدرت تشخیصی علائم بالینی
۸۵	۹۰	۶۷	۹۰	۶۶	وجود ۲ علامت: گلودرد + قرمزی گلو + شروع ناگهانی
۸۸	۹۱	۷۶	۹۴	۶۹	وجود ۴ علامت: گلودرد + قرمزی گلو + شروع ناگهانی + تب
۸۹	۸۹	۸۹	۹۸	۵۷	وجود ۵ علامت: گلودرد + قرمزی گلو + شروع ناگهانی + تب + اگزودا
۸۱	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۷	وجود ۶ علامت: گلودرد + قرمزی گلو + شروع ناگهانی + تب + اگزودا + حساسیت غدد لنفاوی تحت فکی

Sens. = Sensitivity , P.P.V. = Positive Predictive Value , EFF. = Efficiency

Spec. = Specificity , N.P.V. = Negative Predictive Value

تب (۵۳ درصد) دو علامت شایع دیگر در آنها بود. شیوع اگزودا در این گروه ۴۰ مورد (۱۴ درصد) بود.

بحث

همان‌گونه که قبلًا ذکر گردید مشکل عدمه تشخیص بالینی فارنژیت استرپتوکوکی در تشخیص افتراقی فرم‌های خفیف آن از فارنژیت ویروسی است زیرا تعدادی از علائم بالینی ممکن است در هردو گروه مشترک باشد، به عنوان مثال تب، قرمزی گلو و حتی اگزودا نیز ممکن است در فارنژیت‌های ویروسی وجود داشته باشند، در این گونه موارد در نظر گرفتن سن و فصل شیوع و سایر علائم همراه کمک کننده است. مشکل تشخیصی دیگر وجود ناقلین بدون علامت است. طبق آمارهایی که از کشورهای مختلف گرفته شده استرپتوکوک گروه A به میزان ۱۰ تا ۵۰ درصد در گلوی دانش آموزان سالم مدارس ابتدائی یافت شده است.^(۱۰) در این صورت تعداد نامشخصی از کشتهای مثبت ممکن است ناقلینی باشند که از عفونت ویروسی رنج می‌برند. در این گونه موارد نیز گرفتن تاریخچه دقیق از نظر شیوع تدریجی علائم و یافتن علائم

نمونه‌های ایزوله شده استرپتوکوک بناهمولیتیک گروه A به پنی سیلین حساس بودند و فقط در ۳ مورد حساسیت نسبی به پنی سیلین مشاهده شد. همه سوش‌های جدا شده به کوتريمومکازول مقاوم بودند. برای کودکانی که حدس بالینی فارنژیت استرپتوکوکی قوی بود یک عدد آمپول بنزاتین پنی سیلین تجویز می‌شد. هیچ موردی از آلرژی به پنی سیلین گزارش نشد.

میزان شیوع علائم فارنژیت ویروسی در ۲۹۰ بیماری که در کشت گلوی آنها استرپتوکوک آلفاهمولیتیک (فلورنرمال دهان) رشد کرد به ترتیب عبارت بود از : سرفه ۱۳۴ مورد (۴۶ درصد) ترشح بینی ۹۸ مورد (۳۴ درصد)، خشونت صدا ۵۶ مورد (۱۹ درصد) و کنترنکتیویت ۲۴ مورد (۸ درصد). ارجحیت علائم فارنژیت باکتریال در گروه باکشت مثبت استرپتوکوک گروه A و ارجحیت علائم فارنژیت ویروسی در گروه آلفاهمولیتیک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری دارد ($p < 0.001$). در گروه آلفاهمولیتیک، بیماران در ۱ موارد در فصل تابستان مراجعت کرده و در ۵۰ درصد موارد دارای ۳ دو علامت فارنژیت ویروسی بودند. قرمزی گلو (۶۳ درصد) و

مما مس پیدا کنند. در مواردی که کودک همکاری نمی‌کند امکان رداشت نمونه از محلی که مناسب نیست وجود دارد. در مواردی که کودک در زمان گرفتن نمونه آنتی‌بیوتیک مصرف کرده باشد امکان نتایج منفی کاذب وجود دارد. کشت گلو به طور وسیعی در آمریکا به کار می‌رود ولی محدودیت‌های مالی در کشورهای در حال توسعه استفاده روتین از کشت گلو ام تأسیساتی ایشان را محدود می‌نماید.

برای زیباده سریع تحریر و راهنمایی می شود. محققی بنام آقای Brees در سال ۱۹۷۷ در یک مطالعه بر روی ۲۰۰۰ کودک با عفونت تنفسی حاد یک سیستم نمره بندی برای تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی بر اساس فاکتورهای زیر بوجود آورد:

۱-ماه مراجعه بیمار، ۲-سن، ۳-شمارش گلبول‌های سفید خون، ۴-میزان تب، ۵-گلودرد، ۶-سرفه، ۷-سردرد، ۸-فارنکس غیرطبیعی و ۹-غدد لنفاوی گردانی غیرطبیعی. برای هر کدام از علائم بالا با توجه به میزان مشتبه بودن کشت گلویک نمره در نظر گرفته شد. بالاترین نمره ممکن است در این سیستم ۳۸ و پائین‌ترین آن ۱۴ بود. او مشاهده کرد که آنهایی که نمره ۳۲ یا بالاتر داشته‌اند در ۸۴ درصد موارد دارای کشت مشتبه بوده‌اند. (۷)

در یک مطالعه در کشور آلمان در سال ۱۹۷۴ محققی به نام آقای Pattyn و همکارانش در دانشگاه Antwerp تصمیم گرفتند میزان شیوع استرپتوکوک گروه A (GAS) را در بیمارانی که به علت گلودرد به پزشکان عمومی در شهر و حومه شهر مراجعه می‌کردند پیدا کنند. از تمام ۱۳ پزشک عمومی که با این مطالعه همکاری کردند درخواست شد که از تمام بیمارانی که با شکایت گلودرد در فاصله ۴ ماه از فوریه تا May ۱۹۷۴ مراجعه می‌کنند کشت گلو به عمل آورند. در طول مدت مطالعه ۶۳۷۲ بیمار ویزیت شدند و در بین آنها ۶۲ نفر (۴/۸ درصد) به علت گلودرد مراجعه کرده بودند و در بین آنها ۲۰ نفر (۳/۲ درصد) کشت مثبت GAS داشتند.^(۴) در همان زمان یک مطالعه جداگانه در بروکسل بر روی کودکان دانش آموز انجام گرفت که از ۵۸۲ کودک مبتلا به گلودرد ۱۴۶ نفر (۲۵/۶ درصد) کشت مثبت GAS داشتند.^(۴) میزان شیوع فارنژیت استرپتوکوکی در مطالعه ما با آمار محققین قبلی مطابقت دارد.

کلاسیک عفونت ویروسی در معاینه بالینی کمک کننده است. در افراد بدون علامت در ممالک معتدله ۵۰ تا ۶۰ درصد استرپتوکوکهای گلو از گروه A بوده و گروههای G و C کمتر از ۳۰ درصد موادر را می‌سازند. در ممالک گرمسیری این مسئله بر عکس بوده و گروههای G و C ۶۰ تا ۷۰ درصد موادر را تشکیل می‌دهند، بنابراین شناسی افتن استرپتوکوکهای غیرگروه A و همچنین استرپتوکوک آلفا همولیتیک که یک فلور نرمال دهان محسوب می‌شود در ناقلين بدون علامت یا آنهائی که فارنژیت ویروسی دارند زیاد است. در این مطالعه نیز درصد شیوع علائم فارنژیت ویروسی در این گروه از مراجعین بالا بود.

متداول ترین روش شناسائی استرپتوكوک گروه A تست افتراق باسیتراسین یا *Bacitracin Differentiation Test* است. بر اساس این تست ۹۵ تا ۱۰۰ درصد استرپتوكوک های بتاهمولیتیک گروه A در اطراف یک دیسک باسیتراسین که حاوی ۴ درصد واحد از باسیتراسین باشد یک I-Z را نشان می دهند در حالی که ۹۷ تا ۸۳ درصد استرپتوكوک های بتاهمولیتیک غیر گروه A چنین کاری را نمی کنند.^(۱) اگرچه بعضی ها عقیده دارند که این تست بهتر است در کشت دوم یا *Subculture* کلندی های استرپتوكوک انجام شود ولی این تست می تواند به خوبی در همان محیط کشت اولیه آگارخون دار انجام گیرد و کم خرج بوده و در وقت صرفه جوئی می نماید. کلندی های استرپتوكوک بتاهمولیتیک که روی محیط آگارخون دار رشد می کنند می توانند با یکی از متدهای جستجوی آنتی زن یا با استفاده از تکنیک لانسفیلد به انواع A تا U تقسیم شوند. این تکنیک ها تشخیص قطعی را فراهم می آورند ولی بسیار گران هستند. پزشکانی که کشت گلو را در مطب خود انجام می دهند به زحمت این هزینه اضافی را به خاطر بھبود مختصراً که تست های جستجوی آنتی زنی در صحت تشخیص بوجود می آورند قبول می کنند.^(۱)

غیر از متد صحیحی که برای کشت گلو مورد استفاده قرار می‌گیرد روش برداشتن کشت گلو نیز اهمیت زیادی بر روزی صحت نتایج دارد. کشت گلو باید از روی سطح لوزه‌ها و دیواره خلفی حلق برداشته شود. سایر نواحی حلق و دهان مناسب نبوده و نایاب قابل و بعد از برداشتن نمنه به از محل مناسب با *Swab*

با پنی سیلین می گذرد و درمان میلیون ها بیمار، استرپتوکوک گروه A هنوز به ۴٪ واحد یا کمتر از پنی سیلین در میلی لیتر حساس است.^(۵) در مطالعه ما نیز استرپتوکوک مقاوم به پنی سیلین یافت نشد.

۹۵ درصد کودکانی که درمان می شوند ظرف ۲۴ ساعت بعد از شروع درمان مناسب کشت آنها منفی شده و قادرند به مدرسه برگردند. شواهدی که از مطالعه بر روی مدارس، سربازخانه ها و خانواده ها جمع آوری شده نشان می دهد که هرچه زودتر آنتی بیوتیک شروع شود ریسک انتقال GAS از بیماران به سایرین کمتر می شود.^(۱) این مسئله اهمیت تصمیم گیری زودرس برای شروع درمان را می رساند. مطالعه ای در کشور مکزیک که علائم بالینی و تست های جستجوی سریع آنتی زن و کشت گلو را با یکدیگر مقایسه نموده بود به این نتیجه رسیده بود که در ویزیت روزمره بیماران معیارهای بالینی به خوبی می توانند مفید واقع گردد.^(۶)

نتیجه گیری

فارنژیت استرپتوکوکی یکی از عفونت های شایع کودکان می باشد که تشخیص و درمان صحیح آن به علت این که می تواند از یک عارضه مهم مانند تب روماتیسمی و عوارض قلبی آن پیش گیری کند دارای اهمیت بسیار می باشد. بهترین راه تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی کشت گلو می باشد. تست های جستجوی سریع آنتی زن استرپتوکوک دارای سرعت و حساسیت قابل قبولی هستند ولی گران بوده و در دسترس نمی باشند. در غیاب امکانات تشخیصی آزمایشگاهی با کمک گرفتن از معیارهای اپیدمیولوژیکی و بالینی می توان عفونت را تشخیص داده و درمان نمود.

REFERENCES

- 1) Gerber MA; Comparison of throat cultures and rapid strep tests for diagnosis of streptococcal pharyngitis. *pediatr infect Dis J.* 8(11): 820-24, 1989
- 2) Klein JO; Diagnosis of streptococcal pharyngitis: an Introduction. *pediatr infect Dis J.* 8(11): 813-15, 1989
- 3) Markowitz M.; Streptococcal disease in

بیمارستان شهر بوستون در فاصله سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸ به عمل آمد، پائین ترین میزان کشت مشبت گلو در ماههای اوت (۳۱ درصد) و فوریه (۳۲ درصد) بود، در حالی که بالاترین میزان در ماههای آوریل و می (فصل بهار) و به میزان ۵۳ درصد دیده شد.^(۲)

در یک مطالعه توسط دکتر Elmwood Pichichero در طول مدت یک سال میزان کشت مشبت GAS ۱۶ درصد بوده است ولی در وسط فصل بهار شیوع استرپتوکوک این میزان به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسید.^(۴) در این مطالعه نیز عفونت در فصل بهار و بخصوص ماه اردیبهشت شایع بود. اطلاعات محدودی درباره نحوه درمان فارنژیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و این احتمال وجود دارد که برای همه گلودردها نوعی آنتی بیوتیک تجویز شود. یک مطالعه در شمال هند که در مورد نحوه درمان گلودردهای کودکان صورت گرفت نشان داد که آنتی بیوتیک مناسب و طول درمان صحیح به نحو گسترهای مورد غفلت قرار گرفته بودند و به این اصول توجهی نشان داده نمی شد و محقق نتیجه گرفته بود که یک نیاز فوری برای آموزش توجیهی همه دست اندر کاران پژوهشی از جمله متخصصین اطفال وجود دارد.^(۸) در سال ۱۹۷۰ کشور کاستاریکا که در آمریکای مرکزی واقع است هر کودک بالای ۳ سال را که دچار عفونت تنفسی فوقانی بود با تزریق داخل عضلانی بنزاتین پنی سیلین درمان نمود و موفق شد که تب روماتیسمی را تقریباً در آن کشور از بین ببرد (از ۹۴ درصد هزار در سال ۱۹۷۰ به کمتر از ۱۲ درصد هزار در سال ۱۹۹۰).^(۳)

نکته قابل توجه این است که حساسیت استرپتوکوک گروه A به پنی سیلین هرگز تغییر نکرده است. بعد از ۴ دهه که از درمان

developing countries. *pediatr infect Dis J.* 10(10) : 511-15, 1991

4) Pichichero ME.; Treatment of streptococcal pharyngitis: Discussion : Day 2. *pediatr infect Dis J.* 10(10): 573, 1991

5) Quie PG.; Development of effective programs for control of epidemic streptococcal infections,

* با تشکر از زحمات سرکار عاصم دکتر نادیا ولاشم که در امر نهیه جداول و آمار طرح تحقیقاتی مذکور کوشش قابل تقدیری به عمل آورده است.

pediatr infect Dis J. 10(10): 57-11, 1991

6) Reyes H, Guiscafre H, Perez-Cuevas R, et al; *Diagnosis of streptococcal pharyngo - tonsillitis: Clinical criteria or coagglutination? Bol Med Hosp infant Mex.* 48(9): 627-36, 1991

7) Shulman ST.; *Streptococcal pharyngitis: clinical and epidemiologic factors.* *pediatr infect Dis J.* 8(11): 816-19. 1989

8) Singh S, et al ; *prescribing practices in*

childhood sore throat . Indian pediatr, 25: 1149-54, 1988

9) Vandepitte J.; *Streptococcal pharyngitis: a Belgian perspective.* *pediatr infect Dis J.* 10(10): 564-68, 1991

10) WHO Technical report series 764; *Rheumatic fever and rheumatic heart disease.* World Health Organization, Geneva, 1988

STREPTOCOCCAL PHARYNGITIS IN CHILDREN: SURVEY OF 100 CASES

S. Roodpeyma, M.D.*

H.A.Babaei, B.S.**

N.Vallaei, B.S.***

ABSTRACT

This prospective study was designed to find the incidence of streptococcal pharyngitis in childhood sore throat and also to compare the clinical diagnosis of disease with the results of throat cultures.

Children, 5 to 15 years of age with sore throat who were seen in pediatric out-patients department formed the subjects of this study. The duration of study was one year (October 1992 - October 1993). There were 443 children with sore throat. 100 patients (22.5%) had positive throat culture (group A Beta hemolytic streptococci). 53 patients (53%) were male and 47% were female. The mean age of the group was 8.8 ± 3 years. Clinical findings in order of frequency were as follow: redness of pharynx 99%, acute onset of symptoms 86%, fever 84%, exudate on tonsils 69%, enlargement and tenderness of anterior cervical lymph nodes 30%, and associated gastrointestinal symptoms 22%. Seasonal prevalence of disease were as follow: spring 35%, winter 34%, autumn 28% and summer 3%. 53% of this patients had 5 clinical symptoms. 5 clinical findings such as sore throat + fever + acute onset of disease + redness of pharynx + exudate on tonsils and absence of viral symptoms (cough, coryza, conjunctivitis, hoarseness) had a sensitivity of 57%, specificity of 98%, positive predictive value of 89%, negative predictive value of 89% and efficiency of 89%.

This study showed that in the absence of laboratory facilities careful clinical findings can be helpful for reaching accurate diagnosis of streptococcal pharyngitis.

Key words: 1) Streptococcal pharyngitis
2) Throat culture
3) Sore throat

* Associate Professor of Pediatric Cardiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

** B.S. of Microbiology

*** Research Consultant