

بررسی ریتم شبانه آنزیم ان - استیل ترانسفراز در غده پینه آل موش صحرائی

دکتر علی صادقی لویه*

چکیده

موجودات زنده ریتم‌های بیولوژیک متعددی دارند. برخی از این ریتم‌ها آندوژن و بعضی نیز در طول شبانه‌روز تحت تاثیر نور یا تاریکی قرار دارند. تغییرات دوره‌ای ترشح هورمون ملاتونین از غده پینه آل و همچنین اثرات تغییر فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز (*N-Acetyl transferase*) این غده در میزان سنتز هورمون ملاتونین امروزه به عنوان یک ریتم پایه‌ای شناخته شده است. در این مطالعه میزان فعالیت ان - استیل ترانسفراز در طول شب، یعنی زمانی که میزان سنتز هورمون ملاتونین به حداکثر می‌رسد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تکنیک‌های بکار رفته بوضوح مشخص است که تغییرات فعالیت ان - استیل ترانسفراز در غده پینه آل موش صحرائی به میزان تابش نور محیط وابسته است و شرایط نوری محیط از طریق رشته‌های سمپاتیک با آزاد ساختن نور آدرنالین در غده پینه آل فعالیت ان - استیل ترانسفراز را بطور چشمگیری تغییر می‌دهد.

کلید واژه‌ها: ۱- غده پینه آل ۲- ملاتونین ۳- ان - استیل ترانسفراز

مقدمه

انسان شاهد این حقیقت است که اکثر موجودات زنده ریتم‌های بیولوژیک متعددی از خود نشان می‌دهند. تعدادی از این ریتم‌ها آندوژن و بسیاری از آنها تحت تاثیر شرایط نوری محیط زندگی می‌باشد. سنتز و آزاد شدن دوره‌ای هورمون ملاتونین از غده پینه آل و اثراتی که این هورمون در کنترل رفتار موجودات زنده بویژه کنترل نور و آندوکرین دارد این تصور را پیش آورده که مکانیسم ویژه‌ای در بروز این رفتارها موثر است. در عمق این مکانیسم‌ها ساختمان پیچیده یک پیس‌میکر (*Pacemaker*) فعالیت دارد که بعنوان عمده‌ترین

ابزار اندازه‌گیری در طول شبانه‌روز عمل می‌کند. (۱، ۹) برخی از تغییرات بیولوژیک موجودات زنده سبب بروز اعمال فیزیولوژیکی از قبیل تولید فاکتورهای بیوشیمیایی و رفتار ویژه می‌شود. هرگاه در درون یک سیستم بیولوژیک، اعمالی با توالی و فاصله زمانی تقریباً منظم رخ دهد یک ریتم بیولوژیک برقرار شده است. فاصله زمانی تکرار هر یک از این اعمال، یک دوره ریتم نامیده می‌شود (۳). بارزترین ریتم‌ها در طبیعت، ریتم‌های شبانه‌روزی است مانند: ریتم‌های فعالیت و استراحت، ریتم‌های تغییر حرارت، ریتم‌های تغییر غلظت هورمون‌ها در خون و ریتم‌های تغییر

* دانشیار و مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

در یک رژیم نوری پایه‌ای D/L قرار داشته‌اند (۱۲ ساعت تابش نور و ۱۲ ساعت تاریکی):

— سری اول با رژیم نوری D/L (۱۲ ساعت نور + ۱۲ ساعت تاریکی): تابش نور ممتد از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر و رژیم تاریکی ممتد از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۶ صبح.

— سری دوم با رژیم نوری D/L (۱۲ ساعت نور + ۱۲ ساعت تاریکی): تابش نور ممتد از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب و رژیم تاریکی ممتد از ساعت ۱۰ شب تا ۱۰ صبح.

— سری سوم با رژیم نوری D/L (۱۲ ساعت نور + ۱۲ ساعت تاریکی): تابش نور ممتد از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۲ صبح و رژیم تاریکی ممتد از ساعت ۲ صبح تا ۲ بعد از ظهر کلیه حیوانات مورد بررسی به مدت یک هفته در رژیم نوری تعیین شده قرار گرفتند.

فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز در آخرین دوره تاریکی هر سری تعیین و با اولین ساعت شروع دوره تاریکی مقایسه شده است. در هر سری ۷ دسته حیوان مورد بررسی در هفت نوبت و با فاصله هر دو ساعت یک دسته، مورد بررسی قرار گرفتند. آخرین دسته هر سری در آخرین ساعت دوره تاریکی آن سری مورد آزمایش قرار گرفته است.

میزان فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز از غده پینه آل با استفاده از تست‌های آزمایشگاهی **BOEHRINGER MANNHEIM** در ۲۵ درجه سانتی‌گراد ارزیابی و اختلاف دانسیته اپتیک آن در دقیقه با طول موج ۳۴۰ نانومتر اندازه‌گیری شده است. میانگین فعالیت آنزیمی هر دسته با انحراف معیار آن در یک نقطه منحنی ذکر شده است (شکل ۱).

نتایج

در سری اول موشها، میزان فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز از ساعات اولیه بررسی (ساعت ۶ بعد از ظهر) به تدریج افزایش یافته است (شکل ۱ منحنی ضخیم). حداکثر فعالیت آنزیمی این سری از حیوانات در ساعت ۱۲ شب ثبت شده است. از این ساعت به بعد تا ساعت ۶ صبح میزان فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز رو به

غلظت یونها در ادرار. ریتم‌های بیولوژیک منحصراً پاسخهای غیرفعال مربوط به تواتر نوروتاریکی محیط نیست، بلکه اساس ریتم‌ها بیشتر از نوع آندوژن و ذاتی است و توسط یک ساعت آندوژن هدایت می‌شود (۱). معمولاً در طبیعت ریتم‌های عادی آزادانه تغییر نمی‌کند بلکه در طول شبانه‌روز تحت تاثیر عواملی بنام سنکرونیزه‌کننده‌ها (*Synchronizers*) قرار دارند. مهمترین و عمومی‌ترین این عوامل سنکرونیزه‌کننده سیکل نور و تاریکی است که با چرخش زمین بوجود می‌آید، اما سیکل‌های دیگر نظیر درجه حرارت شبانه‌روزی، اوقات صرف غذا یا بازی و ... نیز می‌تواند سنکرونیزه‌کننده باشد. (۶)

تغییرات دوره‌ای هورمون ملاتونین، هورمون عمده غده پینه آل، و اثرات عمده این هورمون بر سیستم آندوکراین و سایر اندامهای بدن به عنوان یک ریتم پایه شناخته شده است. (۲) اما در عین حال امروزه تغییر فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز غده پینه آل با تغییر میزان سنتز هورمون ملاتونین، در تولید ریتمیک ملاتونین در غده پینه آل شناخته شده است (۸).

با توجه به افزایش تولید ملاتونین در طول شب، نشان داده شده که تابش ممتد نور، میزان سنتز این هورمون را به حداقل می‌رساند. (۵) بنابراین بررسی میزان فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز در رابطه با شرایط نوری محیط زیست موجودات زنده به ویژه در طول شب که میزان سنتز هورمون ملاتونین به حداکثر می‌رسد مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است.


تکنیک

حیوانات مورد استفاده، موش‌های صحرایی (*Rat*) نر از نوع ویستار (*Wistar*) با وزن متوسط ۱۵۰ گرم بودند که از غذاهای استاندارد موجود تغذیه می‌کردند. بررسی‌ها بر روی سه سری، هر سری شامل ۷ دسته و هر دسته با ۸ موش صحرایی به شرح زیر انجام گرفته است:

کلیه حیوانات جدا از شرایط اختصاصی هر سری یا دسته

در سری دوم و سوم حیوانات، که زمان شروع تابش نور نسبت به سری اول به ترتیب ۴ و ۸ ساعت به تأخیر افتاده نتایج متفاوتی حاصل شده است:

کاهش گذاشته و در آخرین ساعت بررسی (۶ صبح) به حداقل خود رسیده است. میزان فعالیت ان - استیل ترانسفراز در روز (در طول ۱۲ ساعت تابش نور ممتد) صفر است (۴).



شکل ۱- تغییرات آنزیم ان - استیل ترانسفراز در ساعات مختلف

تجربیات بر روی سه سری از حیوانات و هر سری شامل ۶ تا ۸ دسته و هر دسته شامل ۸ موش صحرایی اجرا گردیده است:

- سری اول با رژیم تجربی D/D از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۶ صبح.
- سری دوم با رژیم تجربی D/D از ساعت ۱۰ شب تا ۱۰ صبح.
- سری سوم با رژیم تجربی D/D از ساعت ۲ صبح تا ۲ بعد از ظهر.

قرار دارد. (۷) این هسته پیامهای دوره‌ای ویژه‌ای بطرف غده پینه آل می‌فرستد بطوری که یک فاز تحریکی برای فعالیت ان - استیل ترانسفراز در شب اتفاق می‌افتد؛ یعنی نور - اپی نفرین از انتهای عصب سمپاتیک در غده پینه آل آزاد و ان - استیل ترانسفراز را فعال می‌کند (۷)، بطوریکه فعالیت این آنزیم دو فاز مشخص کاهش در طول روز (حدود صفر) و افزایش در طول شب را نشان می‌دهد. بنابراین مطالعه تغییرات فعالیت ان - استیل ترانسفراز از ابتدای شب (غروب تجربی) تا انتهای شب (بامداد تجربی) و چگونگی این تغییرات می‌تواند با ارزش باشد.

با توجه به فازهای تاخیری بکار رفته در تکنیک و فراهم کردن محیط تاریکی ممتد، بوضوح آشکار است که مکانیسم پایه‌ای تغییرات فعالیت ان - استیل ترانسفراز به میزان تابش نور محیط وابسته است و شرایط رژیم نوری محیط در نهایت از طریق رشته‌های سمپاتیک با آزاد ساختن نورآدرنالین در غده پینه آل فعالیت آنزیم ان - استیل ترانسفراز را بطور چشمگیر تغییر می‌دهد.

در سری دوم میزان فعالیت ان - استیل ترانسفراز از ساعت ۱۰ شب (به جای ساعت ۶ بعد از ظهر سری اول) رو به افزایش گذاشته و حداکثر فعالیت آنزیمی در حوالی ساعت ۳ صبح مشاهده شده (شکل ۱ منحنی نازک) و در ساعت ۱۰ صبح این فعالیت خاتمه یافته است. در سری سوم میزان فعالیت آنزیمی از ساعت ۲ صبح رو به افزایش گذاشته، در ساعت ۹ بامداد به حداکثر رسیده و در ساعت ۱۲ ظهر خاتمه یافته است (شکل ۱ منحنی بریده).

بحث و نتیجه گیری

ریتم تولید ملاتونین توسط ریتم فعالیت ان - استیل ترانسفراز تعیین می‌شود زیرا این آنزیم تبدیل پیش‌ساز ملاتونین، یعنی ان - استیل سروتونین را به ملاتونین هدایت می‌کند. (۴)

ریتم ان - استیل ترانسفراز توسط یک پیس میکر سیرکادین (Circadian) کنترل می‌شود که در هسته‌های سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس (Supra Chiasmatic Nucleus)

REFERENCES

- 1- Czeisler, C.A. et al. Bright light resets the human circadian pacemaker independent of the timing of the sleep - wake cycle, science wash. Dc 233 ; 667, 1986
- 2- Ebadi, M. et al. Pineal gland in synchronizing and refining physiological events. Nips, 8, 1993, 30-33
- 3- Illnerova, H. Mammalian circadian clock and its resetting NIPS, 6, 129, 1991
- 4- Klein, D. C., Moore, R. J. Pineal N- acetyl transferase and hydroxyindole-o-methyltransferase: Control by the retinal hypothalamic tract and the suprachiasmatic nucleus. Brain Res. 174, 245, 1979
- 5- Moore, R. Y., Card, J. P., Neuropeptide Y and the circadian system, IN: Neuropeptide Y, New york: Rayen 293/1989.
- 6- Pittendrigh, C. S., Circadian System entrainment Handbook of behavioral neurobiology. Biological rhythms. Newyork plenum 4, 95, 1981.
- 7- Ralph, M. R. et al. Transplanted suprachiasmatic nucleus determines circadian period, science wash. D.C 247,975, 1990
- 8- Rusaka, B. BINA, K, G. Neurotransmitters in the mamamlian circadian system. Annu. Rev. Neurosci, 13, 387, 1990
- 9- Sadeghi-Louyeh, A. Modifications metaboliques Provoquees par La suppression de l' alternance lumiere-obscurite' Role de la glande pineale. These d' ETAT ES-science, 1980

