

گزارش ۱ مورد Cutis Laxa همراه با دررفتگی دو طرفه مفصل ران

چکیده

کوتیس لاکسا یک بیماری ارثی است که از ۲ طریق اتوزومال غالب و مغلوب منتقل می‌شود. شکل اکتسابی این بیماری به دنبال یک بیماری تبدیل یا التهاب پوستی ایجاد می‌شود. موردی که گزارش می‌شود دختر ۵ ماهه‌ای است که پوستی شل و آویزان در تمام بدن همراه با چهره‌ای خاص داشت. همچنین دارای بینی قلابی شکل با سوراخهای به بالا برگشته، لب بالایی بلند، قوس بلند کام، فونتانلهای وسیع، فاصله بیش از حد چشمها، چین‌های اپی‌کانتال، شکاف پلکی آنتی‌مونگلوبینید در چشمها و فتق نافی واضح بود. در بررسیهای پاراکلینیکی، رادیوگرافی قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی طبیعی بودند اما رادیوگرافی لگن، در رفتگی دو طرفه مفصل ران را نشان داد. نتایج آزمایشگاهی شامل CBC، کلیم، فسفر، آکالان، فسفاتاز، تستهای تیرورئیدی، آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار طبیعی بودند. بررسی پاتولوژیک انجام شده روی بیوپسی پوست بیمار، با کوتیس لاکسا مطابقت داشت. نتایج بررسی کاهش بافت الاستیک و طبیعی بودن بافت کلاژن را نشان داد.

دکتر علی‌اکبر عبدی ۱

کلیدواژه‌ها: ۱- شلی‌پوست ۲- دررفتگی دو طرفه مفصل ران ۳- ملاجه‌ای بازتر از معمول


مقدمه

پرولاپس رکتوم، ریوی و گشادی آئورت نیز دیده می‌شود. علائم این بیماری از بدرو تولد یا دوره کودکی نمایان می‌شود اما ممکن است در حالت خفیف تظاهرات آن تا هنگام بلوغ جلب توجه نکند. نوع اخیر از نظر زیبایی اهمیت بیشتری دارد. نوع اکتسابی بیماری به دنبال یک بیماری تبدیل یا التهابی پوست مانند لوپوس، اریتم مولتی‌فرم، کهیر، آنژیوادما، واکنش حساسیت به پنی‌سیلین، آمیلوئیدوز و یادر نوزاد مادری که پنی‌سیلامین مصرف کرده است بروز می‌کند^(۱، ۲).


از نظر بافت شناسی، بافت الاستیک پوست کاهش می‌یابد و بصورت تکه‌تکه شدن، جمع شدن یا اتساع فیبرهای الاستیک در پوست جلب توجه می‌کند^(۱).

shellی پوست (Cutis Laxa) یا بیماری درماتومگالی به ۲ شکل مادرزادی و اکتسابی تظاهر می‌کند. نوع مادرزادی از ۲ طریق اتوزومال غالب و مغلوب منتقل می‌شود که شکل مغلوب آن شدیدتر است و علائم آن از بدرو تولد وجود دارد. این علائم به صورت کمی وزن، پوست شل با چین‌های فراوان در قسمتهای مختلف بدن، پوست صورت آویزان، بینی قلابی شکل و صاف با سوراخهای سربالا، لب بالایی بلند و پلک تحتانی برگشته به بیرون، صدای گریه خشن، دیربسته شدن و وسیع بودن فونتانلهای(۱)، شل بودن لیگامانها، آمفیزم ریوی و تظاهرات خفیف قلبی و عروقی می‌باشد^(۱، ۲). فتقهای متعدد، دیورتیکول دستگاه گوارش و ادراری، پنوموتوراکس، تنگی شریان

(۱) استادیار بیماریهای کودکان و نوزادان، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران.



شکل شماره ۱- کام با قوس بلند در این تصویر مشاهده می‌شود



شکل شماره ۲- وجود چین‌های پوستی در قسمت پشت و بازوها قابل مشاهده است.

در شکم فتق نافی واضح و در معاینه اندامها، محدودیت حرکت در مفصل ران به صورت دو طرفه وجود داشت. در معاینه قلب و ریه‌ها نکته غیرطبیعی دیده نشد.

پاتوژنیز بیماری بخوبی شناخته نشده است. اختلالاتی که در این بیماری وجود دارد شامل افزایش تخریب آنزیمی الاستین، کاهش مقدار آنزیم وقفه دهنده الاستاز و کاهش mRNA الاستین در فیبروبلاست‌ها می‌باشد(۴).

این بیماری ممکن است با مراحل آخر سندروم اهلردانلس اشتباه شود. در این سندروم پوست وسیع است اما شل نیست و بافت کلازن اشکال دارد در حالی که در کوتیس لاسا کلازن طبیعی می‌باشد.

معرفی بیمار

بیمار شیرخواری ۵ ماهه و دختر، با وزن ۷ کیلوگرم بود که به علت قیافه غیرطبیعی، توسط والدین به بیمارستان آورده شده بود.

شیرخوار حاصل حاملگی دوقلو بود که به طریق طبیعی متولد گردیده بود. قل اول در بدو تولد با علت نامعلومی فوت کرده بود و قل دوم که بیمار مورد نظر می‌باشد، با تشخیص سپتی سمی به علت شیرنخوردن و بی‌حالی به مدت ۱ هفته در بیمارستان محل تولدش تحت درمان قرار گرفته بود. پدر و مادر بیمار دختر خاله و پسر خاله بودند.

سابقه بیماری مشابه در فامیل وجود نداشت و این شیرخوار تنها فرزند خانواده بود.

در معاینه فیزیکی، پوست بدن دارای چین‌های متعدد بود بطوری که در ناحیه گونه‌ها و چانه آویزان و در مجموع مانند لباسی گشاد برای شیرخوار جلب توجه می‌کرد.

سر نورموسفال، فوتانله سا بازتر از معمول، درزهای جمجمه جدا از هم و کرانیوتاپس در جمجمه قابل لمس بود.

هایپرتلوریسم، چین اپی‌کانتال در چشم، شیار پلکی آنتی‌مونگلوبلین، فیلتروم بلند، بینی قلابی شکل با سوراخهای برگشته به بالا و قوس بلند کام نیز مشاهده گردید(تصاویر شماره ۱-۳).

رادیوگرافی لگن در رفتگی دو طرفه مفصل ران را نشان داد که این بیماری با در رفتگی دو طرفه مفصل ران کمتر گزارش شده است^(۲)(تصویر شماره ۴). آزمایشات انجام شده شامل، CBC، کلسیم، فسفر، آلكالن فسفاتاز، کامل ادرار، کشت ادرار و تستهای تیروئیدی طبیعی بود. در بیوپسی پوست، کاهش بافت الاستیک و طبیعی بودن بافت کلاژن مشاهده گردید که با تشخیص کوتیس لاکسا مطابقت داشت.

بحث

کوتیس لاکسا بیماری نادر پوستی است که علامت بالینی آن پوست شل و آویزان و علامت هیستولوژیک آن کاهش یا فقدان بافت الاستیک در درم است.^۳ شکل بیماری مشخص شده است که عبارتند از: ۱- شکل اتوزومال غالب، ۲- اتوزومال مغلوب و ۳- شکل اکتسابی. با توجه به نسبت فامیلی والدین و علائم بالینی بیمار، به نظر می‌رسد عارضه از نوع اتوزومال مغلوب باشد. در این بیمار علاوه بر علائم ذکر شده در بالا، در رفتگی دو طرفه مفصل ران نیز مشاهده شد که این در رفتگی کاهی همراه با این بیماری دیده می‌شود. با توجه به اینکه اغلب، چنین بیمارانی دچار عقب افتادگی ذهنی نیز هستند، در بررسی بیمار ما مشخص گردید که خوشبختانه تاکنون از نظر ذهنی، مشکلی وجود نداشته است.

منابع

- 1- Fitzpatrick Thomas B., Eielsen Arthur Z., Freedberg Iruin M., Dermatology in general medicine 5 nd ed, New York, McGrawHill 1999, PP:1845-46.
- 2- مجتبه‌زاده، فریدون و همکاران. Cutis Laxa درمان، ۱۳۷۰، ۹ (مسلسل ۹۷): ۱۸-۱۹.
- 3- Rook Wilkinson Elbing. Textbook of dermatology, 6 nd edition, volume III United Kingdom, Black-Well, 1998, PP: 2019-20.
- 4- Gary L., Darmstadt. The skin in Behrman, klieyman, Jenson edited Nelson Textbook of pediatrics, 16 nd edition Philadelphia-Pennsylvania-W.B Saunders, 2000, PP: 2013.

در رادیوگرافی قفسه سینه، سایه قلب و ریه طبیعی بود و در اکوکاردیوگرافی مشکلی وجود نداشت.



شکل شماره ۳- در این شکل فقط نافی، چین‌های پوستی در تمام بدن، قیafe مخصوص و هیپرتلوریسم دیده می‌شود.



شکل شماره ۴- در این شکل محدودیت شدید حرکتی در معاینه لگن مشاهده می‌شود.

CUTIS LAXA IN AN INFANT WITH BILATERAL DISLOCATION OF HIP

I
A.A. Abdi, MD

ABSTRACT

Cutis laxa is a congenital disorder transmitted as autosomal recessive and dominate trait. This disorder has an acquired form that develops after febrile illness or skin inflammatory disease. A 5 month old girl with generalized loose skin and these facial features including a hooked nose with everted nostrils, long filiform, high arch palate, wide fontanelles, hypertelorism, epicantal folds and antimongloid slants in eyes and umbilical hernia was presented. CXR and echocardiography was normal X-Ray of the hips show bilateral dislocation. Lab study results including CBC, P, Ca, ALP, thyroid function test, U/A and U/C were normal. Pathology study of skin biopsy was compatible with cutis laxa.

Key Words: 1) Dermatomegaly 2) Bilateral Dislocation of Hip 3) Wide Fontanelles

I) Assistant professor of pediatrics Disease, Rasool Akram hospital, Satarkhan St., Niayesh, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.