



تأثیر مکمل کافئین - آب چغندر بر NTproBNP و IL-6 به دنبالیک دوره فعالیت هوایی در دوندگان حرفه‌ای

استقاماتی

مازیار عزیزی سعادتلو: دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

ID احمد عبدی: دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران (نویسنده مسئول) a.abdi58@gmail.com

جواد مهربانی: دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

آسیه عباسی دلوبی: دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

کلیدواژه‌ها

کافئین-آب چغندر،
فعالیت ورزشی،
قلبی عروق،
دوندگان استقاماتی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

زمینه و هدف: بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و شناخت عوامل پاتولوژیکی قلبی هنگام فعالیت‌های ورزشی استقاماتی می‌تواند زمینه مناسبی را در شناسایی ورزشکارانی که در معرض خطر هستند، فراهم کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مکمل کافئین-نیترات بر NTproBNP و IL-6 به دنبال یک دوره فعالیت هوایی در دوندگان حرفه‌ای استقاماتی بود.

روش کار: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی- میدانی آزمایشگاهی بود، ۱۵ دونده نخبه مرد با میانگین سنی 27 ± 3 سال، میانگین قد 176 ± 7 سانتی‌متر و میانگین وزن 69 ± 7 کیلوگرم تشکیل شد. متغیرهای مورد مطالعه شامل توانایی انجام فعالیت ورزشی (ml/kg/min)، میانگین دوز پایین 42 ± 6 و داکتر اکسیژن مصرفی ($\dot{V}O_2$) بود. میانگین دوز بالا 65 ± 6 میلی‌مول نیترات و 400 ± 48 میلی‌گرم کافئین، دارو نما تقسیم شدند. آزمودنی‌ها از هفت روز قبل از آزمون، روزانه دو بار مکمل را به همراه آسیسی سی آب مصرف کردند. فعالیت ورزشی هوایی شامل دوین روزی ترددیل به مسافت ۵ کیلومتر بود.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که مصرف مکمل تأثیر معناداری بر میزان NTproBNP ($p=0.001$) نداشته، ولی باعث کاهش IL-6 ($p=0.021$) شد. همچنین یک جلسه فعالیت ورزشی سبب افزایش معنی‌داری در سطح $p<0.05$ NTproBNP و IL-6 ($p=0.071$) شده و مصرف مکمل بعد از هفت روز سبب کاهش سطح NTproBNP ($p=0.092$) و IL-6 ($p=0.071$) به دنبال فعالیت ورزشی شد.

نتیجه‌گیری: افزایش معنی‌دار مقادیر NTproBNP و IL-6 بالا فاصله بعد از فعالیت و کاهش معنی‌دار آن‌ها بعد از هفت روز همراه با مصرف مکمل کافئین-نیترات، نشان دهنده این بود که استفاده از مکمل کافئین-نیترات باعث بهبود اختلال قلبی ناشی از فعالیت ورزشی شدید می‌شود.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت‌کننده: حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Azizi Saadatloo M, Abdi A, Mehrabani J, Abbassi Daloii A. The Effect of Caffeine-Beet Supplementation on NTproBNP and IL-6 Following a Course of Aerobic Activity in Professional Endurance Runners. Razi J Med Sci. 2022;29(2):102-116.

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است.



Original Article

The Effect of Caffeine-Beet Supplementation on NTproBNP and IL-6 Following a Course of Aerobic Activity in Professional Endurance Runners

Maziar Azizi Saadatloo: PhD student, Department of Sports Physiology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

Ahmad Abdi: Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran (* Corresponding author) a.abdi58@gmail.com

Javad Mehrabani: Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Gilan University, Rasht, Iran

Asieh Abbassi Daloii: Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

Abstract

Background & Aims: The study of physiological characteristics and recognition of cardiac pathological factors during exercise and endurance activities can provide a good background in identifying athletes who are at risk. NTproBNP has been reported as a biological marker for the diagnosis of heart failure and disease progression in response to increased stress on the heart wall, increased volume, ventricular and atrial pressure, and other conditions such as ischemia or myocardial infarction and in response to various signals. Increased myocardial infarction On the other hand, several studies have shown that elevated cytokines, particularly IL-6, severely modulate cardiac function and can lead to myocyte damage. Increased plasma IL-6 levels during exercise are associated with left ventricular dysfunction and are an important factor in the development of heart failure. It was a professional profession.

Methods: The method of this research is laboratory, cross-sectional, laboratory, cross-sectional, and three-blind, by randomly selecting professional runners with the aim of investigating the effect of caffeine and beet juice supplementation on nitrate on NTproBNP and IL-6 followed by a course of aerobic activity was performed in professional endurance runners. 15 elite male runners with a mean age of 27.5 ± 3.8, mean height of 176.7 ± 7.7, mean weight of 69.9 ± 7.8 and body mass index of 22.3 ± 1.5 and maximum oxygen consumption (ml / kg / min) Select 5.2 ± 4.6 and randomly, into three groups: 1) High dose (9.6 mmol nitrate and 400 mg caffeine), 2) Low dose (4.8 and 200) and 3) Placebos were divided. Subjects consumed the supplement twice daily with 250 cc of water for seven days before the test. Aerobic exercise included running on a treadmill for 5 km. Plasma concentration of NTproBNP was measured in picograms per ml (pg / ml) and by electrochemiluminescence immunoassay (Elecsys NTproBNP 2010) with a sensitivity of 125 pg / ml. Plasma IL-6 was measured by BMS213HS kit with a sensitivity of 0.02 pg / ml and the results were shown in picograms per ml. Beet powder in powder form Beet powder Sun Say extract completely herbal and organic without sugar, gluten and other preservatives and synthetic chemicals and license made 10645/14 and caffeine in powder form made by Karen company and natural beet juice placebo It was examined by a food quality control laboratory and determined as a placebo with a little basic nitrate. The supplements were combined in three forms by the researcher's colleague in water and provided to the researcher as a solution for consumption. Random help supplement: 1) 9.6 mmol beet extract

Keywords

Caffeine-Beet
Supplementation,
Aerobic Activity,
Cardiovascular,
Endurance Runners

Received: 05/03/2022

Published: 30/04/2022

and 400 mg caffeine for high dose group, 2) 4.8 mmol beet extract and 200 mg caffeine for low dose group and 3) placebo water Natural beets were obtained for the placebo group.

Results: The results showed that supplementation had no significant effect on NTproBNP ($p = 0.821$), but decreased IL-6 ($p = 0.001$). Also, one session of exercise significantly increased the levels of NTproBNP ($p < 0.05$) and IL-6 ($p < 0.05$) and supplementation after seven days decreased the levels of NTproBNP ($p = 0.071$) and IL-6 ($p = 0.092$) followed by sports activities.

Conclusion: Considering the increase in plasma levels of NTproBNP and IL-6 immediately after exercise intervention and their significant decrease seven days after intervention, it can be said that due to doubts about the increase in these parameters after exercise, an activity with such a temporal and intense nature does not seem to lead to harm. However, the greater intensity in competitions and the effect of repetition of this training pattern in the long run cannot be ignored and it is suggested that in addition to interpreting the study results of plasma levels of NTproBNP and IL-6 in athletes, comprehensive cardiological studies and physiological factors affect Examine the secretion of these markers in other endurance sports activities for more accurate information on the physiological function of athletes' hearts during endurance sports activities. Also, due to the lack of significant effect of caffeine nitrate supplement on NTproBNP and significant reduction of this supplement on IL-6 after intense and short anaerobic exercise, it is not possible to be confident about taking caffeine-nitrate supplement to control inflammatory factors after intense anaerobic exercise. Commented; However, taking this supplement, due to its anti-oxidant properties and findings based on previous studies, will probably be somewhat beneficial for athletes who train hard. It may need to be used for a longer period of time to be more effective, and more studies are needed to find out more about the anti-inflammatory effects of caffeine-nitrate supplementation in humans. The limitations of this study were low number of samples, duration of sports intervention, lack of control over mental states and motivation of the subjects. Also, although the subjects were given a 24-hour reminder form, it was not possible to precisely control their feeding. In general, according to the findings of the present study and regardless of its limitations and considering the precautionary aspects, it can be recommended to young athletes that they can use caffeine-nitrate supplement to modulate cardiovascular risk factors.

Conflicts of interest: None

Funding: None

Cite this article as:

Azizi Saadatloo M, Abdi A, Mehrabani J, Abbassi Dalooi A. The Effect of Caffeine-Beet Supplementation on NTproBNP and IL-6 Following a Course of Aerobic Activity in Professional Endurance Runners. Razi J Med Sci. 2022;29(2):102-116.

*This work is published under CC BY-NC-SA 3.0 licence.

مقدمه

معرفی شده و در پاسخ به سیگنال‌های مختلف از جمله تنش بیش از حد میوکارد افزایش می‌یابد (۹). نتایج مطالعات نشان می‌دهند فعالیت ورزشی، غلظت پلاسمازی NTproBNP را هم چون غلظت‌های تروپین‌های قلبی در ورزشکاران به ظاهر سالم افزایش می‌دهد (۱۰). مکانیزم‌های ضد و نقیضی درباره افزایش NTproBNP و تروپین‌های قلبی ناشی از ورزش در افراد سالم مطرح شده است. اوهبا (Ohba) و همکارانش (۲۰۰۱) اولین کسانی بودند که پاسخ NTproBNP را به تمرینات شدید و طولانی مدت بررسی کردند. آن‌ها دریافتند افزایش غلظت NTproBNP در ۱۰ دونده فوق ماراتون با افزایش میزان TnT در ارتباط می‌باشد و فرض کردند این پدیده ناشی از نکروز سلول‌های قلبی است (۱۱). اسشاره‌گ (Scharhag) و همکارانش (۲۰۱۳)، (۲۰۱۶) و کونیگ (Konig) و همکارانش (۲۰۱۴) افزایش معنی‌دار میزان پلاسمازی NTproBNP را گزارش کردند. این افزایش، هنگام فعالیت‌های استقامتی بسیار شدید ناشی از نارسایی و اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و پاسخ فیزیولوژیکی قلب ورزشکاران بدون اهمیت پاتولوژیکی بود (۱۲ و ۱۳).

ویویان (Viviane) و همکارانش (۲۰۱۴)، پاسینو (Passino) و همکارانش (۲۰۱۵) و فیلیو (Fillippo) و همکارانش (۲۰۱۸)، تاثیر معنی‌دار برنامه تمرینی استقامتی را بر میزان NTproBNP گزارش کرده‌اند (۱۴، ۱۵، ۱۶). از سویی دیگر چندین مطالعه ثابت کرده‌اند که افزایش سایتوکاین‌ها به ویژه IL-6، عملکرد قلبی را به شدت تعدیل کرده و می‌تواند به آسیب میوسیت‌ها منجر شود (۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱). افزایش میزان پلاسمازی IL-6 طی فعالیت ورزشی با میزان اختلال عملکرد بطن چپ ارتباط داشته و یک عامل مهم در پیشرفت نارسایی قلبی می‌باشد (۱۸). نیمن (Nieman) و همکارانش (۲۰۱۵) ارتباط بین افزایش میزان IL-6 و آسیب عضله را هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت گزارش کرده‌اند (۱۹). چن (Chen) و همکارانش (۲۰۱۸) نیز از نقش سایتوکاین‌ها در پاسخ به فرایندهای التهابی و آسیب عضله حمایت کرده‌اند (۲۰)؛ اما استرووسکی (Ostrowski) و همکارانش (۲۰۱۰)، ارتباطی بین میزان IL-6 و آسیب عضله در ورزشکاران گزارش نکرده‌اند که با نتایج پژوهش‌های پیشین

فعالیت‌بدنی روزانه در پیشگیری و معالجه بسیاری از بیماری‌های مزمن شایع به ویژه سیستم قلبی عروقی بسیار مفید است. با این وجود تمرینات استقامتی شدید و بیش از اندازه ممکن است باعث بازسازی منفی ساختار قلب و شریان‌های بزرگ شود. داده‌های نشان می‌دهد که تمرینات مزمن و شرکت در مسابقات استقامتی شدید مانند ماراتن، فوق‌ماراتن، سه‌گله، مسابقه دوچرخه با مسافت بسیار طولانی، می‌تواند باعث اضافه‌بار حاد وقت دهلیز و بطن راست و افزایش کاهش موقتی در کسر تخلیه بطن راست و افزایش بیومارکرهای قلبی همراه است. به نظر این اختلالات طی ۷ تا ۱۰ روز بعد از فعالیت ورزشی به حالت عادی بر می‌گردد. در ورزشکاران استقامتی نخ به آسیب و ترمیم میوکارد ممکن است منجر به فیبروز میوکارد، به ویژه در دهلیز شود. علاوه بر این، تمرینات استقامتی مزمن، بیش از حد، طولانی و پر فشار ممکن است با اختلال عملکرد دیاستولیک، سفت شدن دیواره شریان‌های بزرگ و کلسیفیکاسیون عروق کرونر همراه باشد (۱). مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهند، ورزشکاران لزوماً در مقابل بیماری‌های قلبی مصونیت ندارند. لذا ممکن است فرد در هر سطحی از آمادگی بدنبال دچار نوعی اختلال در عملکرد قلبی شود و از طرفی ممکن است برخی از مشکلات و اختلالات جسمی صرفاً بر اثر فعالیت‌بدنی در فرد به وجود آید. آغاز خستگی قلبی با اختلال انقباض موقتی پس از اتمام فعالیت‌های ورزشی همراه با مدارکی مبنی بر آسیب میوسیت‌های قلبی نشان داده شده است. در صورت نکروز عضله قلبی تعدادی از پروتئین‌ها به نام شاخص‌های آسیب قلبی تا حد زیادی از عضله قلب نکروتیک به پلاسمای خون NTproBNP ترشح می‌شوند (۲، ۳، ۴). رایج‌ترین آن‌ها IL6 و IL6 هستند. این شاخص‌ها از حساسیت ویژگی بالایی در تشخیص آسیب عضله قلبی و انفارکتوس برخوردارند (۵، ۶، ۷) و غلظت آن‌ها با میزان و شدت آسیب قلبی ارتباط دارد (۸).

NTproBNP به عنوان نشانگرهای بیولوژیک برای تشخیص نارسایی قلبی و پیشرفت بیماری در پاسخ به افزایش استرس در دیواره قلب، افزایش حجم، فشار بطن و دهلیز و سایر شرایط مانند ایسکمی یا التهاب میوکارد

حفظ و نگهداری اثر محرک کافئین بر دستگاه عصبی مرکزی می‌شود (۲۷).

در پژوهشی که توسط یون (Yoon) و همکاران (۲۰۱۶) بر روی نشانگرهای آسیب قلبی در دوندگان استقامتی ماراتن و اولترا ماراتن پس از مسابقه انجام شد میزان NTproBNP بعد از مسابقه افزایش پیدا کرده بود همچنین در افرادی که در مسابقات اولtra ماراتن شرکت کردند نسبت به افرادی که در مسابقه ماراتن شرکت کردند این افزایش به میزان بیشتری بود (۲۸). در تحقیقی که توسط وسال (Vassalle) و همکاران (۲۰۱۷) انجام شد به بررسی بیومارکرهای قلبی جدید و قدیمی در دوندگان نمیه استقامت پرداختند در این تحقیق ۱۵ دونده نیمه ماراتن مرد با رده سنی 6 ± 46 سال شرکت کردند نمونه های خونی قبل، بعد و در زمان ریکاوری (۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از دویدن) جمع آوری شد نتایج این تحقیق نشان داد بیومارکرهای cTnT و NT-proBNP و IL-6 به طور موقت پس از مسابقه افزایش یافت ولی در ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت نرمال بود این افزایش ممکن است استرس موقتی بر روی میوسیت نشان دهد. با این حال، با افزایش همه نشانگرهای زیستی متوسط و برگشت پذیر، ممکن است یک واکنش فیزیولوژیکی به ورزش حاد باشد (۲۹). در پژوهشی که توسط گریج و همکاران (۲۰۱۵) انجام شد به بررسی رابطه بین سایتوکاین های التهابی و شاخص های اختلال عملکرد قلبی به دنبال تمرین استقامتی شدید پرداختند. در این تحقیق ۴۰ ورزشکار استقامتی آموزش دیده شرکت کردند ورزشکاران در ۲ نقطه زمانی مورد بررسی قرار گرفتند: ۱) در ابتدا در سه هفته قبل از رویداد استقامتی در طی تمرین منظم اما بعد از ۳-۲ روز تمرین نسبتاً سبک و ۲) بلافاصله (۰-۱۰ دقیقه) پس از مسابقه. نتایج این تحقیق نشان داد IL-6، IL-10 و IL-8 نسبت به قبل از شروع مسابقه به ترتیب ۷.۱، ۸.۵ و ۲.۹ برابر افزایش داشتند همچنین افزایش TNF-alpha پس از مسابقه دیده شد اختلال عملکرد قلبی به دنبال ورزش استقامتی شدید با افزایش بیان سایتوکاین های التهابی همراه بود. این رابطه علت و معلولی را اثبات نمی کند، اما دلیل دیگری برای بررسی بیشتر در

متناقض است (۲۱); بنابراین تاثیر فعالیت های شدید بالگوی متفاوت و با مدت زمانی متفاوت بر این شاخص های قلبی می تواند، جنبه های جدیدی از تاثیر این نوع فعالیت را بر پاسخ های التهابی روشن کند. از طرف دیگر مطالعات نشان داده که برخی گیاهان در کنترل آسیب قلبی از طریق تعدیل برخی شاخص های آسیب قلبی و سایتوکاین های التهابی نقش دارند. چغندر با نام علمی Beta Valgaris عموماً بومی مناطق استوایی و زیر استوایی است. آب چغندر همچنین به عنوان درمان دارویی امیدوار کننده در طیف وسیعی از آسیب های بالینی مرتبط با استرس اکسیداتیو التهاب در نظر گرفته می شود. مواد تشکیل دهنده آن، به ویژه رنگدانه های بتالین، نشان دهنده فعالیت آنتی اکسیدان قوی، ضد التهابی آن می باشد (۲۲). تحقیقات اخیر نشان داده است که خواص یک رژیم غذایی غنی از غذاهای گیاهی به خصوص سبزیجات برگ سبز و سبزیجات ریشه ای با مقدار بالای نیترات ممکن است برای سلامت قلب و عروق مفید باشد (۲۳). در پژوهشی نشان داده شده که ۲۵۰ گرم چغندر پخته یا خام که به مدت ۲ هفته به افراد سالم داده می شود، نشانگرهای زیستی التهاب سیستمیک و اختلال اندوتیال را از جمله E-ICAM-1، hsCRP، TNF- α , IL-6, selectin VCAM-1 را کاهش می دهد (۲۲). به طور کلی، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اثرات بالقوه سودمند نیترات بر روی نشانگرهای التهابی، به ویژه در افراد در معرض خطر با سطح بالای نشانگرهای التهابی مانند CRP وجود دارد (۲۳). علاوه بر این، کافئین یکی از پر کاربرد ترین مکمل های ارگوژنیک در دنیاست که به صورت صدها مکمل غذایی مانند کپسول، قرص و پودر عرضه می شود. به طور خاص، کافئین به عنوان عامل تجزیه کننده چربی که برای آزاد سازی اسیدهای چرب از انبارهای ذخیره شده آن مفید است، توصیف می شود (۲۵). مطالعات نشان داده است که مصرف کافئین (۳-۶ میلی گرم) در کیلوگرم باعث کاهش روند خستگی در طی تمرین شدید می شود (۲۶). علاوه بر این، نشان داده شده است که کافئین موجب کاهش درک تلاش هنگام تمرین ورزشی به واسطه اثر ارگوژنیکی از طریق

قلب ورزشکاران هنگام فعالیت‌های ورزشی استقامتی به همراه مصرف مکمل مخلوط کافئین و آب‌چغندر و شناخت عوامل پاتولوژیکی قلبی می‌تواند زمینه منطقی مناسبی را در شناسایی ورزشکارانی که در معرض خطر هستند فراهم کند. با این فرض که ورزش دو میدانی، فعالیت ورزشی استقامتی با ماهیت تداومی است و قلب همواره فشار مداومی را هنگام فعالیت ورزشی استقامتی در مدت زمان طولانی تحمل می‌کند، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر فعالیت ورزشی همراه با مکمل سازی ترکیبی کافئین و آب‌چغندر بر نشانگرهای بیوشیمیایی (NTproBNP و IL6) در دوندگان نخبه می‌باشد.

روش کار

روش این پژوهش، نیمه تجربی-میدانی آزمایشگاهی و مقطعی، متقطع و سه سوکور، با با انتخاب هدفمند دوندگان حرفه‌ای به صورت تصادفی و با هدف بررسی تاثیر مکمل مخلوط کافئین و آب‌چغندر حاوی نیترات بر NTproBNP و IL-6 به دنبال یک دوره فعالیت هوایی در دوندگان حرفه‌ای استقامتی انجام شد.

جامعه آماری شامل ۱۵ دوندگان حرفه‌ای مرد، سالم و مورد تائید متخصص قلب و عروق در رشته دو استقامتی که به صورت حرفه‌ای فعالیت داشتند و حداقل ۲ سال سابقه دویدن در مسافت‌های طولانی همراه با ۳ جلسه تمرینی در هفته در مجموعه ورزشی شهید شیروودی تهران داشتند انتخاب شدند که توانایی طی کردن پروتکل تا انتهای را با حداکثر توان خود داشتند و نیز پرسشنامه تخصصی معاینات قلبی عروقی را تکمیل کرده و رضایت نامه کتبی را جهت مشارکت تا پایان مطالعه تکمیل و امضا نمودند که مشخصات ویژگی‌های فیزیولوژیک آن‌ها در جدول (۱) آورده شده است. آزمودنی‌ها پس از انجام جلسه آشنایی به طور تصادفی به ۳ گروه: ۱) گروه مکمل با دوز بالا، ۲) گروه مکمل با دوز پایین و ۳) گروه دارونما، تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در صورت داشتن سابقه بیماری متابولیک، سابقه استعمال دخانیات، عدم تحمل مصرف آب‌چغندر، کافئین و یا محرك‌های طبیعی دیگر واستفاده از دارو

مورد اینکه آیا التهاب اختلال عملکرد میوکارد ناشی از ورزش را ایجاد می‌کند، فراهم می‌کند. پژوهشی که توسط پدرو همکاران (۲۰۱۳) انجام شد به بررسی تأثیر کافئین بر پاسخ التهابی ناشی از یک مسابقه دوازده کیلومتری پرداختند نتایج نشان داد ورزش باعث افزایش قابل توجهی در سطح پلاسمای IL-6 و 10 و افزایش بیشتر در گروه کافئین است. مکمل کافئین در پاسخ به ورزش باعث افزایش سطح IL-6 و 10 می‌شود و باعث افزایش پاسخ ضد التهابی می‌شود. افزایش کافئین در آدرنالین ناشی از کافئین می‌تواند مسئول افزایش بیشتر در سطح IL-6 و همچنین افزایش سطح لاکتات باشد. علاوه بر این، کافئین به نظر می‌رسد استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش را افزایش می‌دهد (۳۰). در تحقیقی که توسط بورسما و همکاران (۲۰۱۴) انجام شد با عنوان مکمل آب‌چغندر باعث بهبود عملکرد دوندگان ۱۵۰۰ متری نخبه نمی‌شود. در این تحقیق هشت مرد دونده ۱۵۰۰ متر شرکت کردند افراد در گروه‌های آب‌چغندر و آب‌چغندر بدون نیترات (دارونما) قرار گرفتند. در روز‌های ۱ (حداد) و روز ۸ (مزمن) و روز ۱۴ (دارونما) استفاده کردند و با دویدن بر روی تردミل زیر بیشه و دویدن ۱۵۰۰ متر تایم تریل داخل سالن تکمیل کردند. نتایج این تحقیق نشان داد نیترات پلاسمای در مصرف حداد و مزمن افزایش پیدا کرده. هیچ اختلافی در $\text{VO}_{2\text{peak}}$ بین شرایط ۰.۵٪ و ۰.۶۵٪ وجود نداشت. مکمل آب‌چغندر حداد و مزمن باعث بهبود دویدن $\text{VO}_{2\text{peak}}$ یا بهبود عملکرد ۱۵۰۰ متر تایم تریل در دوندگان نخبه نمی‌شود (۳۱). با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که مصرف مجزای کافئین و آب‌چغندر قبل از تمرین، باعث کاهش نشانگرهای التهابی و سایتوکاین‌ها از طریق مکانیزم‌های مختلف می‌شود، احتمال دارد تأثیر ترکیب این دو مکمل به طور بالقوه بتواند باعث بهبود فزاینده شاخص‌های خطرساز قلبی - عروقی شود. به عبارتی فرض ما این است که خوردن آب‌چغندر و کافئین قبل از تمرین ورزشی می‌تواند این شاخص‌ها را نسبت به مصرف آب‌چغندر و کافئین به تنها یی، بیشتر بهبود ببخشد که این مساله برای ورزشکاران بسیار سودمند است. به نظر می‌رسد بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیکی

گیری ضربان قلب، فشار خون و خون گیری ۱ دقیقه بعد از اتمام فعالیت صورت گرفت.

میزان غلظت پلاسمایی NTproBNP بر حسب پیکوگرم بر میلی لیتر (pg/ml) و به وسیله دستگاه Elecsys NT-2010 (pg/ml) با حساسیت ۱۲۵ ۰/۰۲ BMS213HS شد. اندازه گیری میزان پلاسمایی IL-6 به وسیله کیت BMS213HS با حساسیت ۰/۰۲ pg/ml انجام شد که نتایج به صورت پیکوگرم بر میلی لیتر نشان داده می‌شد.

عصاره چغندر به صورت پودر عصاره شرکت سن سای (Beet powder Sun Say) کاملاً گیاهی و ارگانیک بدون شکر، گلوتن و سایر مواد نگهدارنده و مواد شیمیایی مصنوعی و پروانه ساخت ۱۴/۱۰۶۴۵ و کافئین به صورت پودر ساخت شرکت کارن و دارونما آب چغندر طبیعی بود که توسط آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی بررسی و با اندازه نیترات پایه به عنوان پلاسبو تعیین شد. مکمل‌ها به صورت سه سو کور توسط همکار محقق در آب ترکیب و به صورت محلول برای مصرف آزمودنی‌ها در اختیار محقق قرار گرفت. مکمل یاری به صورت تصادفی: ۱) ۹/۶ میلی مول عصاره چغندر و ۴۰۰ میلی گرم کافئین برای گروه با دوز بالا، ۲) ۴/۸ میلی مول عصاره چغندر و ۲۰۰ میلی گرم کافئین برای گروه با دوز پایین و ۳) پلاسپو آب چغندر طبیعی برای گروه دارونما، انجام گرفت.

پروتکل فعالیت بدنه: دویden ۵ کیلومتر به عنوان آزمون فعالیت هوایی در نظر گرفته شد. در روز اول، ضربان قلب و فشار خون قبل از آزمایش دویden ارزیابی شد. نمونه خون وریدی برای ارزیابی متغیرها جمع آوری شد. شرکت کنندگان آزمون دویden را بعد از ۵ دقیقه گرم کردن شروع می‌کنند و در پایان آزمون، تمام لندازه گیری‌ها تکرار شد. در روز دوم، شرکت کنندگان پس از ۵ دقیقه گرم کردن و مصرف مکمل، آزمون دویden را انجام دادند. از روز سوم تا روز ششم، مصرف مکمل ادامه یافت و شرکت کننده از طریق تماس با ما همراه شد. در روز هفتم، ضربان قلب و فشار خون اندازه گیری شد، شرکت کنندگان مکمل‌ها را طبق برچسب‌های گروهی خود ۶۰ دقیقه قبل از

در محدوده زمانی اجرای پژوهش از مطالعه خارج می‌شدند. شرکت کنندگان برای پرهیز از مصرف داروها و مکمل‌های غذایی و برای اجتناب از مصرف غذاهای حاوی نیترات خیلی بالا، ۷۲ ساعت قبل از اجرای پروتکل آموزش داده شدند (به شرکت کنندگان فهرستی از نام غذاهای غنی از نیترات داده شد). علاوه براین، به شرکت کنندگان توصیه شد که از مصرف الکل و موادی مانند آدامس، شربتها، چایی، قهوه و نسکافه و هم چنین اجرای ورزش هوایی به مدت ۲۴ ساعت پیش از پروتکل و تمرینات با وزنه ۷۲ ساعت قبل از اجرای پروتکل و خونگیری اجتناب کنند. پیش از شروع آزمون در روز جلسه آشنایی در مرکز پزشکی و سنجش آکادمی ملی المپیک، ابتدا اهداف، جزئیات و هم چنین خطرات احتمالی اجرای فعالیت برای آزمودنی‌ها تشریح شد و سپس از آن‌ها رضایت نامه کتبی دریافت شد. قد آزمودنی‌ها با دقیقه ۰/۱ سانتی متر به وسیله ی قدر سنج اندازه گیری وزن و درصد چربی و سایر متغیرهای ترکیب بدنه توسط دستگاه آنالیز ترکیب بدنه (Body In Body 220 Analyzer-Composition) مدل آلمان با ۱۰ شد. حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها توسط دستگاه (sports & medical Gas Analyser) مدل Cosmos h/p/cosmos ساخت شرکت Cosmed آلمان با ۱۰ دقیقه گرم کردن و سپس شروع با سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت و با شبیه صفر درصد که هر دقیقه یک کیلومتر به سرعت آن‌ها افزوده گردید و تا زمان رسیدن به واماندگی، لحظه گردید. در روز اجرا، شرکت کنندگان که به صورت تصادفی ساده گروه بندی شده بودند، به صورت ناشتا (۸-۱۰ ساعت) و عدم انجام فعالیت بدنه (حداقل ۴۸ ساعت)، مراجعه و فشار خون و ضربان قلب آن‌ها، به ترتیب با فشار سنج عرقیه ای رزمکس و ضربان سنج دیجیتال، ثبت گردید و سپس از آن‌ها ۵ سی نمونه گیری خون وریدی از ورید اجوف بازویی در حالت نشسته از سیاهه‌گ آنتی کوپیتال ناحیه ساعد به عمل آمد. پس از نمونه گیری اولیه، ۵ دقیقه گرم کردن و شروع دوی ۵ کیلومتر، ثبت RPE در زمان ۱۵۰۰ و ۴۵۰۰ متر، اتصال دستگاه هولتر قلب جهت بررسی وضعیت ضربان قلب طی دو ۵ کیلومتر، اندازه

NTproBNP در همه گروه‌ها بعد از هفت روز مداخله شد ($p < 0.05$) (نمودار ۱)

همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری برای IL-6 بین سه گروه دریافت کننده مکمل قبل و پس از مداخله وجود دارد و به این مفهوم است که ترکیب مکمل آب‌چغندر با کافئین بر سطح IL-6 سرم تأثیر دارد ($p = 0.001$). به علاوه، فعالیت ورزشی سبب افزایش سطح IL-6 در مقایسه با لحظه شروع و سبب کاهش سطح IL-6 در همه گروه‌ها در هفت روز مداخله شد ($p < 0.05$) (نمودار ۲).

بحث

نتایج این پژوهش نشان داد ترکیب مکمل آب‌چغندر با کافئین اثر معنی‌داری بر سطح NTproBNP پلاسما ندارد. با توجه به این که تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ای در رابطه با تأثیر مکمل دهی آب‌چغندر با کافئین بر سطوح NTproBNP صورت نگرفته است و تمامی تحقیقات صورت گرفته به بررسی اثر تمرینات حاد ورزشی در این زمینه پرداخته‌اند، بنابراین یافته‌های محدود و متناقضی در رابطه با این موضوع در دسترس Rokkedal (Rokkedal et al., 2019) (۳۲)، بالسالوبره فرناندز (Ballobre-Fernández et al., 2018) (۳۳)، (Balsalobre-Fernández et al., 2015) (۳۴)، بسکاس (Glaister et al., 2011) (۳۵)، نشان داد که مکمل آب‌چغندر با کافئین فقط در بهبود قدرت، عملکرد ورزشی و بهبود زمان خستگی در ورزشکاران می‌شود و تاثیری بر شاخص‌های قلبی عروقی ندارد که

دویدن جهت اثر مکمل مصرف می‌کردند. در روز هشتم، شرکت کنندگان مکمل مصرف کرده و تست دویدن را انجام دادند. مرحله استراحت از روز ۹ تا ۱۴ آغاز شد و شرکت کنندگان به مدت یک هفته هیچ مکمل دیگری مصرف نکردند. پس از مرحله استراحت، تمام آزمون‌ها همانطور که قبل ذکر شد برای دو آزمایش دیگر تکرار شدند.

روش آماری: جهت تعیین اثر مداخله‌ها و شرایط مختلف ذکر شده روی شاخص‌های پژوهش و همچنین لحاظ کردن همبستگی بین مشاهدات هر فرد در شرایط مختلف آزمایشی، از تحلیل رگرسیونی با اندازه‌گیری‌های تکراری با رویکرد معادلات برآوردی تعمیم‌یافته (Generalized Estimation Equation-GEE) و ساختار همبستگی اتورگرسیون مرتبه اول استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ انجام شد و سطح معنی‌داری در تمام مراحل $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.


یافته‌ها

جدول شماره ۱ ویژگی‌های آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت معناداری برای NTproBNP بین سه گروه دریافت کننده مکمل قبل و پس از مداخله وجود ندارد و به این مفهوم است که ترکیب مکمل آب‌چغندر با کافئین هیچ اثری بر سطح NTproBNP سرم ندارد ($p = 0.821$). به علاوه، فعالیت ورزشی سبب افزایش سطح NTproBNP در مقایسه با لحظه شروع و سبب کاهش سطح

جدول ۱- مشخصات آزمودنی‌ها و متغیرهای فیزیولوژیک

| | سن (سال) |
|----------------|---|
| 3.8 ± 2.7 | |
| 7 ± 1.7 | قد (سانتی متر) |
| 7.8 ± 6.9 | وزن (کیلوگرم) |
| 1.5 ± 2.3 | شاخص نمایه توده بدن (کیلوگرم/متر ²) |
| 4.3 ± 3.4 | توده عضلانی (درصد) |
| 2.3 ± 1.4 | توده چربی (درصد) |
| 4.6 ± 5.2 | حداکثر اکسیژن مصرفی (ml/kg/min) |
| 0.02 ± 0.1 | متabolism استراحتی (Kcal/min) |



دور از هر گونه بیماری بودند و نیز مقدار BMI آن‌ها بیانگر عدم افزایش وزن و چاقی افراد است، احتمالاً مقادیر پایه این شاخص‌ها در این آزمودنی‌ها کمتر از حدی بود که مکمل بتواند پس از هفت روز تاثیرگذار باشد. اگرچه تغییرات ساختاری در عضله قلب نیازمند زمان زیادی است، با این وجود تغییرات NT-proBNP تابع تغییر شکل ساختاری در بطن چپ و فشار وارد به دیواره بطن حین سیستول است (۳۸). هر چند این مشاهدات، ایجاد اختلاف نظر در یک گروه ناهمانگ از آزمایش شونده‌ها با پژوهش حاضر را بیان می‌کند، اما می‌توان اصل تغییر NT-proBNP بعد از فعالیت‌های ورزشی را مربوط به تحريكات مختلفی دانست. همچنین عوامل گوناگونی می‌تواند بر میزان پلاسمایی NT-

با نوعی با نتایج پژوهش حاضر همسو می‌باشد. برخلاف یافته پژوهش حاضر، بورسما (Boersma) و همکاران (۲۰۱۴) (۳۶) وارون (Vernon) و همکاران (۲۰۱۴) (۳۷) نشان دادند مکمل آب چغندر باعث کاهش شاخص‌های آسیب قلبی عروقی در حالت استراحت و در حین ورزش هوایی می‌شود. از دلایل تناقض یافته‌های این مطالعات با نتایج این پژوهش می‌توان به تفاوت‌های گروه مورد مطالعه، روش ارزیابی یا طرح مطالعاتی، مقادیر پایه این شاخص، نوع، شدت، طول مدت دوره و مقدار دوز مصرف مکمل اشاره کرد. شواهد نشان می‌دهد هر قدر مقادیر پایه شاخص‌های التهابی بیشتر باشد، تاثیر تمرین و مکمل بر این شاخص‌ها نیز بارزتر است. در این پژوهش چون آزمودنی‌ها سالم و به

استقاماتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از انقباضات بهتر است از این مکمل استفاده شود.

از دیگر نتایج پژوهش حاضر افزایش سطح پلاسمای NTproBNP به دنبال فعالیت ورزشی در مقایسه با لحظه شروع بود. خلیق فر و همکاران (۲۰۱۱) (۴۲) و فرانک و همکاران (۲۰۱۷) (۴۳) نشان دادند که سطح NT-proBNP به ترتیب ۳ ساعت بعد از فعالیت روی قایقرانان مرد نخبه و ۴ ساعت بعد از فعالیت دوی ۲۱ کیلومتر در جوانان دونده افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد در حین فعالیت ورزشی نیاز بافت عضلانی قلب به جریان خون افزایش می‌یابد و از طرفی حین فعالیت‌های ورزشی به خصوص با شدت بالا، عضله قلب دچار ایسکمی موقت شده و در نتیجه عملکرد بطن مختل شده (۴۴ و ۴۵) و در نهایت منجر به افزایش سطح NT-proBNP می‌شود. به علاوه پژوهشگران افزایش NT-proBNP را نشان دهنده‌ی یک پاسخ فیزیولوژیکی سایتوپروتکیتو (Cytoprotective) به افزایش ناشی از فعالیت ورزشی در فشار بطن پایان دیاستولی و به لحاظ فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی پاسخی به ازدیاد حجم و کشش میوسیت‌ها در نظر گرفته‌اند (۴۳ و ۴۶). افزایش میزان پلاسمایی NTproBNP در پاسخ به ورزش می‌تواند به علت افزایش فشار پرشده بطنی، کشش عضله قلبی و انبساط سرخرگ‌ها به علت افزایش حجم خون مرکزی و افزایش فشار سرخرگی در فعالیت ورزشی باشد بنابراین میزان غلظت پلاسمایی NT-proBNP می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای تفاوت قائل شدن بین تغییرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی قلبی ایجاد شده در ورزشکاران و بیماران قلبی عروقی بکار رود. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد ترکیب مکمل آب چغندر با کافئین تاثیر معنی‌داری بر سطح IL-6 پلاسمما دارد. نتایج یافته‌های وودسان (Woodson) و همکاران (۲۰۱۰) (۳۹)، لیرا (Lira) و همکاران (۲۰۱۷) (۴۰)، عسگری و همکاران (۲۰۱۶) (۴۱) و یغموریان خورجینی و همکاران (۲۰۲۰) به نوعی همسو با یافته‌های پژوهش حاضر می‌باشد که نشان دادند مکمل آب چغندر و کافئین موجب کاهش IL-6 سرم ورزشکاران می‌شود (۴۱). با این وجود کلیفورد (Clifford) و همکاران (۲۰۱۶) (۴۵) در پژوهشی که به بررسی مصرف یک دوره آب چغندر غنی از آنتی اکسیدان بر آسیب عضله در ورزش حین فعالیت ورزشی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که مصرف آب چغندر مقدار پلاسمایی LI-6 را کاهش نمی‌دهد. استفاده از مکمل آب چغندر+ کافئین به عنوان مکمل می‌تواند ضمن ایجاد سازگاری عضلانی، مانع افزایش شاخص‌های آسیب سلوی شود. به واسطه فلاونوئیدها و بیتامین‌های موجود در این مکمل، تعدیل و تقویت سیستم ایمنی از طریق تولید بیشتر آنزیم‌های آنتی اکسیدانی هم صورت می‌گیرد؛ بنابراین کاهش شاخص IL-3 مشاهده می‌شود. همچنین این مکمل می‌تواند اثرات اکسایشی تمرین را از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و کربونیله شدن پروتئین‌ها اعمال کند. البته اثرات ضدالتهابی آن هنوز نامشخص است. لذا سازگاری تمرینی وجود فلاونوئیدها و آنتوسبیانین در این مکمل به عنوان یک مکمل طبیعی و آنتی اکسیدانی موجب تقویت سیستم ایمنی شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود هنگام فعالیت‌های ورزشی بخصوص پروتکل‌های

گذارد. افزایش میزان پلاسمایی NT-proBNP در پاسخ کشش عضلات قلبی و انبساط سرخرگ‌ها به علت افزایش حجم خون مرکزی و افزایش فشار سرخرگی در فعالیت ورزشی باشد بنابراین میزان غلظت پلاسمایی NT-proBNP می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای تفاوت قائل شدن بین تغییرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی قلبی ایجاد شده در ورزشکاران و بیماران قلبی عروقی بکار رود. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد ترکیب مکمل آب چغندر با کافئین تاثیر معنی‌داری بر سطح IL-6 پلاسمما دارد. نتایج یافته‌های وودسان (Woodson) و همکاران (۲۰۱۰) (۳۹)، لیرا (Lira) و همکاران (۲۰۱۷) (۴۰)، عسگری و همکاران (۲۰۱۶) (۴۱) به نوعی همسو با یافته‌های پژوهش حاضر می‌باشد که نشان دادند مکمل آب چغندر و کافئین موجب کاهش IL-6 سرم ورزشکاران می‌شود (۴۱). با این وجود کلیفورد (Clifford) و همکاران (۲۰۱۶) (۴۵) در پژوهشی که به بررسی مصرف یک دوره آب چغندر غنی از آنتی اکسیدان بر آسیب عضله در ورزش حین فعالیت ورزشی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که مصرف آب چغندر مقدار پلاسمایی LI-6 را کاهش نمی‌دهد. استفاده از مکمل آب چغندر+ کافئین به عنوان مکمل می‌تواند ضمن ایجاد سازگاری عضلانی، مانع افزایش شاخص‌های آسیب سلوی شود. به واسطه فلاونوئیدها و بیتامین‌های موجود در این مکمل، تعدیل و تقویت سیستم ایمنی از طریق تولید بیشتر آنزیم‌های آنتی اکسیدانی هم صورت می‌گیرد؛ بنابراین کاهش شاخص IL-3 مشاهده می‌شود. همچنین این مکمل می‌تواند اثرات اکسایشی تمرین را از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و کربونیله شدن پروتئین‌ها اعمال کند. البته اثرات ضدالتهابی آن هنوز نامشخص است. لذا سازگاری تمرینی وجود فلاونوئیدها و آنتی اکسیدانی موجب تقویت سیستم ایمنی شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود هنگام فعالیت‌های ورزشی بخصوص پروتکل‌های

زانو بیش تر تولید می‌شود (۵۶). از این گذشته مشخص شده که رها شدن IL-6 هنگام فعالیت عضلات اسکلتی با شدت فعالیت، دریافت گلوکز و تجمع آدرنالین پلاسمای در ارتباط است (۵۷). همچنین شدت، مدت و نوع فعالیت ورزشی باعث افزایش IL-6 می‌شود که این عوامل به پاسخ سمپاتوآدرنال به ورزش وابسته است. آدرنالین بر اثر استرس قادر به افزایش سطح سرمی -IL-6 پلاسمای در هنگام فعالیت می‌باشد و می‌تواند مقدار ۶ IL-6 را به میزان ۳۰ برابر افزایش دهد (۵۴). افزایش سطح IL-6 یک سازگاری مهم در هنگام و بعد از فعالیت ورزشی می‌باشد که به سرعت رونویسی از ژن IL-6 افزایش می‌یابد (۵۸).

از نتایج دیگر کاهش سطح IL-6 در همه گروه‌ها بعد از هفت روز مداخله بود. کرزیوتی و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقات خود نشان دادند که در مردان فعال، سطح سرمی IL-6 که بعد از ورزش افزایش یافته بود پس از ۱۰ روز کاهش معناداری نشان داد (۵۹). اسپرلیدوس (Ispirlidis) و همکاران (۲۰۱۷) نشان دادند که بلافاصله بعد از مسابقه فوتبال شمار سایتوبکین‌ها (IL-6, IL-1 β) ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از مسابقه روبه کاهش می‌گذارد (۶۰). اندرسون اچ و همکاران (۲۰۱۰) بدنبال دو مسابقه متوالی با فاصله ۷۲ ساعت در زنان فوتبالیست دریافتند که سایتوبکین‌های ترکیبی (IL-6) نیز بعد از اولین و دومین بازی (۲۰-۱۵ دقیقه) افزایش معنی‌دار داشته‌اند. همچنین سطوح لکوستیت‌ها و سایتوبکین‌ها تا ۷ روز بعد از بازی به سطح اولیه خود برگشته است (۶۱).

ورزش دو میدانی فعال کننده قوی دستگاه عصبی مرکزی است و با تحریک مراکز درون ریز مغز و سازوکارهای متابولیکی در گردش خون همراه است، بنابراین ممکن است در تنظیم غلظت چندین هورمون تنظیم کننده اینمی دخیل باشد، به نحوی که افزایش یا کاهش سیستمیک این هورمون‌ها بر بازه تولید سایتوبکین‌هایی همچون IL-6 تاثیر می‌گذارد (۵۷).

قابل ذکر است که اثربخشی مکمل آب چغندر-کافئین با عوامل متعددی همچون طول دوره مکمل یاری، مقدار مکمل قبل از فعالیت ورزشی، دوز مصرف، طول دوره

از فعالیت می‌تواند مربوط به عادت‌های تمرینی و پاسخ تطابقی و سازشی به تمرینات طولانی مدت باشد. برنامه‌های تمرینی طاقت فرسا و استقامتی، توانایی تحریک طاقت عضله قلبی را دارند که با نشانه‌های بیوشیمی از شدت و اختلال عملکرد برگشت ناپذیر قلبی ارتباط ندارند.

نتایج نشان داد فعالیت ورزشی سبب کاهش سطح NTproBNP در همه گروه‌ها بعد از هفت روز مداخله شد. محققان دلایل این کاهش را چنین توصیف می‌کنند با توجه به آن که پاک سازی و تخریب اولیه NT-proBNP و BNP پلاسمای از طریق آندوپیتیدهای خنثی و فیلتراسیون گلومرولی کلیه‌ها صورت می‌گیرد، سرعت تصفیه BNP و NT-proBNP متفاوت گزارش شده است (۴۹). با در نظر گرفتن وزن مولکولی زیاد NT-proBNP و نیمه عمر طولانی آن می‌توان فرض کرد که افزایش غلظت پلاسمایی NT-proBNP بعد از فعالیت ورزشی می‌تواند در پاسخ به سرعت تصفیه ترشح اولیه آن از سوی کلیه‌ها باشد. از طرفی این تاخیر در تصفیه هم می‌تواند ناشی از تغییر نفوذپذیری سلول‌های کلیوی یا اختلال در برداشت آن‌ها باشد که بر سرعت تصفیه کلیوی تاثیر می‌گذارد (۴۱) به همین دلیل غلظت NT-proBNP بعد از یک هفته کاهش پیدا کرده است.

نتایج این پژوهش افزایش سطح IL6 را در مقایسه با لحظه شروع در ورزشکاران نشان داد. نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌ها که تاثیر یک وهله فعالیت را بر پاسخ مقادیر IL-6 در ورزشکاران بررسی کرده بودند، هم خوانی داشت (۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳). یکی از سیتوبکین‌ها می‌باشد که در پاسخ به فعالیت ورزشی خیلی سریع افزایش می‌یابد (۵۴). همچنین IL-6 به گنجایش ذخایر گلیکوژن عضلات حساس است و چون فعالیت ورزشی باعث کاهش ذخایر گلیکوژن می‌شود، این امر با افزایش سطح IL-6 mRNA در ارتباط است (۵۵)؛ بنابراین اتمام گنجایش ذخایر گلیکوژن عضلات یکی از عوامل تولید IL-6 هنگام انقباض عضلات بدن می‌باشد. در دوندگان حرفه‌ای این سیتوبکین در زمان فعالیت اندام‌های پایین تن به خصوص اکستنسورهای

را در دیگر فعالیت‌های ورزشی استقامتی برسی کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از عملکرد فیزیولوژیکی قلبی ورزشکاران هنگام فعالیت‌های ورزشی استقامتی به دست آید. همچنین با توجه به عدم تاثیر معنی‌دار مکمل کافئین نیترات‌بر NTproBNP و کاهش معنی‌دار این مکمل بر IL-6 پس از تمرینات شدید و کوتاه بی‌هوایی، نمی‌توان با اطمینان در مورد مصرف مکمل کافئین- نیترات‌برای کنترل عوامل التهابی پس از تمرینات شدید بی‌هوایی اظهار نظر کرد؛ با این حال، مصرف این مکمل به دلیل داشتن خاصیت ضد اکسایشی و یافته‌های مبتنی بر مطالعات قبل، احتمالاً برای ورزشکارانی که سخت تمرین می‌کنند تا حدودی مفید خواهد بود. احتمالاً برای تاثیر بیشتر این مکمل نیاز به مصرف طولانی مدت تر آن است و برای دستیابی به حقایق بیشتر در زمینه آثار ضد التهابی مکمل مکمل کافئین- نیترات در انسان احتیاج به مطالعات بیشتری می‌باشد. از محدودیت‌های این پژوهش کم بودن تعداد نمونه‌ها، مدت زمان مداخله ورزشی، عدم کنترل حالات روانی و انگیزه آزمودنی‌ها اشاره نمود. همچنین با وجود این که به ازمودنی‌ها فرم یادآمد ۲۴ ساعته داده شده بود، اما کنترل دقیق تغذیه آن‌ها امکان پذیر نبود. در مجموع با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و صرف نظر از محدودیت‌های آن و با در نظر گرفتن جولنوب احتیاط می‌توان به افراد جوان ورزشکار توصیه نمود که به منظور تعديل عوامل خطرساز قلبی - عروقی می‌توانند از مکمل کافئین- نیترات استفاده کنند.

تقدیر و تشکر

این پژوهش در قالب رساله دکتری، با هزینه محققین و با تایید کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم ورزشی با کد IR.GUMS.REC.1398.043 ثبت شده است بدین وسیله نویسندهان تشكر و قدردانی خود را از افراد شرکت کننده در این پژوهش اعلام می‌دارند.

References

- Patil HR, O'Keefe JH, Lavie CJ, Magalski A, Vogel RA, McCullough PA. Cardiovascular damage

فعالیت ورزشی، وضعیت آمادگی بدنی آزمودنی‌ها، شرایط تغذیه‌ای، وضعیت تمرینی آزمودنی‌ها، میزان آشنازی آزمودنی‌ها با نوع فعالیت ورزشی و نیز اثر مصرف مکمل بر پاسخ سایتوکاین‌ها با عواملی همچون دوره مکمل یاری، مقدار مکمل قبل از فعالیت ورزشی، اندازه و سرعت جذب مکمل‌ها هنگام فعالیت ورزشی، رژیم غذایی آزمودنی‌ها قبل و هنگام مطالعه وضعیت تمرینی آزمودنی‌ها و ترکیبی از عوامل فوق ارتباط دارد (۶۲ و ۶۳)؛ بنابراین با توجه به اینکه مکمل یاری بلند مدت این مکمل ممکن است پاسخ التهابی به فعالیت ورزشی را کاهش دهد (۶۴)، طبق یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد مکمل یاری کوتاه مدت آب چغندر - کافئین برای کاهش IL-6 گردد خون قبل و هنگام فعالیت ورزشی شدید کافی است، به طوری که کاهش پاسخ سایتوکاین‌ها پیش التهابی می‌تواند مربوط به خواص ضد التهابی این مکمل باشد. در مجموع می‌نظر می‌رسد که مصرف این مکمل می‌تواند به عنوان یک مکمل ضدالتهابی، اثر موثری بر کاهش سایتوکاین‌ها پیش التهابی IL-6 و در نتیجه بهبود سیستم ایمنی مردان ورزشکار داشته باشد، با توجه به یافته‌های به دست آمده از پژوهش حاضر، ورزشکاران و مربیان ورزشی می‌توانند این مکمل را در برنامه رژیم غذایی خود مصرف کنند.

نتیجه‌گیری

با توجه به افزایش میزان پلاسمایی NTproBNP و IL-6 بلافارسله پس از انجام مداخله ورزشی و کاهش معنی‌دار آن‌ها هفت روز پس از مداخله، می‌توان گفت با توجه به تردیدهایی که درباره افزایش این شاخص‌ها پس از فعالیت‌های ورزشی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که فعالیتی با چنین ماهیت زمانی و شدتی منجر به آسیب شود. با این حال، شدت بیشتر در مسابقات و اثر تکرار این الگوی تمرینی در بلندمدت را نمی‌توان نادیده گرفت و پیشنهاد می‌گردد در کنار تفسیر نتایج مطالعاتی میزان پلاسمایی NTproBNP و IL-6 در ورزشکاران، بررسی‌های همه جانبی کاردیولوژیکی انجام پذیرد و عوامل فیزیولوژیکی موثر در ترشح این نشانگرهای

- resulting from chronic excessive endurance exercise. *Mo Med.* 2012;109(4):312-21.
2. Chen Y, Serfass RC, Mackey-Bojack SM, Kelly KL, Titus JL, Apple F. Cardiac troponin T alterations in myocardium and serum of rats after stressful, prolonged intense exercise. *J App Physiol.* 2010;88:1749-1755.
 3. Banfi G, Milgopian S, Dolci A, Nosed M, Scapellato L, Franzini C. B-type natriuretic peptide in athletes performing on Olympic triathlon. *J Sports Med Phys Fit.* 2015;45:529-531.
 4. Whyte GP, George K, Shrama S, Lymley S, Gates P, Prasad K, Mckenna WJ. Cardiac fatigue following prolonged endurance exercise of different distances. *Med Sci Sport Exer.* 2010;320:1067-1072.
 5. Nancy E, Kathy J. Decision making with cardiac troponin tests. *New Eng J Med.* 2012;346:2079-2082.
 6. Santosh B, Anil S, Nella T. Review articles relevant cardiac biomarkers. *Bombay Hosp J.* 2014;46:319-328.
 7. Sato Y, Kita T, Takastu Y, Kimura T. Biochemical markers of myocyte injury in heart failure. *Heart.* 2014;90:1110-1113.
 8. Townsend PJ, Farza H, Macgeoch C, Spurr NK, Wade R, Gahmann R, et al. Human cardiac troponin identification of fetal isoforms and assignment of the TNNT2 locus to chromosome iq. *Genomic.* 2014;21:311-316.
 9. Rangraz E, Mirzaei B, Nia FR. The Effect of Resistance Training on Serum Levels of NT-proBNP, GDF-15, and Markers of Cardiac Damage in the Elderly Males. *Int J Appl Exerc Physiol.* 2019;8(1):138-148.
 10. Hrmann M, Scharhage Y, Miclea M. Post-race kinetics of cardiac troponin T and I and N-terminal probrain natriuretic peptide in marathon runners. *Clin Chem.* 2013;49:831-834.
 11. Ohba H, Takada H, Musha H, Nagashima J, Mori N, Awaya T, et al. Effect of prolonged strenuous exercise on plasma levels of atrial natriuretic and brain natriuretic peptide in healthy men. *Am Heart J.* 2001;141:751-758.
 12. Scharhag Y, Urhausen A, Schneider G, Herrmann M, Schumacher JK, Haschke M, et al. Reproducibility and clinical significance of exercise-induced increase in cardiac troponins and N-terminal pro brain natriuretic peptide in endurance athletes. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.* 2016;113:388-397.
 13. Konig D, Schumacher YO, Heinrich L, Schmid A, Berg A, Dickhuth HH. Myocardial stress after competitive exercise in professional road cyclists. *Med Sci Sport Exerc.* 2013;35:1679-1683.
 14. Fillippo MS, Tommaso G, Igna zio B, Salvator M, Raffaella R, Massimo S, et al. Effect of physical training on exercise capacity gas exchange and N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in patients with chronic heart failure. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.* 2018;13:812-817.
 15. Passino C, Severino S, Poletti R, Piepoli F, Mammini C, Clerico A, et al. Aerobic training decreases B- type natriuretic peptide expression and adrenergic activation in patients with heart failure. *J Am Coll Car.* 2006;47:1835-1839.
 16. Vaananen HK. Serum carbonic anhydrase HII myoglobin concentration in acute. *MI Clin Chem.* 1990;36:635-638.
 17. Kasapis C, Thompson PD. The effects of physical activity on serum Creative protein and inflammatory markers: a systematic review. *J Am Coll Cardiol.* 2015;45:1563-69.
 18. Kanda T, Takahashi T. Interleukin-6 and cardiovascular diseases. *Jpn Heart J.* 2015;45183-93.
 19. Nieman DC, Dumke CL, Henson DA, McAnulty SR, Gross SJ, Lind RH, et al, editors. Muscle damage is linked to cytokine changes following a 160-km race. *Brain Behav Immun.* 2015;19:398-403.
 20. Chen Y, José Alberto RD, José Manuel FO, Offer A, Moran S, Nir E, et al, editors. IL6 (-174) and TNFA (-308) promoter polymorphisms are associated with systemic creatine kinase response to eccentric exercise. *Eur J Appl Physiol.* 2018;104:579-86.
 21. Ostrowski K, Schjerling P, Pedersen PK. Physical activity and plasma interleukin 6 in humans-effect of intensity exercise. *Eur J Appl Physiol.* 2010;83:512-15.
 22. Asgary S, Afshani MR, Sahebkar A, Keshvari M, Taheri M, Jahanian E, et al. Improvement of hypertension, endothelial function and systemic inflammation following short-term supplementation with red beet (*Beta vulgaris* L.) juice: a randomized crossover pilot study. *J Hum Hypertens.* 2016;30(10):627-632.
 23. Raubenheimer K, Bondonno C, Blekkenhorst L, Wagner KH, Peake JM, Neubauer O. Effects of dietary nitrate on inflammation and immune function, and implications for cardiovascular health. *Nutr Rev.* 2019;77(8):584-599.
 24. Woessner MN, McIlvenna LC, Ortiz de Zevallos J, Neil CJ, Allen JD. Dietary nitrate supplementation in cardiovascular health: an ergogenic aid or exercise therapeutic? *Am J Physiol Heart Circul Physiol.* 2017;314(2):H195-H212.
 25. Clifford T, Howatson G, West D, Stevenson E. The potential benefits of red beetroot supplementation in health and disease. *Nutrients.* 2015;7(4):2801-2822.
 26. Vieira JM, Gutierrez JM, Carvalho FB, Stefanello N, Oliveira L, Cardoso AM, et al. Caffeine and high intensity exercise: Impact on purinergic and cholinergic signalling in lymphocytes and on cytokine levels. *Biomed Pharmacother.* 2018;108:1731-1738.
 27. Handzlik MK, Gleeson M. Likely additive ergogenic effects of combined preexercise dietary nitrate and caffeine ingestion in trained cyclists. *ISRN nutrition.* 2013.
 28. Yoon J, et al. Enhanced lysosomal activity by

- overexpressed aminopeptidase Y in *Saccharomyces cerevisiae*. *Mol Cell Biochem*. 2016;417(1-2):181-9.
29. Vassalle C, Masotti S, Lubrano V, Basta G, Prontera C, Di Cecco P, et al. Traditional and new candidate cardiac biomarkers assessed before, early, and late after half marathon in trained subjects. *Eur J Appl Physiol*. 2018;118(2):411-417.
30. Tauler P, Martinez S, Moreno C, Monjo M, Martinez P, Aguiló A. Effects of caffeine on the inflammatory response induced by a 15-km run competition. *Med Sci Sports Exerc*. 2013;45(7):1269-1276.
31. Boorsma RK, Whitfield J, Spriet LL. Beetroot juice supplementation does not improve performance of elite 1500-m runners. *Med Sci Sports Exerc*. 2014;46(12):2326-2334.
32. Rokkedal-Lausch T, Franch J, Poulsen MK, Thomsen LP, Weitzberg E, Kamavuako EN, et al. Chronic high-dose beetroot juice supplementation improves time trial performance of well-trained cyclists in normoxia and hypoxia. *Nitric Oxide*. 2019;85:44-52.
33. Balsalobre-Fernández C, Romero-Moraleda B, Cupeiro R, Peinado AB, Butragueño J, Benito PJ. The effects of beetroot juice supplementation on exercise economy, rating of perceived exertion and running mechanics in elite distance runners: A double-blinded, randomized study. *PloS One*. 2018;13(7):e0200517.
34. Glaister M, Pattison JR, Muniz-Pumares D, Patterson SD, Foley P. Effects of dietary nitrate, caffeine, and their combination on 20-km cycling time trial performance. *J Strength Cond Res*. 2015;29(1):165-174.
35. Bescós R, Rodríguez FA, Iglesias X, Ferrer MD, Iborra E, Pons A. Acute administration of inorganic nitrate reduces VO₂peak in endurance athletes. *Med Sci Sports Exerc*. 2011;43(10):1979-86.
36. Boorsma RK, Whitfield J, Spriet LL. Beetroot juice supplementation does not improve performance of elite 1500-m runners. *Med Sci Sports Exerc*. 2014;46(12):2326-2334.
37. Vernon B, Bryan H, Curry R, George Adams M. Effects of Nitrate Supplementation on Cardiovascular and Autonomic Reactivity in African-American Females. *Int Scholar Res Notices*. 2014.
38. Berent R, von Duvillard SP, Crouse SF, Auer J, Green JS, Sinzinger H, et al. Shortterm residential cardiac rehabilitation reduces B-type natriuretic peptide. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*. 2009;16:603-8.
39. Woodson J, Phillips M, Ross J, Rola K, Christensen K. Serum IL-6 Is Increased During Performance Cycling After Energy Drink Consumption. In *International Journal of Exercise Science: Conference Proceedings*. 201;2(2):5.
40. Lira FS, dos Santos T, Caldeira RS, Inoue DS, Panissa VL, Cabral-Santos C, ... et al. Short-term high- and moderate-intensity training modifies inflammatory and metabolic factors in response to acute exercise. *Front Physiol*. 2017;8:856.
41. Yaghmourian Khoujini J, Javadi Raad M. Evaluation of caffeine in coffee and its effects on the body and Alzheimer's disease (AD), National Conference on Chocolate, Coffee and Natural Sweeteners, Isfahan. 2020.
42. Khalighfarad S, Gaeini A, Nazarali P. The Effect of Endurance Exercise on Cardiac Stress and Exercise Induced Immune Response in Elite Kayakers. *Razi J Med Sci*. 2011;17(80):8-15. [Persian].
43. Ferank FH, Nie J, George K, Tong TK, Lin H, Shi Q. Impact of a 21- km Run on Cardiac Biomarkers in Adolescent Runners. *J Exerc Sci Fit*. 2017;8(2):61-6.
44. Berent R, von Duvillard SP, Crouse SF, Auer J, Green JS, Sinzinger H, et al. Short-term residential cardiac rehabilitation reduces B-type natriuretic peptide. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*. 2017;16(5):603-8.
45. Conraads VM, Beckers P, Vaes J, Martin M, Van Hoof V, De Maeyer C, et al. Combined endurance/resistance training reduces NT-proBNP levels in patients with chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2014;25(20):1797-805.
46. Tian Y, Nie J, Huang C, George KP. The kinetics of highly sensitive cardiac troponin T release after prolonged treadmill exercise in adolescent and adult athletes. *J Appl Physiol*. 2012;113(3):418- 25.
47. Carranza-Garcia LE, George K, Serrano-Ostariz E, Casado-Arroyo R, Caballero-Navarro AL, Legaz-Arrese A. Cardiac biomarker response to intermittent exercise bouts. *Int J Sports Med*. 2011;35(5):327-31.
48. Leers MP, Schepers R, Baumgarten R. Effects of a long-distance run on cardiac markers in healthy athletes. *Clin Chem Lab Med* 2006;44(8):999-1003.
49. Schou M, Dalsgaard MK, Clemmesen O, Dawson EA, Yoshida CC, Nielsen HB, et al. Kidneys extract BNP and NT - proBNP in healthy young men. *J Appl Physiol*. 2015;99(5):1676-80.
50. Torzewski M, Rist C, Mortensen R .et al. C-reactive protein in the arterial intima role of C-reactive protein receptor-dependent monocyte recruitment in atherosclerosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2010;20(9):2094-99.
51. Bar-or O, Tarnopolsky MA, Timmons BA, et al. Immunological changes in response to exercise: influence of age puberty, and gender. *Puberty. Med Sci Sports Exerc*. 2016;38(2):293-304.
52. Timmons BW. Paediatric exercise immunology: health and clinical applications. *Exerc Immunol Rev* 2005; 11: 108-44. 17. Havel F, Ibrahim KH,

Eslankhani M. Effect on session aerobic on system immune body athletes and adults. Mov. 2013;17:2543. (Persian)

53. King DE, Carek P, Mainous, et al. Inflammatory markers and exercise: differences related to exercise type. Med Sci Sports Exerc. 2013;35(4):575-81.

54. Fischer CP. Interleukin-6 in acute exercise and training: what is the biological relevance? Exerc Immunol Rev. 2016;12:6-33.

55. Carrel LA, McVean JJ, Peterson SE, et al. School-based exercise improves fitness, body composition, insulin sensitivity, and markers of inflammation in non-obese children. J Pediatr Endocrinol Metabol. 2017;22(5):409-15.

56. Siegel AJ, Stec JJ, Lipinska I, et al. Effect of inflammatory and hemostatic marathon running on markers. Am J Cardiol. 2011;88(8):918-20.

57. Steensberg A, Fischer C, Keller C, Pedersen B. "IL-6 enhances plasma IL-1ra, IL-10, and cortisol in humans". Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013;285:E433–E437.

58. Pedersen BK, Steensberg A, Fischer C, et al. Searching for the exercise factor - is IL-6 a candidate? J. Muscle Res Cell Motil. 2013;24(2-3):113-19.

59. Kerasioti E, Stagos D, Jamurtas A, Kiskini A, Koutedakis Y, Goutzourelas N, et al. Anti-inflammatory effects of a special carbohydrate-whey protein cake after exhaustive cycling in humans. Food Chem Toxicol. 2013;61:42-6.

60. Ispirlidis I, Fatouros I, Jamurtas A, Nikolaidis M, Michailidis I, Douroudos I, Margonis K, Chatzinikolaou A, Kalistratos E, Katrabasas I, Alexiou V, Taxildaris K. "Time-course of changes in inflammatory and performance responses following a soccer game". Clin J Sport Med. 2017;18:423-431.

61. Pedersen BK, Steensberg A, Schjerling P. "Muscle-derived interleukin-6: possible biological effects". J Physiol. 2011;536:29-337.

62. Baratpor M, Dabidi Roshan V, Karimi N. Tracking of changes in systemic inflammation following the Oxford resistance exercise and Ginger supplement in male volleyball players. J Practical Studies Biosci Sport. 2013/2014;1(2):21-34. [Persian]

63. Afshan S, Dabidi Roshan V. Comparing the effect of two resistance training with and without supplement ginger on inflammatory markers. Res Med 2016; 40(3): 118-24. [Persian]

64. Wilson PB. Ginger (*zingiber officinale*) as an analgesic and ergogenic aid in sport: a systemic review. J Strength Cond Res. 2015;29(10):2980-95.