



مقایسه اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر بیان ژن miR-373 موش‌های نر مبتلا به کاردیومیوپاتی دیابتی

مجید کاشف: استاد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
مجتبی صالح پور: دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
فرشته شهیدی: دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

نعمت اله نجاتمند: دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش گرایش قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران (* نویسنده مسئول)
nnmoallem@gmail.com

چکیده

کلیدواژه‌ها

تمرین هوازی،
تمرین مقاومتی،
کاردیومیوپاتی دیابتی،
miR-373

زمینه و هدف: عامل اصلی مرگ و میر بیماران دیابتی، کاردیومیوپاتی است. تمرین ورزشی منظم سبب بهبود مقاومت به انسولین و کاهش مرگ و میر بیماران دیابتی می‌گردد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر بیان ژن miR-373 موش‌های نر مبتلا به کاردیومیوپاتی دیابتی بود.

روش کار: ۲۴ موش نر نژاد ویستار با میانگین وزن 200 ± 20 گرم و سن ۸ هفته، پس از القای دیابت (با تزریق ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم STZ) به طور تصادفی در چهار گروه ۶ تایی (شم، کنترل، تمرین مقاومتی و تمرین هوازی) طبقه‌بندی شدند. یک گروه سالم (6 : n) نیز جهت مقایسه با گروه دیابتی در نظر گرفته شد. پروتکل‌های ورزشی مقاومتی (راه رفتن بر روی نردبان عمودی) و هوازی (دویدن بر روی تردمیل) به مدت ۶ هفته (۵ روز در هفته) اجرا شد. با استفاده از PCR-Real Time بیان ژن miR-373 و گروه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون آماری One Way Anova و آزمون T همبسته استفاده شد. داده‌های بیان ژن با روش $2^{-\Delta\Delta CT}$ و روش GapDh و روش $2^{-\Delta\Delta CT}$ نرمال شدند.

یافته‌ها: هر دو پروتکل تمرینی منجر به کاهش معنادار ($P \leq 0.05$) گلوکز خون ناشتا (FBS) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR%) شدند. VO_{2peak} ($P: 0.01$) و گروه هوازی و IRM ($P: 0.03$) گروه مقاومتی افزایش معناداری پیدا کردند. سطح بیان ژن miR-373 در گروه کنترل و شم دیابتی نسبت به گروه سالم کاهش اما در هر دو گروه تمرینی افزایش یافت. اما این افزایش معنادار نبود ($P > 0.05$).

نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و مقاومتی به ترتیب توان هوازی و قدرتی گروه‌های تمرینی را بهبود بخشید. ضمناً هر دو تمرین منجر به بهبود عوارض دیابت (سطح بیان miR-373 را افزایش دادند) شدند اما تمرین هوازی سبب بهبود مطلوب تر عوارض کاردیومیوپاتی دیابتی شد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت‌کننده: حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Kashef M. Salehpoor M. Shahidi F. Nejatmand N. Comparison of the Effect of Six Weeks of Aerobic and Resistance Training on miR-373 Gene Expression in Male Rats with Cardiomyopathy. Razi J Med Sci. 2023;30(1): 193-205.

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است.



Original Article

Comparison of the Effect of Six Weeks of Aerobic and Resistance Training on miR-373 Gene Expression in Male Rats with Cardiomyopathy

Majid Kashef: Professor, Sports Physiology Department, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

Mojtaba Salehpoor: Associate Professor, Sports Physiology Department, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

Fereshteh Shahidi: Associate Professor, Sports Physiology Department, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

Nemat allh Nejatmand: PhD Student, Cardiovascular and respiratory field, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
(*Corresponding Author) nmoallem@gmail.com

Abstract

Background & Aims: Diabetic cardiomyopathy (DCM) is a functional, metabolic, and morphological deterioration of the myocardium caused by changes in glucose homeostasis caused by diabetes. miRs play a significant role in the occurrence of DCM. Reducing the overexpression of miR373 gene has a potential role in the appearance of this disease. Therefore, the purpose of this research was to compare the effect of six weeks of aerobic and resistance training on the expression of miR373 gene in mice with diabetic cardiomyopathy and male Wistar rats.

Methods: This research had a developmental goal, from the point of view of the experimental method and from the point of view of the laboratory execution method, with a post-test design. 36 healthy male Wistar rats with an average weight of 200 ± 20 grams and an age of 8 weeks were purchased from Pasteur Institute in Tehran. To induce diabetes, 50 mg/kg of streptozotocin (STZ) was injected intraperitoneally in a single dose to 27 rats. To confirm the validity of diabetes induction, glucose ≥ 200 mg/dl or hema index ≥ 3.5 were considered. According to research, diabetic cardiomyopathy occurs two months after the induction of diabetes. To confirm the occurrence of diabetic cardiomyopathy in the form of a pilot project, 3 heads of healthy rats (before the start of the research) and 3 heads of diabetic rats (after two months of becoming diabetic) were dissected and samples of myocardial tissue were taken. Rats with cardiomyopathy were randomly classified into four groups of 6 vertices (control, sham exercise, resistance exercise and aerobic exercise). A healthy group of 6 vertices was also considered for comparison with other groups. After two weeks of familiarization with the environment and learning to exercise, aerobic (running on a treadmill) and resistance (walking on an ascending ladder) training protocols were implemented for six weeks. 48 hours after the last training session (along with 12 hours of fasting), all rats were anesthetized using ketamine and xylazine and dissected and sampled from the left ventricular tissue. Real Time PCR was used to evaluate the expression of miR373 genes. For the statistical analysis of the data, ANOVA and T-correlated tests were used at the significance level of $P \leq 0.05$.

Results: Both exercise protocols led to a significant ($P \leq 0.05$) decrease in fasting blood glucose (FBS) and insulin resistance index (HOMA-IR%). VO_2 peak ($P: 0.1$) of the aerobic group and 1RM ($P: 0.73$) of the resistance group increased significantly. The miR-373 gene expression level decreased in the control and sham diabetic groups compared to the healthy group, but increased in both exercise groups. But this increase was not significant ($P > 0.05$). It was also shown that resistance training had more significant changes on FBS and HOMA-IR indices compared to

Keywords

Aerobic Exercise,
Resistance Exercise,
Diabetic
Cardiomyopathy,
miR-373

Received: 05/02/2023

Published: 08/04/2023

aerobic training ($P = 0.001$). Finally, aerobic and resistance training led to a significant increase in V_{peak} ($T = -4.9$, $P = 0.004$) and 1RM ($T = -7.68$, $P = 0.001$).

Conclusion: Aerobic and resistance training improved the aerobic capacity and strength of the training groups, respectively. In addition, both exercises led to the improvement of diabetic complications (increased the expression level of miR-373), but aerobic exercise caused a better improvement of diabetic cardiomyopathy complications.

Conflicts of interest: None

Funding: None

Cite this article as:

Kashef M. Salehpoor M. Shahidi F. Nejatmand N. Comparison of the Effect of Six Weeks of Aerobic and Resistance Training on miR-373 Gene Expression in Male Rats with Cardiomyopathy. Razi J Med Sci. 2023;30(1): 193-205.

***This work is published under CC BY-NC-SA 3.0 licence.**

مقدمه

دیابت یک بیماری بسیار شایع در تمام کشورهاست، به طوری که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ میلیون نفر تحت تاثیر این بیماری قرار بگیرند (۱ و ۲). هایپر - گلیسمی و مقاومت به انسولین میوکارد را از لحاظ مولکولی، ساختاری و شکل ظاهری دستخوش تغییرات غیر طبیعی می‌کند که منجر به پیشرفت بیماری های قلبی - عروقی می‌گردد (۳ و ۴). بیماری قلب دیابتی (Diabetic Heart Disease) اصطلاحی است که برای تشریح منحصر به فرد بیماری قلبی در افراد دیابتی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۵). کاردیومیوپاتی دیابتی (DCM) (Diabetic cardiomyopathy) یکی از این نوع بیماری‌هاست که به عنوان یک نارسایی قلبی مزمن در بیماران دیابتی تعریف می‌شود و مشخصه آن نارسایی بطن چپ بدون وجود آترواسکلروز و فشار خون است (۳ و ۶). هایپرتروفی و آپوپتوز کاردیومیوسیت‌ها، فیبروز شدید، اختلال کارکرد سیستول و دیاستول، همگی از علائم کاردیومیوپاتی دیابتی هستند (۵). تحقیقاتی که در طول دو دهه گذشته انجام شده است، نشان از نقش بسیار وسیع miR ها در کنترل هموستاز بافت و بیماری های قلبی - عروقی دارد (۷). تغییرات miR ها منجر به بروز طیف وسیعی از بیماری‌ها از قبیل دیابت، سرطان و بیماری های قلبی عروقی می‌شوند (۸). یافته‌ها نشان می‌دهند که miR ها در بروز DCM نقش بسزایی ایفا می‌کنند (۹). miR ها یک طبقه جدید از مولکول های کو تاه RNA تنظیم کننده و بدون کد هستند که طولی برابر ۲۵ - ۱۸ نوکلئوتید دارند. هر miR می‌تواند یک یا چند ژن را در سطوح ترجمه ای یا پس ترجمه ای از طریق اتصال به نواحی ترجمه نشده (Untranslated regions Messenger RNA) mRNA 3' (UTRs)، سرکوب کند و از این طریق فرایندهای متنوعی مثل تمایز پذیری و تکثیر، آپوپتوز سلولی و بیماری‌هایی مانند دیابت و کاردیومیوپاتی دیابتی را تنظیم کند (۱۱، ۱۰، ۷). تحقیقات گذشته یکی از عوامل اصلی ایجاد کاردیومیوپاتی دیابتی را بیان غیر منظم miR ها عنوان کرده اند (۱۲). ثبات و پایداری آن‌ها درون خون به عنوان یک نشانه مهم تعیین کننده پیشرفت بیماری است. بعضی از آن‌ها در عموم

بافت‌ها و بعضی به شکل اختصاصی در بافتی معین وجود دارد (۱۳ و ۱۴). miR-373 به عنوان یکی از جدیدترین miR های مرتبط با کاردیومیوپاتی دیابتی در نظر گرفته می‌شود. miR-373 به علت اینکه الگوی بیان آن خاص قلب است، ارزش تشخیصی بالایی دارد (۱۵ و ۱۶). اخیراً گزارش شده است در طول دوران دیابت، بیان این miR در کاردیومیوسیت‌ها کاهش می‌یابد. که احتمالاً به دلیل گلوکز بالا در این بیماران است. ژنی که تحت کنترل این miR قرار دارد، فاکتور افزایش دهنده میوسیت نوع ۲ (MEF2C) (Myocyte Enhancer Factor 2C) است. این عامل یک فاکتور رونویسی کلیدی برای هایپرتروفی میوکارد و واسطه فیبروز قلبی از طریق فعالسازی ژن P300 است (۱۵ و ۱۶). از سوی دیگر با توجه به سرعت در حال رشد هزینه‌های مالی دیابت و عوارض بالینی آن به خصوص کاردیومیوپاتی دیابتی، به نظر می‌رسد مداخلات غیردارویی در کنترل این بیماری گزینه‌ای ضروری و مهم است. مطالعات نشان دادند، شیوع بیماری‌های قلبی - عروقی و مرگ و میرهای ناشی از آن در افرادی که از سطح تمرینات بدنی مناسب تری برخوردارند کمتر است (۱۷). بنابراین تمرینات بدنی نه تنها و سیله ای برای حفظ یک سبک زندگی سالم بلکه همچنین به عنوان یک روش بی‌خطر و غیردارویی برای پیش‌گیری و درمان بیماری‌های قلبی عروقی می‌باشد (۱۸). لذا تغییر شیوه‌ی زندگی سبب کاهش معنادار سطح گلوکز خون بیماران دیابتی می‌شود (۱۹ و ۲۰). پژوهش‌های مرتبط با این زمینه نیز به تغییرات سودمند ورزش از قبیل بهبود عملکرد میتوکندریایی و اکسیداسیون گلوکز اشاره کرده‌اند (۲۰). نکته قابل تامل درباره تمرین ورزشی، حجم و شدت آن است. برنامه تمرینی پایدار و طولانی مدت در درمان اختلالات قلبی - عروقی افراد دیابتی به عنوان یک اثر گذار قوی ظاهر شده است (۴). با وجود فواید برشمرده برای این نوع تمرین (شیوه سنتی تمرین) به نظر می‌رسد از دو نظر این مدل تمرین مطلوب نیست: ۱- با توجه به زندگی ماشینی و کمبود وقت، این مدل تمرین به سبب زمان زیادی که به خود اختصاص می‌دهد، با استقبال کمتری روبه‌رو می‌شود. ۲- به علت یکنواختی، این مدل تمرین ملال‌آور است و بیمار انگیزه‌ای برای انجام آن ندارد. در

مقابل این نوع تمرین، تمرینات قدرتی یا تمرینات تناوبی شدید (HIIT) (High-Intensity Interval Training) قرار دارد. با وجود زمان کوتاهی که این مدل تمرینی به خود اختصاص می‌دهد، پژوهش‌ها نشان می‌دهد اجرای HIIT نسبت به شیوه سنتی تمرین، به سبب شدت بسیار بالا در وهله‌های کوتاه تکراری، در نوسازی قلبی، کنترل گلوکز خون و بسیاری از عوارض بالینی دیگر بیماری دیابت و همچنین بهبود بیماران قلبی، موثرتر بوده است (۱۰). مطالعه‌ای نشان داد که اکثر بزرگسالان غیرفعال مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله دیابت تمرینات HIIT را به تمرینات مداوم متوسط ترجیح می‌دهند (۱). از طرفی مطالعاتی که اثرات تمرین هوازی و HIIT بر miR-373 را مورد بررسی قرار داده باشند، بسیار بسیار نادر هستند. مطالعات گذشته زیادی اثرات مطلوب تمرینات ورزشی بر miRهایی که طی کاردیومیوپاتی دیابتی دچار کاهش تنظیم بیان ژن می‌شوند نشان داده‌اند. فرناندز و همکاران اثرات تمرینات هوازی شنا بر میوکاردی که به علت کاهش miR-29a و miR-29c دچار فیبروز شده بود را مورد بررسی قرار دادند. تمرینات شنا با افزایش بیان miR-29a و miR-29c، مسیر کلاژن آلفا-۱ نوع ۱ و کلاژن آلفا-۱ نوع ۳ را هدف قرار می‌دهد و منجر به بهبود عوارض فیبروز شد (۲۱). لیو و همکاران تاثیر تمرینات هوازی دو و میدانی و شنا بر میوکاردی که به علت کاهش miR-222 دچار آسیب قلبی شده بود را مورد بررسی قرار دادند. این نوع تمرینات با افزایش بیان miR-222 مسیر p27, HIPK1, HMBOX1 را هدف قرار می‌دهد و منجر به افزایش رشد قلب شد (۲۲). دلفان و همکاران تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) را بر تنظیم بیان ژن‌های مرتبط با کاردیومیوپاتی دیابتی را مورد بررسی قرار دادند. پس از هشت هفته تمرین، محققین نتیجه گرفتند که تمرینات HIIT باعث کاهش معنادار گلوکز خون، افزایش عملکرد قلب و کاهش بیان پروتئین‌های مرتبط با آپوپتوز شد (۲۳). راولین و همکاران نیز در تحقیقی دیگر نتیجه گرفتند شرکت در ورزش‌های منظم شدید موجب افزایش ضخامت دیواره بطن چپ و اندازه حفره‌ها می‌شود که یک تغییر

فیزیولوژیکی ناشی از تمرینات ورزشی است (۲). با توجه به نقش ورزش در کنترل گلوکز بالا و عدم بررسی آن در سازه کارهای ریز مولکولی موثر بر آپوپتوزیس و هایپرتروفی قلبی و فشار اکسایشی بیماران دیابتی و همچنین مطالعات بسیار کم در رابطه با miR-373، این سوال مطرح است که آیا تمرینات ورزشی می‌تواند با هدف قرار دادن miR-373 و سرکوب آن، مداخله‌ای موثر برای بهبود کاردیومیوپاتی دیابتی باشد؟ سوال دوم اینکه آیا اجرای تمرینات قدرتی می‌تواند تاثیراتی مشابه تمرینات استقامتی داشته باشد؟

روش کار

برای انجام این تحقیق ۳۰ موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن (20 ± 20 گرم) و سن ۸ هفته، از موسسه تحقیقی پاستور تهران (ایران) خریداری و شرایط استاندارد آزمایشگاهی (دمای ۲۳ - ۱۸ درجه سانتی‌گراد، رطوبت ۵۰ - ۴۰ درصد، سیکل روشنایی - تاریکی ۱۲ : ۱۲) نگهداری شدند. همه موش‌ها آزادانه به غذای اس‌تا ندارد مخصوص حیوانات آزمایشگاهی و آب دسترسی داشتند. تمامی اصول اخلاقی مطالعه مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام گرفت. القای دیابت به واسطه تزریق ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم STZ (برند - Sigma Alderich) در محلول ۰.۱ مولار بافر سیترات (۴/۵ PH) به صورت تک دوز و داخل صفاقی در ۲۴ موش ایجاد شد (۲۳). برای تایید ایجاد دیابت، ۷۲ ساعت پس از تزریق STZ، یک قطره خون از ناحیه انتهای دم موش‌ها گرفته شد و جهت ارزیابی میزان قند خون ناشتا به وسیله گلوکومتر Accu chek active مورد استفاده قرار گرفت. سطح گلوکز بزرگتر یا مساوی با ۲۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (۱۱/۱ میلی‌مول بر لیتر) و شاخص همای بزرگتر یا مساوی با ۳/۵ به عنوان اعتبار القای دیابت در نظر گرفته شد (۵). میزان قند خون موش‌ها به صورت هفتگی کنترل می‌شد. برای تایید اعتبار القای دیابت، در انتهای هفته ششم، دو نمونه موش قربانی و بعد از استخراج نمونه‌های خون از بافت قلب، توسط دستگاه گلوکومتر Accu chek active مورد

جدول ۱- پروتکل تمرین هوازی (دویدن بر روی تردمیل)

هفته	سرعت و زمان	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	چهارشنبه	پنجشنبه
اول	سرعت (متر بر دقیقه)	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
	زمان (دقیقه)	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
دوم	سرعت (متر بر دقیقه)	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
	زمان (دقیقه)	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴
سوم	سرعت (متر بر دقیقه)	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
	زمان (دقیقه)	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹
چهارم	سرعت (متر بر دقیقه)	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
	زمان (دقیقه)	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴
پنجم	سرعت (متر بر دقیقه)	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
	زمان (دقیقه)	۴۵	۴۶	۴۷	۴۷	۴۸
ششم	سرعت (متر بر دقیقه)	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
	زمان (دقیقه)	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳

جدول ۲- پروتکل تمرین مقاومتی (راه رفتن بر روی نردبان صعودی)

گرم کردن	۲ بار بالا رفتن از نردبان (بدون وزنه)
ست اول	۶ مرتبه بالا رفتن از نردبان (بین هر مرتبه یک دقیقه استراحت)
استراحت	۳ دقیقه
ست دوم	۶ مرتبه بالا رفتن از نردبان (بین هر مرتبه یک دقیقه استراحت)
استراحت	۳ دقیقه
ست سوم	۶ مرتبه بالا رفتن از نردبان (بین هر مرتبه یک دقیقه استراحت)
سرد کردن	۲ بار بالا رفتن از نردبان (بدون وزنه)

جدول ۳- مقدار وزنه‌ای که در طول هفته (در هر جلسه) به دم رت‌ها متصل می‌شد (بر اساس درصدی از وزن بدن)

جلسات تمرین	ست‌ها		
	اول	دوم	سوم
۱	۳۰٪ وزن بدن	۳۰٪ وزن بدن	بدون وزنه
۲	۵۰٪ وزن بدن	۵۰٪ وزن بدن	بدون وزنه
۳	۵۰٪ وزن بدن	۵۰٪ وزن بدن	۵۰٪ وزن بدن
۴	۷۵٪ وزن بدن	۷۵٪ وزن بدن	۷۵٪ وزن بدن
۵	۷۵٪ وزن بدن	۷۵٪ وزن بدن	۷۵٪ وزن بدن

به دیابت مبتلا باشند (۲۷). پس از گذشته سه ماه، دو موش به صورت تصادفی قربانی شدند و سطح miR-373 آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان داد که سطح miR-373 دچار افزایش شدیدی نسبت به رت‌های سالم شده بود. این مورد بیانگر بروز عارضه مذکور می باشد. سپس موش‌ها به صورت تصادفی در چهار گروه شش تایی: شم (Sham)، کنترل (C)، تمرین مقاومتی (RT) و تمرین استقامتی (AT) طبقه بندی

ارزیابی قرار گرفت و به عنوان اعتبار القای دیابت در نظر گرفته شد. موش‌های دیابتی هیچ گونه در مان با انسولین در طول دوره ی پژوهش نداشتند. شاخص هما با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید (۲۵ و ۲۶).

$$HOMA - IR = \frac{FBS (Mmol/L) \times F Insulin (\frac{mU}{L})}{22/5}$$

بر اساس مطالعات گذشته برای بروز عارضه کاردیومیوپاتی دیابتی، موش‌ها باید برای مدت سه ماه

۹۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و زیلازین (۱۰ mg/kg) میلی گرم بر کیلوگرم) بی هوش شدند، نمونه خونی مستقیم از قلب موش‌ها جمع آوری و جداسازی پلازما با سانتریفیوژ کردن در دور ۳۰۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه انجام گرفت. همچنین بافت بطن چپ بلافاصله استخراج و پس از وزن شدن در نیتروژن مایع منجمد شد، تا زمان تجزیه و تحلیل پلازما بافت استخراج شده در فریزر ۸۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد.

استخراج RNA و mRNA و سنتز cDNA: استخراج RNA و microRNA به وسیله miRNeasy Mini Kit ساخت شرکت Qiagen (آلمان) و طبق دستورالعمل کیت انجام گرفت. نسبت جذبی ۲۸۰/۲۶۰ نانومتر برای تمامی نمونه‌های استخراج شده بین ۱/۸ تا ۲ بود. سپس برای بررسی کیفیت RNA استخراج شده از روش الکتروفورز و ژل آگارز ۱ درصد استفاده شد. قبل از سنتز cDNA برای اطمینان از نبود DNA در نمونه استخراج شده، DnaS Treatment انجام گرفت. پس از مرحله PCR، برای مطالعه ویژگی پرایمرها (جدول ۴) از دماهای ۵۰ تا ۹۹ درجه سانتی گراد برای تهیه منحنی ذوب استفاده گردید.

نحوه انجام Real time - PCR: ۵۰ میلی گرم از بافت بطن چپ برای تجزیه و تحلیل بیان mRNA در تریزول هموژنیزه شد. با استفاده از کیت سنتز cDNA ایزی (Easy cDNA Synthesis Kit) (Cat: A101161) و Cat: A101162 (ساخت آلمان) RNA تام یا mRNA به cDNA تک رشته‌ای تبدیل شد. PCR با استفاده از دستگاه (Rotrogene 6000, Corbet Real Time) انجام گرفت. برنامه Real Time برای بررسی میزان بیان miR - 373 بر اساس SYBR® Green Real Time PCR Kit (Cat: C101022 و Cat: C101021) از

شدند. یک گروه سالم (۶: n) نیز جهت مقایسه با گروه دیابتی در نظر گرفته شد. سپس در طول یک هفته، موش‌ها با محل نگهداری و محیط تمرین آشنا شدند. گروه سالم (۶: n) = موش‌های غیر دیابتی که هیچ فعالیت ورزشی نداشتند.

گروه شم دیابتی (۳ سر هوازی و ۳ سر مقاومتی: n) = این موش‌ها هیچ تمرینی نداشتند، اما برای اینکه از لحاظ روانی تحت استرس تمرین قرار بگیرند، ۵ بار در هفته به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به صورت بی حرکت بر روی تردمیل و نردبان قرار می گرفتند.

گروه کنترل دیابتی (۶: n) = موش‌های دیابتی که هیچ فعالیت ورزشی نداشتند.

گروه تمرین استقامتی دیابتی (۶: n) = پس از آشنا سازی با محیط، به مدت یک هفته (هر جلسه ۱۵ دقیقه) با تردمیل (با شیب صفر و سرعت ۷ متر بر دقیقه) آشنا شدند. در انتهای همین هفته، VO_{2peak} این رت‌ها ارزیابی شد.

گروه تمرین مقاومتی دیابتی = پس از آشناسازی با محیط، به مدت یک هفته (هر جلسه ۱۰ دقیقه) با نردبان صعودی آشنا شدند. در انتهای همین هفته، 1RM این موش‌ها ارزیابی شد.

پروتکل تمرین هوازی (جدول ۱) و تمرین مقاومتی (جدول ۲ و ۳) به مدت شش هفته (پنج روز در هفته) اجرا شد که در روزهای سه شنبه و جمعه تمرین انجام نشد (۲۸ و ۲۹). شایان ذکر است که در طول دوره پژوهش از شوک الکتریکی استفاده نشد و فقط با لمس دم موش‌ها، دوییدن و بالارفتن آن‌ها هدایت شد. در آخرین جلسه تمرین مجدد VO_{2peak} و 1RM موش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش‌ها به وسیله تزریق درون صفاقی کتامین

جدول ۴- توالی پرایمرها

ژن	توالی پرایمر
miR - 373	Primer: 5'-ACGCCGGAAGTGCTTCGA-3' Reverse: 3'-AGCTTCGTGAAGGCCGCA-5' Length: 18 nt
GapDH	Primer: 5'-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCC-3' Reverse: 3'-CCTGGGACGTGACCTATGCTG-5' Length: 21 nt

نمونه‌ها در گروه‌ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن ۲۶ در سطح معناداری $P \leq 0/05$ انجام گرفت.

یافته‌ها

تمام شاخص‌های عمومی موش‌ها، در جدول ۵ لیست شده است. نتایج نشان داد که پس از تزریق STZ، شاخص‌های FBS و HOMA – IR (%) در موش‌های دیابتی در مقایسه با موش‌های گروه سالم، به طور قابل توجهی بالاتر بود. این امر بیان گر القای دیابت به واسطه تزریق STZ بود. بعد از شش هفته، هر دو پروتکل تمرینی منجر به کاهش معنادار ($P \leq 0/05$) گلوکز خون ناشتا (FBS) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR%) در مقایسه با موش‌های گروه کنترل دیابتی شد.


بیان miR – 373 جهت بررسی مکانیزم مولکولی

شرکت Qiagen (آلمان) و شامل یک چرخه با ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه و به دنبال آن ۴۰ چرخه با ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ ثانیه، ۵۵ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه و ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه انجام گرفت. تغییرات بیان در هر یک از گروه‌های ورزشی نسبت به گروه کنترل برای ژن miR – 373 با ژن خانه داری GapDh، با استفاده از روش $2^{-(\Delta\Delta CT)}$ محاسبه شد.


تحلیل آماری: تمامی داده‌ها به صورت میانگین \pm انحراف استاندارد توصیف شده اند. به منظور تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو ویلک ($0/05$) $P \geq$ طبیعی بودن داده‌ها) استفاده شد. همچنین همسان بودن واریانس‌ها با آزمون Leven سنجیده شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون آماری One Way Anova به منظور تعیین معنادار بودن تفاوت بین متغیرها در ۵ گروه و آزمون T همبسته استفاده شد. همچنین با توجه به برابر بودن تعداد

جدول ۵- شاخص‌های عمومی رت‌ها

متغیر	گروه	سالم	کنترل دیابتی	گروه شم	تمرین مقاومتی	تمرین هوازی
گلوکز ناشتا (mg/dl)	بعد از STZ روز نهایی	۹۷/۵ \pm ۲۰	۴۱۱ \pm ۱۱۰	۴۱۷ \pm ۷۹	۵۰۴ \pm ۱۱۲	۴۴۲ \pm ۱۲۰
درصد شاخص هما (روز نهایی)		۱/۱ \pm ۰/۲	۴/۳ \pm ۰/۷	۳/۸ \pm ۰/۴	۱/۹ \pm ۰/۲	۲/۴ \pm ۰/۳
قد (cm) (روز نهایی)		۱۹/۴ \pm ۱/۹	۲۰/۲ \pm ۲/۳	۱۷/۵ \pm ۱/۲	۲۰/۴ \pm ۱/۹	۲۰/۱ \pm ۱/۸
وزن (gr) (روز نهایی)		۲۸۳ \pm ۲۰	۲۳۷ \pm ۲۶	۲۲۹ \pm ۲۲	۲۲۴ \pm ۱۷	۱۶۹ \pm ۹
شاخص BMI (gr/cm ²) (روز نهایی)		۰/۷۶ \pm ۰/۱۴	۰/۵۸ \pm ۰/۰۸	۰/۷۵ \pm ۰/۱۲	۰/۵۵ \pm ۰/۱۱	۰/۴۲ \pm ۰/۰۸



شکل ۱- تاثیر ورزش و دیابت بر بیان miR-373. سطوح miR-373 به وسیله GapDh نرمال شد. تعداد هر گروه: ۶



شکل ۲- همبستگی معکوس بین Rmir-373 با FBS و HOMA-IR%

جدول ۶- نتایج آزمون T همبسته

P	T	df	تعداد رت	میانگین \pm انحراف معیار		شاخص
				قبل از تمرین	بعد از تمرین	
۰/۷۳	- ۴/۹	۵	۶	۳۹۳ \pm ۴۲	۲۹۲ \pm ۳۵	IRM (گرم)
۰/۱	- ۷/۶	۵	۶	۴۰ \pm ۵	۲۸ \pm ۵	VO _{2peak} (متر بر ثانیه)

معنادار دو متغیر تثبیت کننده ($P \leq 0/05$) IRM و VO_{2peak} موش‌های گروه تمرین شدند (جدول ۶).

آزمون VO_{2max}: این آزمون یک بار قبل از شروع تمرینات گرفته می‌شود تا میزان استقامت قلبی - تنفسی قبل و بعد از تمرین بررسی شود. برای انجام این آزمون ابتدا موش‌ها به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۶ متر بر دقیقه گرم می‌کنند، سپس به مدت ۳ دقیقه با سرعت ۱۱ متر بر دقیقه به فعالیت ادامه می‌دهند. اگر این توانایی را داشتند که همچنان بعد از ۳ دقیقه به فعالیت ادامه دهند ۵ متر بر دقیقه به سرعت اضافه می‌شود. این کار آنقدر ادامه پیدا می‌کند که موش‌ها به خستگی برسند و سرعت نهاییشان ثبت شود (۳۰).

آزمون یک تکرار بیشینه (IRM): در این آزمون ۳۰ درصد وزن بدن موش در نظر گرفته شده و بر اساس آن وزنه به موش بسته می‌شود. اگر موش توانست به راحتی از نردبان بالا رود به وزن وزنه اضافه می‌کنیم که طبق مقالات ۳۰ گرم باید به وزنه اضافه شود و سپس وزن وزنه با وزن موش جمع می‌شود و میزان یک تکرار بیشینه محاسبه می‌شود (۳۱).

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از تزریق STZ،

اثرات سودمند ورزش بر کاردیومیوپاتی دیابتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، بیان miR-373 به طور قابل توجهی در گروه‌های کنترل و شش دیابتی در مقایسه با گروه سالم کاهش یافته است. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که بعد از شش هفته تمرین، بیان miR-373 در هر دو گروه تمرین مقاومتی و هوازی، در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما این افزایش معنادار نبود ($P > 0/05$). این نکته تایید شد که نوع و مدت تمرینات ورزشی تاثیر قابل توجهی بر افزایش تنظیم بیان miR-373 داشته و تمرینات هوازی در مقایسه با تمرینات مقاومتی نقش موثرتری در افزایش بیان miR-373 دارد.

در چندین مطالعه عنوان شده بود که در طول بیماری دیابت، بیان miR-373 کاهش می‌یابد. به همین دلیل از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی همبستگی بین miR-373 با شاخص‌های مرتبط با دیابت استفاده شد. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، همبستگی معکوسی بین miR-373 با شاخص‌های FBS و HOMA-IR (%) در کاردیومیوسیت‌های موش‌ها مشاهده شد.

تمرینات مقاومتی و هوازی به ترتیب منجر به افزایش

گلوکز در قلب مبتلا به دیابت را تسهیل می‌کند (۳۵). از طرفی اسیدهای چرب تولید شده از بافت چربی با تجمع در سلول‌های عضلانی، انتقال GLUT4 به سطح این سلول‌ها را مختل می‌کند. فعالیت بدنی سبب اکسایش اسیدهای چرب می‌شود و از تجمع آن‌ها در سلول عضلانی جلوگیری کرده و انتقال GLUT4 را به سطح سلول تسهیل می‌کند (۳۶). این عمل منجر به کاهش هایپرگلیسمی می‌گردد.

از داده‌های مطالعه حاضر، به وضوح مشاهده می‌شود که در موش‌های گروه کنترل دیابتی سطوح سرمی FBS و HOMA-IR در مقایسه با موش‌های گروه سالم به شدت افزایش یافته است و با بیان miR-373 همبستگی معکوسی دارند. بیان miR-373 به طور قابل توجهی در گروه‌های کنترل و شش دیابتی در مقایسه با گروه سالم کاهش یافته است. شش هفته تمرین، بیان miR-373 را در هر دو گروه تمرین مقاومتی و هوازی، در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور قابل توجهی افزایش داده اما این افزایش معنادار نبود ($P > 0/05$). این حقیقت تایید شد که نوع و مدت تمرینات ورزشی تاثیر قابل توجهی بر افزایش تنظیم بیان miR-373 داشت و تمرینات هوازی در مقایسه با تمرینات مقاومتی نقش موثرتری در افزایش بیان miR-373 دارد. miR-373 به دلیل اینکه الگوی بیان آن خاص قلب است، ارزش تشخیصی بالایی دارد. ژنی خاص قلب (mRNA) که تحت کنترل این miR قرار دارد، فاکتور افزایش دهنده میوسیت نوع ۲ (MEF2C) (Myocyte Enhancer Factor 2C (MEF2C)) است. این عامل یک فاکتور رونویسی کلیدی برای هایپرتروفی میوکارد و واسطه فیروز قلبی از طریق فعالسازی ژن P300 است (۱۵ و ۱۶). افزایش فعالیت فاکتور MEF2 منجر به هایپرتروفی می‌گردد. هایپرتروفی به دو صورت فیزیولوژیک و پاتولوژیک وجود دارد. تمرینات ورزشی هوازی با فعالسازی NFAT، CaMKII، (مانع فعالیت هیستون داستیلاز می‌شود) و MAPK باعث افزایش رونویسی فاکتور MEF2 می‌گردد. که هایپرتروفی فیزیولوژیک را در پی دارد. از طرفی ازدیاد گلوکز در میوکارد منجر به هایپرتروفی پاتولوژیک میوکارد

شاخص‌های FBS و HOMA-IR در موش‌های دیابتی در مقایسه با موش‌های گروه سالم، به طور قابل توجهی بالاتر بود. این امر بیان‌گر القای دیابت به واسطه تزریق STZ بود. استرپتوزوتوسین به دلیل شباهت ساختمانی با مولکول گلوکز، به وسیله ناقل گلوکز یا همان ترانسپورتر گلوکز (GLUT4) وارد سلول بتا پانکراس می‌شود. مکانیسم اثر آن تولید رادیکال آزاد است که باعث آلکیلاسیون DNA (قطعه قطعه نمودن DNA) می‌گردد. آسیب DNA به واسطه متیلاسیون القایی توسط استرپتوزوتوسین، باعث فعال‌سازی فرآیند ترمیمی پلی ADP ریبوزیلاسیون می‌شود که باعث افزایش فعالیت آنزیم‌هایی از قبیل گلوکز ۶ فسفاتاز کبدی و دیابت زایی استرپتوزوتوسین می‌شود. این فرآیند باعث تخلیه سلول از NAD گزانتین اکسیداز می‌گردد. در پی فعالیت این آنزیم، رادیکال‌های آزاد تولید می‌شود که سبب تخریب بافتی پانکراس می‌شود. در نهایت این کار منجر به هایپرگلیسمی و عدم ترشح انسولین در پلاسمای می‌شود. (۲۴ و ۳۲). از دیگر یافته‌های تحقیق حاضر، کاهش معنادار ($P \leq 0/05$) گلوکز خون ناشتا (FBS) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR%) بعد از شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بود. مقاومت انسولینی منجر به اختلال فسفوریلاسیون سوپسترای گیرنده انسولین ۱ (IRS-1) (Insulin Receptor Substrate) می‌گردد. اختلال فسفوریلاسیون IRS-1 به طور منفی بر مسیر PI3K / AKT / PDK1 / a PKC اثر گذاشته که نهایتاً متابولیسم لیپید، GLUT 1، 4 و در دسترس پذیری نیتریک اکساید را کاهش می‌دهد (۳۳). کاهش نیتریک اکساید ناشی از مقاومت انسولینی منجر به بروز عوارض قلبی - عروقی می‌گردد (۳۳ و ۳۴).

تمرینات ورزشی به طور مستقیم از طریق تنظیم مولکول‌های میوکارد یا غیرمستقیم از طریق کاهش هایپرگلیسمی، فواید قابل توجهی برای قلب بیماران دیابتی دارد (۵). مهار فسفوریلاسیون AKT که در قلب دیابتی اتفاق می‌افتد به طور معناداری با تمرینات ورزشی معکوس می‌گردد و سبب افزایش GLUT4 در سارکولمای کاردیومیوسیت‌ها می‌شود، لذا متابولیسم

تایید و رضایت اخلاقی: این کار پژوهشی پس از تصویب، در کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی و از جنبه موازین اخلاق در پژوهش، با کد IR.SSRC.REC.1401.126 مورد تایید واقع شده است.

تقدیر و تشکر

از تمام دانشجویانی (آقایان دوچوبه، طاهری، یوسفی و خانم محمدی) که بنده را در انجام این تحقیق کمک کردند، نهایت تشکر و قدردانی را دارم. ضمناً از همسرم که به بنده انرژی بخشید تا با تمام توانم این مطالعه را به سرانجام برسانم بی نهایت ممنونم.

References

1. Roozbayani M, Peeri M, Agha-Alinejad H, Azarbayjani MA. [Type of Aerobic Training Effect on Cardiac Muscles MIR29A and Collagen I Gene Expression in Diabetic Male Rats]. IJDO. 2016;8:183-190. (Persian)
2. Mohammadi R, Azarbaijani H, Hamani M. [The effect of 12 weeks of resistance training on cardiac hypertrophy, glucose, insulin and insulin resistance index in STZ-treated diabetic rats. J Qom Univ Med Sci. 2016;11:45-38. (Persian)
3. Sanches I, Buzin M. Combined aerobic and resistance exercise training attenuates cardiac dysfunctions in a model of diabetes and menopause. PLoS One. 2018;13:9.
4. Sheng Lew J, Pearson J. Exercise mediated protection of diabetic heart through modulation of microRNA mediated molecular pathways. Cardiovasc Diabetol. 2017;16:10 .
5. Khakdan S, Delfan M, Heydarpour Meymeh M, Kazerouni F, Ghaedi H, et al. [High-intensity interval training (HIIT) effectively enhances heart function via miR-195 dependent cardiomyopathy reduction in high-fat highfructose diet-induced diabetic rats]. Arch Physiol Biochem. 2018. (Persian)
6. Seo Dae Y, Ko Jeong R, Jang Jung E, Kim Tae N, Youm Jae B. Exercise as A Potential Target for Diabetic Cardiomyopathy: Insight into the Underlying Mechanisms. Int J Mol Sci. 2019;20:62-84.
7. Dlouha D, Hubacek JA. Regulatory RNAs and Cardiovascular Disease – With a Special Focus on Circulating MicroRNAs. Physiol Res. 2017; 66:21–38.
8. Wenxia, M. Guihua, Y and at al. Cardiac

می‌گردد (۳۷). در دیابت بیان miR-373 کاهش می‌یابد. نشان داده شده است کاهش بیان miR373 در دیابت، به وسیله مسیر پیام رسانی P38MAPK انجام می‌گیرد (۳۸). P38 یک عضو از مسیر پیام رسانی پروتئین کیناز فعال شده با میتوزن (MAPK-Mitogen Activated Protein Kinase) است (۳۹). که در مرحله هایپرتروفی سلول‌های قلبی ناشی از گلوکز بالا بیان miR373 را تنظیم می‌کند (۴۰). با کاهش miR-373 طی دیابت، فعالیت MEF2c بیش از حد طبیعی زیاد شده و منجر به هایپرتروفی پاتولوژیک می‌گردد (۳۹ و ۴۱). اما تمرینات ورزشی بالاخص تمرینات هوازی با افزایش بیان miR-373 منجر به سرکوب MEF2c شده و از هایپرتروفی ناشی از گلوکز بالای میوکارد محافظت می‌کند (۳۹). به نظر می‌رسد که کاهش بیان miR373 طی کاردیومیوپاتی دیابتی، ناشی از استرس اکسیداتیو ناشی از هایپر - گلیسمی در قلب است (۳۸). تمرینات مقاومتی و هوازی به ترتیب منجر به افزایش IRM و VO_{2peak} موش‌های دیابتی گروه تمرین شدند. فعالیت ورزشی استقامتی موجب تحریک هایپرتروفی قلبی از راه افزایش پیام رسانی PI3K و PKB/AK و کاهش پیام رسانی C/EBP β می‌شود که باعث هایپرتروفی فیزیولوژیایی بطن چپ با حفظ کسر تزریقی می‌شود. در نتیجه، حجم ضربه‌ای، برون ده قلبی و VO_{2max} افزایش می‌یابد که آن را هایپرتروفی فیزیولوژیایی قلبی یا قلب ورزشکار می‌شناسند. فعالیت ورزشی مقاومتی منجر به فعالسازی mTORC1 می‌شود. این عامل، 4E-BP1 و p70S6K را فعال می‌کند و 4E-BP1 از eIF4E جدا می‌کند و سنتز پروتئین (ترجمه) افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت عضله افزایش می‌یابد (۴۲).

نتیجه‌گیری

تمرین هوازی و مقاومتی به ترتیب توان هوازی و قدرتی گروه‌های تمرینی را بهبود بخشید. ضمناً هر دو تمرین منجر به بهبود عوارض دیابت (سطح بیان miR-373 را افزایش دادند) شدند اما تمرین هوازی سبب بهبود مطلوب تر عوارض کاردیومیوپاتی دیابتی شد.

- proteasome functional insufficiency plays a pathogenic role in diabetic cardiomyopathy. *J Mol Cell Cardiol.* 2017;53–60.
9. Bai, T. Wang, F. Mellen, N and et al. Diabetic cardiomyopathy: role of the E3 ubiquitin ligase. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2016;310:473–483
 10. Tang X, Tang G, Ozcan S. Role of MicroRNAs in Diabetes. *Biochim Biophys Acta.* 2008;1779:697–701.
 11. Ambros V. The functions of animal microRNAs. *Nature.* 2004;5(7006):350–431.
 12. Zhou Q. MicroRNAs in diabetic cardiomyopathy and clinical perspectives. *Frontiers in Genetics* 2014;5:185–197.
 13. Delfan M, Kurdi M, Ravasi A, Safa M , et al. [The effect of a period of intense intermittent and continuous endurance training on gene expression IGF and mir-1 in cardiomyocytes of diabetic male rats]. *J Biosci.* 2015;1:11–23. (Persian)
 14. Westermeier F, Riquelme JA, Pavez M, Garrido V, Diaz A, et al. New Molecular Insights of Insulinin Diabetic Cardiomyopathy. *Front Physiol.* 2016;7:3–13.
 15. Guo R, Nair S. Role of microRNA in diabetic cardiomyopathy: from mechanism to intervention. *BBA Mol Bas Dis.* 2017;1863:2070–2077.
 16. Ghosh N, Katare R. Molecular mechanism of diabetic cardiomyopathy and modulation of microRNA function by synthetic oligonucleotides. *Cardiovasc Diabetol.* 2018;17:43.
 17. Golbidi S, Laher I. Exercise and the cardiovascular system. *Cardiol Res Pract.* 2012;210852.
 18. Bei Y, Tao L, Cretoiu D, Cretoiu SM, Xiao J. MicroRNA mediate beneficial effects of exercise in heart. *Adv Exp Med Biol.* 2017;1000:261–280.
 19. Wei M, Gibbons LW, Kampert JB, Nichaman MZ, Blair SN. Low cardiorespiratory fitness and physical inactivity as predictors of mortality in men with type 2 diabetes. *Ann Int Med.* 2000;132:605–611.
 20. Zanuso S, Jimenez A, Pugliese G, Corigliano G, Balducci S. Exercise for the management of type 2 diabetes: a review of the evidence. *Acta Diabetol.* 2010; 47:15–22.
 21. SociUP, FernandesT, HashimotoNY, MotaGF, AmadeuMA, RosaKT, etal. MicroRNAs29 are involved in the improvement of ventricular compliance promoted by aerobic exercise training in rats. *Physiol Genomics.* 2011;43:665–73.
 22. Li J, Zhang H, Zhang C. Role of inflammation in the regulation of coro-nary blood flow in ischemiaandre perfusion: mechanisms and therapeutic implications. *J Mol Cell Cardiol.* 2012;52:865–72.
 23. Delfan1 M, Delphan M, Kordi M, Ravasi A, Safa M et al. High intensity interval training improves diabetic cardiomyopathy via miR-1 dependent suppression of cardiomyocyte apoptosis in diabetic rats. *J Diabetes Metab Disord.* 2019.
 24. Hosseinzadeh H. Shahidi M. [Animal models of diabetes]. *J Diabetes Lipids.* 2002;1:1–10. (Persian).
 25. Antunes L. Validation of HOMA-IR in a model of insulinresistance induced by a high-fat diet in Wistar rats. *Arch Endocrinol Metab.* 2016;60(2):138–142.
 26. Nourzad F, Shahidi F, Saleh pour M. [The effect of aerobic and resistance training on insulin resistance index (HOMA-IR) and BCL-2/BAX ratio in apoptotic pathway in the heart tissue of male wistar diabetic rats]. *J Sport Exerc Physiol.* 2021;15:69–82. (Persian)
 27. Zheng D. Silencing of miR-195 reduces diabetic cardiomyopathy in C57BL/6 mice. *Diabetologia.* 2015;58:1949–1958.
 28. Tanoorsaz S. Behpoor N. Tadibi, V. [Changes in Cardiac Levels of Caspase 8, Bcl2 and NT – proBNP Following 4 Weeks of Aerobic Exercise in Diabetic Rats]. *Razi Univ Kermanshah.* 2017;5:23–32. (Persian)
 29. Karimian J, Khazaei M, Shekarchizadeh P. [Effect of resistance training on capillary density around slow and fast twitch muscle fibers in diabetic and normal rats]. *Asian J Sports Med.* 2015;6. (Persian)
 30. Picoli C, Romero P, Gilio G. Peak velocity as an alternative method for training prescription in mice. Department of physical education, state university of maringa, parana, Brazil. 2018.
 31. Mollanori M, Shamsi M, Mahdavi M, Gharakhanlo R, et al. [The effect of a bout of resistance training on mRNA expression of IL-15 in fast and slow skeletal treatment of trained healthy and diagnosed rats]. *Appl Physiol Res Paper.* 2015;9:15–28. (Persian)
 32. Amini A, Parto P, Yousufvand N. [Investigating the effect of diabetes induced by streptozotocin and treatment with zinc and vanadium sulfate on the reproductive system in rat]. *J Urmia Med Sci.* 2015;27:476–485. (Persian)
 33. Ayman , M. Exercise Amaliorates Metabolic Disturbances and Oxidative Stress in Diabetic Cardiomyopathy: Possible Underlying Mechanisms. *Exercise for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment. Adv Experim Med Biol.* 2017.
 34. Heymsfield S, Wadden T. Mechanisms, Pathophysiology and Management of Obesity. *N Engl J Med.* 2017;376:254–66.
 35. Wang H. Exercise prevents cardiac injury and improves mitochondrial biogenesis in advanced diabetic cardiomyopathy with PGC-1a and Akt activation. *Cell Physiol Biochem.* 2015;35:2159–2168.
 36. Ramzany N, Gaeini A, Choobineh S, Kordi M, Hedayati M. [Changes in RBP-4 and insulin resistance after 8 weeks of aerobic exercise in male type 2 diabetic rats]. *Metab Exerc.* 2016;5:89–98. (Persian)
 37. Papait R, Serio S, Condorelli G. Role of the

Epigenome in Heart Failure. *Physiol Rev.* 2020;100:1753–1777.

38. Guo R, Nair S. Role of microRNA in diabetic cardiomyopathy : from mechanism to intervention. *Biochim Biophys Acta.* 2017;1863:2070–2077.

39. Veeranki S, Givvimani S, Kundu S, Metreveli, N and et al. Moderate intensity exercise prevents diabetic cardiomyopathy associated contractile dysfunction through restoration of mitochondrial function and connexin 43 levels in db/db mice. *J Mol Cell Cardiol.* 2016;92:163–173.

40. Rawal, S and et al. Cardiovascular microRNAs: as modulators and diagnostic biomarkers of diabetic heart disease. *Cardiovasc Diabetol.* 2014;13:44.

41. Doresa H, Freitasd A, Malhotra A, Mendes M, Sharma S. The hearts of competitive athletes: An up-to-date overview of exercise-induced cardiac adaptations. *Rev Port Cardiol.* 2015;34:51– 64.

42. Gaeeni A, Hemmatifar M, Toloeazar J. An introduction to the activities of molecular sports physiology. 1. Tehran. *Samt.* 2016. 96 and 150.