



## نقش راهکارهای تغذیه‌ای در مدیریت بیماری‌های التهابی روده (IBD): یافته‌ها و توصیه‌های مبتنی بر مرور

دامنه

شیمیا منصورنیا: گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران  
سیده مانده نباتی: کارشناسی ارشد مبارزه با بیماری‌ها و کنترل ناقلین، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران  
اعظم دوست محمدیان: دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (\* نویسنده مسئول)  
mohammadian.az@iums.ac.ir

### چکیده

#### کلیدواژه‌ها

بیماری‌های التهابی روده،  
بیماری کرون،  
کولیت اولسروز،  
راهکارهای تغذیه‌ای

**زمینه و هدف:** مداخلات رژیم‌ی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بیماری‌های التهابی روده (IBD)، از جمله بیماری کرون و کولیت اولسروز مورد توجه قرار گرفته‌اند. این بیماری‌های مزمن تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و ایمونولوژیکی قرار دارند و رژیم غذایی نقش مهمی در تعدیل فعالیت و مسیر پیشرفت بیماری ایفا می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی نقش رژیم‌های غذایی مختلف در مدیریت IBD و تحلیل سازوکارهای اثرگذاری آن‌هاست.

**روش کار:** مطالعه حاضر از نوع مرور دامنه‌ای (Scoping Review) است. در این پژوهش، مقالات منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی از سال ۱۹۸۵ به بعد با استفاده از پایگاه‌های معتبر علمی شامل PubMed، Scopus، Web of Knowledge، Google Scholar، IranMedex و SID مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به منابع انگلیسی، از کلمات کلیدی ulcerative colitis OR crohn disease Inflammatory Bowel Diseases OR diet OR food انجام شد که همه واژه‌ها با MESH مطابقت داشت. جهت جمع آوری مقالات فارسی نیز در ابتدا مقالاتی که در عنوان و متن دارای یکی از کلیدواژه‌های بیماری‌های التهابی روده، بیماری کرون، بیماری کولیت اولسروز به تنهایی یا به همراه کلمات رژیم غذایی، ترکیبات غذایی، مواد غذایی، الگوهای غذایی، رژیم درمانی بودند، در پایگاه‌های علمی داخلی مورد جستجو قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** نتایج این مطالعه نشان داد که رژیم‌های غذایی متعددی، از جمله رژیم مدیترانه‌ای، رژیم گیاه‌محور، رژیم کم FODMAP، رژیم خاص کربوهیدرات (SCD)، رژیم ضد التهاب آلبرتا (AB-AID)، و رژیم حذف پروتئین شیر گاو، می‌توانند در کاهش التهاب، کنترل علائم و حتی پیشگیری از عود بیماری نقش مؤثری ایفا کنند. این رژیم‌ها از طریق بهبود ترکیب میکروبیوتای روده، کاهش نفوذپذیری روده‌ای و مهار پاسخ‌های التهابی، بهبود علائم بیمار را تسهیل می‌کنند.

**نتیجه‌گیری:** در مجموع، مداخلات تغذیه‌ای نقش مهمی در مدیریت و درمان بیماری‌های التهابی روده (IBD)، از جمله کرون و کولیت اولسروز دارند و می‌توانند به‌عنوان مکملی مؤثر در کنار درمان‌های دارویی مورد استفاده قرار گیرند.

**تعارض منافع:** گزارش نشده است.

**منبع حمایت‌کننده:** حامی مالی ندارد.

شیوه استناد به این مقاله:

Mansournia S, Nabati SM, Doustmohammadian A. The Role of Nutritional Strategies in the Management of Inflammatory Bowel Disease (IBD): Findings and Recommendations Based on a Scoping Review. Razi J Med Sci. 2025(12 Jun);32.61.

Copyright: ©2024 The Author(s); Published by Iran University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY-NC-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>).

\*انتشار این مقاله به‌صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 4.0 صورت گرفته است.



Review

## The Role of Nutritional Strategies in the Management of Inflammatory Bowel Disease (IBD): Findings and Recommendations Based on a Scoping Review

**Shima Mansournia:** Internal Medicine Specialist, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Firoozgar General Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Seyede Maede Nabati:** Master of Science, Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Azam Doustmohammadian:** Associate Professor, Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (\* Corresponding Author) [mohammadian.az@iums.ac.ir](mailto:mohammadian.az@iums.ac.ir)

### Abstract

**Background & Aims:** Dietary interventions are increasingly recognized as a fundamental aspect of managing inflammatory bowel diseases (IBD), including Crohn's disease and ulcerative colitis. These chronic, often debilitating conditions arise from a complex interplay of genetic predisposition, environmental triggers, and immune system dysregulation, with diet playing a crucial role in influencing disease activity and progression. Emerging evidence indicates that specific dietary patterns can alleviate symptoms, reduce inflammation, and potentially modify the disease course in IBD patients. This review explores how diet impacts IBD, including the modulation of gut microbiota, immune responses, and intestinal permeability. It also examines the benefits and potential drawbacks of various dietary strategies, such as exclusive enteral nutrition, the low FODMAP diet, and the anti-inflammatory Mediterranean diet, emphasizing variability in individual responses. Additionally, the review highlights the importance of personalized nutritional plans tailored to each patient's unique needs, considering factors like disease type, disease stage, comorbidities, and lifestyle. Since IBD is a heterogeneous condition, what works for one patient may not be effective for another. Therefore, a customized approach to nutrition is essential for optimizing patient outcomes and enhancing the quality of life for individuals living with IBD.

**Methods:** The present study is a scoping review. Relevant articles published in Persian and English from 1985 onward were examined using reputable scientific databases, including Scopus, PubMed, Web of Knowledge, Google Scholar, IranMedex, and SID. For English resources, the keywords "Inflammatory Bowel Diseases," "Crohn's disease," or "ulcerative colitis" alone or in combination with "diet" or "food" were used, all aligned with MESH terminology. For Persian resources, articles containing one or more of the keywords "inflammatory bowel diseases," "Crohn's disease," or "ulcerative colitis," either alone or combined with terms such as "dietary regimen," "food components," "nutritional patterns," or "diet therapy," were searched in internal scientific databases. Finally, 25 articles, including 21 clinical trials and 4 systematic reviews and meta-analyses were subjected to content analysis.

**Results:** The study search yielded a total of 17,758 records from various databases, and 16,749 studies remained after further exclusion. After the abstract and title screening process, a total of 16,683 articles were excluded due to non-compliance with the research hypothesis or inclusion criteria. Subsequently, 66 potentially relevant articles were extensively reviewed. Ultimately, 21 clinical trials involving 2,050 participants and 8 systematic reviews and meta-analyses were included. Various dietary patterns have been studied for their ability to reduce flare-ups, manage symptoms, and potentially even induce remission. Based on available evidence, we explored several dietary patterns and their mechanisms in treating and preventing Crohn's disease and ulcerative colitis relapse. One of the most frequently recommended changes for individuals with Crohn's disease is reducing red meat and processed meat intake. The evidence supports limiting red meat consumption to less than one serving per month and emphasizes white meat (like chicken and fish) and plant-based proteins, such as legumes. The mechanism is rooted in the inflammatory responses triggered by the high consumption of red meat and processed meats. These foods may alter gut microbiota composition, activate the immune system and promote intestinal inflammation, thus leading to disease relapse. The Specific Carbohydrate Diet (SCD) restricts complex carbohydrates, particularly disaccharides and polysaccharides while allowing the consumption of monosaccharides. This diet is based on the premise that individuals with IBD may not digest certain carbohydrates properly, leading to microbial imbalances and inflammation in the gut. The SCD aims to reduce gut bacterial fermentation and inflammatory responses by focusing on easily digestible foods. This diet focuses on eliminating foods that exacerbate symptoms and selecting foods that do not trigger

### Keywords

Inflammatory Bowel Disease,  
Crohn's disease,  
Ulcerative colitis,  
Nutritional Strategies

Received: 01/03/2025

Published: 12/06/2025

inflammation. It often involves avoiding processed foods, refined sugars, and additives. The diet's primary mechanism is to reduce gut irritation by removing foods that increase inflammation or trigger flare-ups, such as artificial additives and preservatives. The Low-Carbohydrate Diet (LCD) restricts carbohydrate intake to under 84 grams daily, promoting the consumption of proteins, healthy fats, and low-carb vegetables. This approach aims to reduce inflammation by limiting the fermentation of undigested carbohydrates in the gut, which can produce inflammatory byproducts. An anti-IBD diet focuses on consuming whole, non-processed, nutrient-dense foods, including fruits, vegetables, and lean proteins. This diet emphasizes reducing processed foods, refined carbohydrates, and allergens. The anti-IBD diet aims to decrease gut inflammation and improve overall nutrition by eliminating potential dietary triggers. The Low-FODMAP Diet is particularly beneficial for individuals sensitive to fermentable carbohydrates. By avoiding foods high in FODMAPs (such as certain fruits, vegetables, and dairy), this diet helps prevent bloating, gas, and abdominal discomfort, which are common in IBD patients. The reduced intake of fermentable carbohydrates minimizes gut bacterial fermentation and decreases the risk of flare-ups. The Crohn's Disease Exclusion Diet (CDED) involves a structured liquid formula providing 1000 calories per day for six weeks, followed by a reduced-calorie phase with added calcium supplements. This approach combines nutritional support and the exclusion of specific foods to reduce immune responses and inflammation in the gut, promoting disease remission. The High Restricted Organic Diet (HROD) focuses on consuming organic, minimally processed foods such as fruits, vegetables, and grains while avoiding pesticides, additives, and artificial substances. The aim is to limit exposure to compounds that could trigger inflammation, particularly in individuals sensitive to food additives. A semi-vegetarian diet promotes plant-based foods while limiting animal products, especially red meat. Reducing animal protein and processed meats reduces inflammation and improves gut health. Carrageenan-Free diet- Like Crohn's disease, individuals with ulcerative colitis benefit from eliminating processed foods containing carrageenan, a common food additive linked to intestinal inflammation. By avoiding this additive, the diet seeks to reduce symptoms and promote a healthier gut environment. The Mediterranean diet, rich in plant-based foods, whole grains, fruits, vegetables, and fish, has been shown to reduce the gut inflammation risk. It encourages the consumption of healthy fats (like olive oil) and minimizes red meat and processed foods. This diet's anti-inflammatory properties are attributed to its high content of antioxidants, omega-3 fatty acids, and fiber, all of which support gut health. The Alberta Anti-Inflammatory Diet (AB-AID) emphasizes consuming omega-3-rich fish, fruits, vegetables, and whole grains while avoiding processed, fried foods and additives. The mechanism of action is by reducing inflammatory markers in the gut, which can help manage flare-ups and promote remission. As with Crohn's disease, ulcerative colitis patients may also benefit from the Low FODMAP Diet, particularly for those with symptoms like bloating and abdominal discomfort. The diet minimizes gut irritation and gas production by reducing the intake of high-FODMAP foods. Cow's Milk Protein Exclusion diet (CMP)-This diet excludes all dairy products, including milk and cheese, while allowing butter. This approach is based on the hypothesis that cow's milk proteins can trigger immune responses in certain individuals, exacerbating symptoms of ulcerative colitis. A gluten-free and dairy-free diet is often recommended for individuals with sensitivities to these proteins. Eliminating gluten and dairy may reduce immune system activation, relieve symptoms, and decrease inflammation in susceptible individuals.

**Conclusion:** In summary, dietary interventions play a significant role in the management and treatment of inflammatory bowel diseases (IBD), including Crohn's disease and ulcerative colitis, and can serve as a valuable complement to pharmaceutical therapies. Further robust studies with better designs and long-term follow-ups are essential to develop more effective therapeutic approaches. These investigations should focus on the interaction between dietary regimens and the gut microbiome and the long-term impacts of nutritional interventions to establish more comprehensive clinical guidelines. Collaboration among physicians, nutritionists, and patients, considering individual and environmental factors, will play a critical role in managing IBD and improving treatment outcomes.

**Conflicts of interest:** None

**Funding:** None

#### Cite this article as:

Mansournia S, Nabati SM, Doustmohammadian A. The Role of Nutritional Strategies in the Management of Inflammatory Bowel Disease (IBD): Findings and Recommendations Based on a Scoping Review. *Razi J Med Sci.* 2025(12 Jun);32.61.

Copyright: ©2024 The Author(s); Published by Iran University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY-NC-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>).

**\*This work is published under CC BY-NC-SA 4.0 licence.**

## مقدمه

بیماری های التهابی روده (IBD) یک بیماری التهابی مزمن است که به واسطه پاسخ ایمنی غیر معمول به میکروفلور روده ایجاد و منجر به کاهش وزن، اسهال مزمن و خون ریزی مقعدی می شود و بر اساس محل و عمق درگیری در دیواره روده به دو دسته کولیت اولسراتیو و بیماری کرون تقسیم می شود. مطالعات متعدد نشان می دهد، IBD را می توان یک بیماری ایدیوپاتیک مولتی فاکتوریال ناشی از اورریسپانس سیستم ایمنی و متاثر از هر دو فاکتور محیطی و ژنتیکی دانست. در دهه های گذشته افزایش نگران کننده ای در میزان بروز و شیوع بیماری های التهابی روده در سراسر دنیا وجود داشته است. در قرن بیستم میلادی علی الخصوص نیمه دوم قرن بیستم، IBD در غرب افزایش یافت و از آغاز قرن ۲۱، شیوع این بیماری در کشورهای تازه صنعتی شده که جوامع آن ها رو به غربی تر شدن رفته بود رو به افزایش رفت و IBD به یک بیماری جهانی تبدیل شد (۱). IBD، حد فاصل سال های ۱۹۹۰ (۳.۳۲ میلیون نفر به صورت تخمینی) تا ۲۰۱۹ (۴.۹ میلیون مورد قطعی بیماری) افزایش شیوعی به میزان ۴۷.۴۵ درصد در سطح جهان داشته است که بالاترین میزان شیوع منطقه ای طی سال های مذکور مربوط به اروپای غربی و بالاترین روند صعودی رشد، در شرق آسیا بوده است. همچنین میزان مورتالیتی ناشی از IBD در این بازه زمانی، رشد ۶۸.۷۵ درصدی داشته است که در زنان بیشتر از مردان بوده است (۲).

اگر چه پاتوژنز IBD را می توان ترکیبی از عوامل متعدد نظیر فاکتورهای محیطی مانند رژیم غذایی، استرس و سیگار (۳)، عوامل ژنتیکی، تغییرات در میکروبیوم روده و اورریسپانس سیستم ایمنی دانست، با این حال مهم ترین عامل بیماری زایی را باید محور ایمنی-میکروبیوم مختل در نظر گرفت. مطالعات متعدد نشان می دهد تولید بیش از حد فاکتورهای التهابی به ویژه IL-17 نقش قابل توجهی در پیشرفت بیماری دارد (۴، ۵).

درمان های مرسوم بیماری های التهابی روده در حال حاضر شامل دارو درمانی نظیر آمینو سالیسیلات ها، کورتیکو استروئیدها، داروهای بیولوژیک

و تعدیل کننده های ایمنی و در موارد شدید، رزکشن روده می باشد که با این وجود در بسیاری از بیماران پاسخ به درمان مناسبی وجود ندارد و همین امر نشان دهنده نیاز به استراتژی های درمانی جدید برای بهبود کیفیت زندگی این دسته از بیماران می باشد (۶).

در حال حاضر، رژیم غذایی به عنوان یک فاکتور محیطی مهم که در تعدیل میکروبیوتای روده نقش اساسی ایفا می کند، مورد توجه بسیاری از محققان در سراسر دنیا قرار گرفته است که می تواند نقش موثری در جهت بهبود یا تشدید علایم بیماری داشته باشد. به عنوان مثال رژیم های غذایی غنی از چربی، پروتئین و کربوهیدرات های تصفیه شده با مکانیسم افزایش پروتئوباکتری ها و کاهش باکتری های محافظ، می تواند منجر به دیس بیوز روده، افزایش التهاب و پیشرفت بیماری شود (۷). بنابراین تغییرات رژیم غذایی ممکن است در استراتژی های درمانی برای IBD موثر واقع شود.

نقش رژیم های غذایی در مدیریت IBD فراتر از سلامت فردی است و بهبود آن می تواند تأثیرات گسترده ای بر کاهش بار اقتصادی و اجتماعی این بیماری ها داشته باشد. در این مقاله، اجزای مداخلات رژیم غذایی موثر در بهبودی یا عود بیماری در افراد مبتلا به کرون و کولیت اولسروز مورد بررسی قرار گرفته، چالش ها و شکاف های شواهد علمی بررسی شده و در نهایت پیشنهادات بالینی و سیاستی به منظور بهره برداری از رژیم های غذایی در مدیریت IBD ارائه می شود.

## روش کار

در این پژوهش مروری، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر علمی شامل PubMed، Scopus، Web of Knowledge، Google Scholar، IranMedex و SID مقالات چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی از زمان ۱۹۸۵ به بعد مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به منابع انگلیسی، از کلمات کلیدی Inflammatory Bowel Diseases OR ulcerative colitis OR crohn disease به تنهایی یا به همراه diet OR food انجام شد که همه واژه ها با MESH مطابقت داشت. جهت جمع آوری مقالات

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی بود. در نهایت، مقالات غیر اصلی، از جمله مقالات مروری، چکیده مقالات و مقاله‌های بدون متن کامل، نامه به سردبیر و گزارش‌ها حذف شدند. هیچ محدودیتی برای زمان انتشار نیز اعمال نشد. با استفاده از نرم افزار EndNote، بررسی اولیه بمنظور حذف مقالات تکراری انجام شد.

### یافته‌ها

جستجوی مطالعات در مجموع ۱۷۷۵۸ رکورد از پایگاه‌های داده مختلف را نشان داد و ۱۶۷۴۹ مطالعه پس از حذف مجدد باقی ماندند. پس از فرآیند غربالگری چکیده و عنوان، در مجموع ۱۶۶۸۳ مقاله به دلیل عدم رعایت فرضیه تحقیق یا معیارهای ورود حذف شدند. پس از آن، ۶۶ مقاله بالقوه مرتبط به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، ۲۱ کارآزمایی بالینی شامل ۲۰۵۰ شرکت کننده و ۸ مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز مورد بررسی قرار گرفتند (نمودار ۱).

نتایج مطالعه در دو بخش شامل بررسی کارآزمایی‌های بالینی و مرور سیستماتیک و متاآنالیزهای کارآزمایی‌های بالینی تاثیر رژیم غذایی بر القا و حفظ بهبودی (عدم عود) علائم بالینی در بیماران مبتلا به IBD ارائه می شود. جدول ۱- ویژگی‌های اساسی کارآزمایی‌های بالینی مربوط به تاثیر رژیم غذایی بر پیامدهای القا و حفظ بهبودی علائم بالینی را به تفکیک CD و UC نشان می دهد. این کارآزمایی‌ها در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ منتشر شدند. آنها در مجموع ۲۰۵۰ بیمار (۱۴۹۷ بیمار مبتلا به بیماری کرون، ۷۳٪)، با حجم نمونه از ۷ تا ۳۵۰ نفر با میانگین سنی ۳۸.۹۴ سال (۵۶.۶۵٪ زن) را شامل می شد. انواع مداخلات غذایی، از جمله رژیم غذایی حذف با هدایت علائم (۸-۱۱)، رژیم غذایی بدون گلوتن (GFD) (۱۲)، رژیم حذف پروتئین شیر گاو (CMP) (۱۲، ۱۳)، رژیم غذایی مدیترانه ای (MD) (۱۴، ۱۵)، رژیم غذایی ارگانیک بسیار محدود کننده (HROD) (۱۶)، رژیم غذایی کم فودمپ (LFD) (۱۷)، رژیم غذایی با

فارسی نیز در ابتدا مقالاتی که در عنوان و متن دارای یکی از کلیدواژه‌های بیماری‌های التهابی روده، بیماری کرون، بیماری کولیت اولسروز به تنهایی یا به همراه کلمات رژیم غذایی، ترکیبات غذایی، مواد غذایی، الگوهای غذایی، رژیم درمانی بودند، در پایگاه‌های علمی داخلی مورد جستجو قرار گرفتند.

**معیارهای انتخاب مطالعات:** معیارهای انتخاب مطالعات براساس PICO به شرح زیر بود:


جمعیت مورد مطالعه (Participants): کلیه افراد بزرگسال (بیشتر و مساوی ۱۸ سال) مبتلا به کرون یا کولیت اولسراتیو (بیماری التهابی روده) بودند. کارآزمایی‌های انجام شده در هر محیطی (settings) مانند چند مرکزی و تک مرکزی با هر روشی برای تشخیص بیماری وارد مطالعه شدند.

مداخله (Intervention): مداخلات شامل کلیه رژیم‌های غذایی خوراکی در مقایسه با یک رژیم غذایی متفاوت یا معمول بود. مطالعاتی که منحصر بر تغذیه روده ای، مکمل‌های غذایی، پروبیوتیک‌ها و تغذیه وریدی تمرکز دارند از مطالعه حذف شدند.

گروه مقایسه یا شاهد (Comparison): شامل گروه‌هایی که مداخله بر روی آنها انجام نشده است و از رژیم غذایی خاصی پیروی نمی کنند.

پیامدها (Outcomes): پیامدهای اولیه عبارت بودند از الف) القای بهبودی (Induction of remission) اندازه گیری شده با امتیاز علائم کرون و کولیت اولسراتیو شامل شاخص‌های فعالیت بیماری کرون یا CDAI، شاخص هاروی برادشو (Harvey-Bradshaw Index -HBI)، امتیاز مایو (Mayo score) و سایر روش‌های تشخیصی ذکر شده در مطالعات

ب) حفظ بهبودی بالینی (Maintenance of clinical remission) شامل کاهش مداوم علائم بالینی در طول زمان (مثلاً ۶ ماه، یک سال) بود که به یک روش درمانی (در این مورد، رژیم غذایی) نسبت داده شد. عود بالینی (clinical relapse) شامل گذر از حالت بهبودی به بیماری فعال بود که بر اساس امتیاز علائم (مانند HBI, CDAI, Mayo score, CAI) تعریف شد. از معیارهای دیگر ورود به مطالعه شامل دسترسی به



نمودار ۱- نمودار PRISMA

دلیل ناهمگونی آماری ( $I^2=66\%$ )، تفسیر نتایج با احتیاط انجام می‌شود. رژیم‌های هدایت‌شده بر اساس علائم: یک مطالعه نشان داد که حذف مواد غذایی تحریک‌کننده به مدت ۱۰ هفته به بهبودی کمک می‌کند (RR: 20.00؛ ۹۵٪ CI: 1.27–315.4؛ ۵۱ بیمار) (۴۷،۴۸،۴۹). مطالعه RCT در بیماری کولیت اولسروز (UC) اثر رژیم‌های حذف carrageenan، گلوتن، و پروتئین شیر را بر القای بهبودی در کولیت اولسراتیو فعال بررسی کردند که رژیم بدون carrageenan در یک مطالعه ۱۲ ماهه، خطر عود را کاهش داد (RR: 0.50؛ ۹۵٪ CI: 0.15–1.64؛ ۱۵ بیمار)، اما کیفیت شواهد پایین بود (۴۸،۴۹). در رژیم ضدالتهابی یک مطالعه ۶ ماهه نشان داد که این رژیم تأثیر مشخصی بر کاهش کالپروتکتین مدفوع داشته است، اما از نظر عود بیماری نتایج معناداری مشاهده نشد (۴۶،۴۹).

دوره‌های درمانی در مطالعات بررسی‌شده از ۴ هفته تا ۲ سال متغیر بودند. برای القای بهبودی، اغلب رژیم‌ها طی ۴ تا ۱۶ هفته مؤثر بودند. برای حفظ بهبودی، پیگیری‌های طولانی‌تر (۶ ماه تا ۲ سال) نتایج پایدارتری نشان دادند (۴۶،۴۹).

کربوهیدرات کم (LCD) (۱۸)، گوشت قرمز کم (LRM) (۱۹) و رژیم غذایی low micropartial (LowMicro) (۲۰، ۲۱)، رژیم غذایی ضد IBD (AID) (۲۲)، اجتناب از کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده (Avoid-RC) (۲۳)، فرمول مایعات به اضافه رژیم غذایی معمولی (CDED) (۲۴)، به علاوه تغذیه داخلی جزئی (۲۵)، رژیم غذایی بدون کاراگینان (CDF) (۲۶)، رژیم غذایی ضد التهابی مبتنی بر آلبرتا (AB-) (۲۷) در سراسر کارآزمایی‌ها اجرا شد.

در جداول شماره ۲ و ۳ ویژگی‌ها و نتایج مداخلات تغذیه‌ای برگرفته از مطالعات مرور سیستماتیک و متآنالیز بر علائم بالینی بیماری کرون و کولیت اولسروز نشان داده است. ۵۰ مطالعه تصادفی کنترل‌شده (RCT) تأثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر القای بهبودی در بیماری کرون فعال را بررسی کرده‌اند، در دو مطالعه، رژیم کم کربوهیدرات تصفیه‌شده در القای بهبودی طی ۴ تا ۱۶ هفته مؤثرتر از رژیم‌های پرکربوهیدرات یا کم فیبر بوده است (RR: 7.35؛ ۹۵٪ CI: 1.14–47.47؛ ۱۶ بیمار) (۴۶،۴۹). در شش مطالعه با پیگیری بین ۶ هفته تا ۲ سال، PEN خطر عود بیماری را کاهش داد (RR: 0.52؛ ۹۵٪ CI: 0.38–0.72؛ ۲۸۳ بیمار). اما به

جدول ۱- اطلاعات استخراج شده از کارآزمایی های بالینی رژیم غذایی بر القا و حفظ بهبودی علائم بالینی در بیماران مبتلا به IBD

نویسنده، سال	محل انجام مطالعه	طراحی مطالعه	شرکت کنندگان (حجم نمونه، نوع بیماری)	فعالیت اولیه بیماری	مداخله رژیم غذایی	رژیم های غذایی مورد مقایسه	مدت درمان	پیامد مطالعه	معیارهای مورد استفاده برای تشخیص IBD	رتبه
Albenberg, 2019(28)	ایالات متحده آمریکا	موازی / کارآزمایی بالینی تصادفی	۲۰۲ بزرگسال مبتلا به بیماری کرون (CD)	غیرفعال	مصرف کم گوشت قرمز (<۱۶ وعده/ماه گوشت قرمز یا فرآوری شده)	مصرف بالای گوشت قرمز (۲ وعده در هفته گوشت قرمز یا فرآوری شده)	۴۸ هفته	عود بیماری	sCDAI	۱
Bartel, 2008(29)	اتریش	موازی / کارآزمایی بالینی تصادفی	۱۴ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD) خفیف تا متوسط با بیماری روده کوچک یا کولون قابل ارزیابی با آندوسکوپی یا MRI	فعال	یک رژیم غذایی ارگانیک بسیار محدود شامل گوشت قرمز، محتوای فیبر محدود، انواع خاصی از نان خمیر ترش، کره تازه، و ترکیب جوش شیرین برای بهداشت دهان و دندان، در کنار کاهش اتکا به صابون ظرفشویی.	رژیم غذایی کم چرب، بدون گوشت قرمز، کم فیبر و کربوهیدرات بالا	۶ هفته	بهبودی	CDAI	۲
Bhattacharyya, 2017(30)	ایالات متحده آمریکا	موازی / کارآزمایی بالینی تصادفی	۱۲ بزرگسال مبتلا به بیماری کرون (CD)	غیرفعال	رژیم غذایی بدون کاراگینان	رژیم غذایی بدون کاراگینان با کپسول های حاوی ۲۰۰ میلی گرم کاراگینان درجه غذایی	۱۲ ماه	عود بیماری	SCCAI	۳
Bodini, 2019 (17)		موازی / کارآزمایی بالینی تصادفی	۵۵ بیمار مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD) ، شامل ۳۵ نفر با بیماری کرون (CD) و ۲۰ نفر با کولیت اولسراتیو (UC)	فعال	رژیم غذایی کم FODMAP (الیگوساکاریدهای قابل تخمیر کم، دی ساکاریدها، مونوساکاریدها و پلیولها)	رژیم غذایی استاندارد (SD) حاوی مقدار معمول FODMAP	۶ هفته	بهبودی	شاخص هاروی برادشاو [HBI]، امتیاز جزئی مایو	۴
Brotherton, 2014 (31)	ایالات متحده آمریکا	موازی / کارآزمایی بالینی تصادفی	۷ بزرگسال مبتلا به بیماری کرون (CD)	فعال	رژیم غذایی با فیبر بالا (سبوس گندم کامل)، رژیم غذایی کم کربوهیدرات تصفیه شده	رژیم غذایی کم فیبر و اجتناب از غذاها در پست های آنلاین در انجمن بیماران CCFA مشکل ساز تلقی می شود	۴ هفته	بهبودی	HBI	۵
Candy, 1995(32)	آمریکای جنوبی	موازی / کارآزمایی بالینی تصادفی	۱۸ بیمار مبتلا به کولیت اولسروز (UC)	فعال	حذف علائم تحریک کننده مواد غذایی، غذاهای سرخ شده، قندهای تصفیه شده، افزودنی ها، نگهدارنده ها، چاشنی ها (غیر از نمک)، ادویه ها، نوشیدنی ها (غیر از آب جوشانده) ۱. رژیم غذایی حذف با هدایت علائم	رژیم معمولی	۶ هفته	بهبودی (۱)	از طریق کولونوسکوپی یا رادیولوژیک و بافت شناسی	۶

CD; Crohn Disease; CDAI: Crohn's Disease Activity Index; FODMAP: Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, and Polyols; SCD: Specific Carbohydrate Di

جدول ۱- ادامه

CDAI, IBDQ	بهبودی	۱۰ هفته	توصیه های متعارف تغذیه ای	رژیم حذف متوالی بر اساس غذاهای تشدید کننده	فعال	۵۱ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	اسرائیل	Daniel, 2007 (33)	۷
SCCAI, شاخص امتیاز جزئی مایو	عود بیماری	۱۲ هفته	الگوی رژیم غذایی معمول کانادا	۱. رژیم غذایی هدایت شده با علائم الگوی رژیم غذایی مدیترانه ای	غیرفعال	۲۸ شرکت کننده بزرگسال مبتلا به کولیت اولسروز (UC)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	کانادا/بریتیش کلمبیا	Haskey 2023 (14)	۸
CDAI	عود بیماری	۵۱ ماه	کربوهیدرات تصفیه نشده، رژیم غذایی غنی از فیبر	رژیم غذایی حذف با هدایت علائم (غذاهای تحریک کننده علائم، غذاهای سرخ شده، قندهای تصفیه شده، افزودنی ها، مواد نگهدارنده، چاشنی ها (غیر از نمک)، ادویه ها، نوشیدنی ها (غیر از آب جوشیده))	غیرفعال	۲۰ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	انگلیس	Jones, 1985(34)	۹
امتیاز جزئی مایو	عود بیماری	۶ ماه	راهنمای غذای کانادا	رژیم غذایی ضد التهابی	غیرفعال	۵۳ بزرگسال مبتلا به کولیت اولسروز (UC)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	کانادا	Keshteli, 2022(35)	۱۰
sCDAI	بهبودی	۶ هفته	رژیم غذایی کربوهیدراتی خاص	رژیم غذایی مدیترانه ای	فعال	۹۱ بزرگسال مبتلا به بیماری کرون (CD)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	آمریکا	Lewis, 2021(36)	۱۱
CDAI	بهبودی	۴ ماه	توصیه های غذایی و حذف میوه ها و سبزیجات فیبردار	رژیم غذایی با ریز ذرات کم و اجتناب از میکروذرات در خمیر دندان و آب آشامیدنی	فعال	۲۰ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	انگلیس	Lomer, 2001(37)	۱۲
CDAI	بهبودی	۱۶ هفته	۱. رژیم های کنترل شامل یک رژیم غذایی ساختگی بود که از افزودنی های غذایی (یعنی دی اکسید گوگرد و سولفیت ها) اجتناب می کرد و حاوی ۵ میلی گرم در روز دی اکسید تیتانیوم (TiO2) بود. یک خمیر دندان بدون TiO2 اما حاوی سیلیکات ذرات ارائه شد. ۲. رژیم غذایی شاهد شامل مکمل کلسیم ۴۰۰ میلی گرم در روز بود	۱- رژیم غذایی با ریز ذرات کم (غذاهای حاوی TiO2 یا سیلیکات های ذرات معلق) و پرهیز از میکروذرات در خمیر دندان و آب آشامیدنی ۲. رژیم غذایی کم کلسیم	فعال	۸۳ بزرگسال مبتلا به بیماری کرون (CD)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	انگلیس	Lomer, 2005(38)	۱۳

جدول ۱- ادامه

۱۴.	Lorenz-Meyer, 1996(39)	آلمان	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۲۰۴ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	غیرفعال	رژیم کم کربوهیدرات (۸۴< گرم در روز)	مصرف کربوهیدرات های سرشار از فیبر با یا بدون مکمل اسیدهای چرب امگا ۳	۱۲ ماه	عود بیماری	CDAI
۱۵.	Mutlu, 2016(40)	آمریکا	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۵۴ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	غیرفعال	رژیم غذایی ضد IBD	"رژیم دارونما" با یا بدون مکمل FOS	۱۲ ماه	عود بیماری	CDAI
۱۶.	Nitescu , 2023 (8)	رومانی	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۱۳۹ بیمار (۷۷ بیمار مبتلا به CD و ۶۲ بیمار مبتلا به UC)	غیرفعال	رژیم محدودیت هدفمند بر اساس علائم	رژیم غذایی معمول	۶ ماه	عود بیماری	آندوسکوپی، رادیولوژیک و بافت شناسی
۱۷.	Ritchie, 1987(41)	انگلیس	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۳۵۲ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	غیرفعال	پرهیز از کربوهیدرات های تصفیه شده	پرهیز از مصرف کربوهیدرات های تصفیه نشده	۲۴ ماه	عود بیماری	HBI
۱۸.	Takagi, 2006(42)	ژاپن	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۵۱ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	غیرفعال	۵۰٪ کالری (۹۰۰-۱۲۰۰ کیلو کالری در روز) از شیر خشک و ۵۰٪ از رژیم غذایی معمولی.	رژیم معمولی	۲۴ ماه	عود بیماری	CDAI
۱۹.	Wright , 1965 (43)	انگلیس	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۷۷ بیمار مبتلا به کولیت اولسروز (UC)	فعال	۱. رژیم غذایی بدون شیر و کم باقیمانده ۲. رژیم غذایی بدون گلوتن بعدها مشخص شد که رژیم غذایی بدون گلوتن دارای آلاینده های پودر شیر است و بنابراین بدون شیر نبود.	مصرف آزاد شیر و فرآورده های آن	۱۲ ماه	بهبودی	سیگموئیدوسکوپی یا barium enema
۲۰.	Wright, 1966 (44)	انگلیس	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	۷۷ بیمار مبتلا به کولیت اولسروز (UC)	فعال	۱. رژیم غذایی بدون شیر و کم باقیمانده ۲- رژیم غذایی بدون گلوتن	مصرف آزاد شیر و فرآورده های آن	۱۲ ماه	بهبودی	سیگموئیدوسکوپی یا barium enema

جدول ۱- ادامه

HBI	بهبودی	۲۴ هفته	مکمل کلسیم و رژیم غذایی حذفی	رژیم غذایی شامل سه مرحله: در ۶ هفته اول، مصرف روزانه ۱۰۰۰ کیلوکالری از فرمول مایع به همراه رژیم حذفی، در ۶ هفته دوم، کاهش مصرف فرمول مایع به ۶۰۰ کیلوکالری و مصرف مکمل کلسیم و در ۱۲ هفته سوم، مصرف اختیاری ۶۰۰ کیلوکالری از فرمول مایع به همراه مصرف مکمل کلسیم و رعایت رژیم حذفی	فعال	۴۰ بیمار مبتلا به بیماری کرون (CD)	موازی / کارازمایی بالینی تصادفی	اسرائیل	Yanai, 2022(45)	.۲۱
-----	--------	---------	------------------------------	--	------	------------------------------------	---------------------------------	---------	-----------------	-----

CD; Crohn Disease; CDAI: Crohn's Disease Activity Index; FODMAP: Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, and Polyols; SCD: Specific Carbohydrate Di

**جدول ۲- اطلاعات استخراج شده از مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات کارزمایی بالینی تاثیر رژیم غذایی بر القا و حفظ بهبودی علائم بالینی در بیماران مبتلا به کرون**

نویسنده، سال	طراحی مطالعه	تعداد و نوع مطالعات	شرکت کنندگان	فعالیت اولیه بیماری	توصیف مداخلات رژیم غذایی در القا و حفظ بهبودی/پیشگیری از عود بیماری و طول مدت مداخله	نتایج مطالعه
Limketkai, 2022 (۴۶)	متاآنالیز	۱۶ مطالعه کارزمایی بالینی	۱۰۸۷ بیمار بزرگسال	فعال/غیرفعال	<p>رژیم های غذایی موثر بر القای بهبودی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• میانگین مدت مداخلات بین ۴ هفته تا ۲۹ ماه</li> <li>• ویژگی مداخلات تغذیه ای</li> <li>- حاوی فیبر بالا</li> <li>- رژیم غذایی حذف تدریجی بر اساس غذاهای تحریک کننده</li> <li>- رژیم غذایی ارگانیک بسیار محدود همراه با کاهش مصرف گوشت قرمز/ رژیم غذایی کم باقی مانده و اجتناب از عوامل غذایی تحریک کننده</li> <li>- /الگوی غذایی مدیترانه</li> <li>- رژیم غذایی کم میکروذره و اجتناب از میکروذرات در خمیردندان و آب آشامیدنی (مانند دی اکسید تیتانیوم و سیلیکات)</li> <li>- رژیم غذایی شامل سه مرحله: در ۶ هفته اول، مصرف روزانه ۱۰۰۰ کیلوکالری از فرمول مایع به همراه رژیم حذفی، در ۶ هفته دوم، کاهش مصرف فرمول مایع به ۶۰۰ کیلوکالری و مصرف مکمل کلسیم و در ۱۲ هفته سوم، مصرف اختیاری ۶۰۰ کیلوکالری از فرمول مایع به همراه مصرف مکمل کلسیم و رعایت رژیم حذفی.</li> </ul> <p>رژیم های غذایی موثر بر حفظ بهبودی/ پیشگیری از عود</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• میانگین مدت مداخلات بین ۳ هفته تا ۵۱ ماه</li> <li>• ویژگی مداخلات تغذیه ای:</li> <li>- رژیم غذایی ضد IBD</li> <li>- رژیم غذایی SCD (Specific Carbohydrate Diet)</li> <li>- اجتناب از کربوهیدرات های تصفیه شده</li> <li>- رژیم غذایی بدون کاراکینان</li> <li>- حذف غذاهای تحریک کننده علائم، غذاهای سرخ شده، قندهای تصفیه شده، افزودنی ها، مواد نگهدارنده، چاشنی ها (به جز نمک)، ادویه ها و نوشیدنی ها (به جز آب جوشانده)</li> <li>- رژیم غذایی بدون شیر و کم باقیمانده،</li> <li>- رژیم غذایی کم FODMAP</li> </ul>	<p>رژیم غذایی مدیترانه ای عملکردی مشابه رژیم غذایی کربوهیدرات خاص داشت. تغذیه انترال جزئی (PEN) مشابه تغذیه انترال کامل بود، اما خطر عود بیماری را کاهش داد، در حالی که کاهش مصرف گوشت قرمز یا کربوهیدرات های تصفیه شده باعث کاهش خطر عود نشد. قطعیت همه شواهد پایین یا بسیار پایین بود.</p>

جدول ۲- ادامه

<p>نتایج پژوهش نشان داد که رژیم غذایی می‌تواند بر ترکیب میکروبیوتای روده تأثیر بگذارد و این موضوع ممکن است در مدیریت بیماری‌های التهابی روده (IBD) نقش داشته باشد. با این حال، شواهد موجود تاکنون از وجود الگوهای غذایی خاص یا ترکیبات غذایی مشخصی که با پروفایل میکروبی یا نشانه‌های بیماری در بیماران IBD مرتبط باشند، حمایت نمی‌کند. تضاد در یافته‌ها و عدم توافق به دلیل ناهمگونی زیاد بین مطالعات مشاهده شده است. برای درک بهتر این ارتباطات و ارائه توصیه‌های بالینی، نیاز به پژوهش‌های بیشتر با روش‌شناسی قوی و یکنواخت ضروری است.</p>	<p>رژیم های غذایی موثر بر القای بهبودی - رژیم غذایی کم FODMAP - رژیم غذایی مدیترانه‌ای</p>	<p>فعال</p>	<p>۱۰۶ بزرگسال</p>	<p>۲ مطالعه کارآزمایی بالینی</p>	<p>مرور نظام مند</p>	<p>Cheenie Nieva ۲۰۲۴ (۴۷)</p>	<p>۲</p>
<p>عوامل غذایی مرتبط با پیشرفت بیماری شامل مصرف زیاد گوشت قرمز و فراوری شده، سایر غذاهای فراوری شده و قندهای تصفیه شده، همراه با مصرف کم سبزیجات، میوه ها و فیبر است. برای اکثر گروه های غذایی دیگر، نتایج مخلوط است یا نشان دهنده هیچ ارتباط واضحی با CD نیست.</p>	<p>رژیم های غذایی موثر بر القای بهبودی - رژیم غذایی کربوهیدرات خاص (SCD) - افزایش مصرف زردچوبه - الگوی غذایی نیمه گیاهی ( الگوی تغذیه‌ای منطقی است که عمدتاً بر پایه مواد غذایی گیاهی تمرکز دارد و در عین حال مصرف گاه‌به‌گاه گوشت و ماهی را مجاز می‌داند) رژیم های غذایی موثر بر حفظ بهبودی/ پیشگیری از عود - غذاهای کم فراوری شده - رژیم غذایی بسیار محدود و ارگانیک - کاهش مصرف کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده - رژیم غذایی کم میکروذره (مانند دی اکسید تیتانیوم و سیلیکات) PEN - محدودیت مصرف گوشت قرمز - رژیم غذایی حذقی براساس علائم - رژیم غذایی ضد التهابی - رژیم غذایی کم کلسیم</p>	<p>فعال/غیرفعال</p>	<p>۴۷۵۰۹ بیمار</p>	<p>۱۱ مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز</p>	<p>umbrella review</p>	<p>Camilla Christensen 2024 (۴۸)</p>	<p>۳</p>
<p>تأثیر این رژیم های غذایی بر بهبودی بالینی در بیماری کرون فعال و غیر فعال نامشخص بود.</p>	<p>ویژگی های رژیم غذایی در شرایط فعال بیماری کرون: - رژیم‌های غذایی پر فیبر، - کاهش مصرف کربوهیدرات های تصفیه‌شده، - رژیم غذایی حاوی میکروذرات کم ((مانند دی اکسید تیتانیوم و سیلیکات)، - رژیم غذایی کم کلسیم، - رژیم‌های غذایی حذقی بر اساس علائم و - رژیم ارگانیک بسیار محدود ویژگی های رژیم غذایی در شرایط غیرفعال بیماری کرون - رژیم‌های کم کربوهیدرات تصفیه‌شده، - رژیم‌های غذایی حذقی بر اساس علائم و - محدودیت مصرف گوشت قرمز و فراوری شده</p>	<p>فعال/غیرفعال</p>	<p>۱۲۶۰ بیمار بزرگسال</p>	<p>۲۱ مطالعه کارآزمایی بالینی</p>	<p>مرور سیستماتیک</p>	<p>Limketkai BN 2019 (۴۹)</p>	<p>۴</p>

**جدول ۳- اطلاعات استخراج شده از مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات تاثیر رژیم غذایی بر القا و حفظ بهبودی علائم بالینی در بیماران مبتلا به کولیت اولسروز**

ردیف	نویسنده، سال	طراحی مطالعه	تعداد و نوع مطالعات	شرکت کنندگان	فعالیت اولیه بیماری	توصیف مداخلات رژیم غذایی در القا و حفظ بهبودی/پیشگیری از عود بیماری و طول مدت مداخله	نتایج مطالعه
۱	Limketkai, 2022 (۴۶)	متاآنالیز	۶ مطالعه کارازمایی بالینی	۲۵۵ بیمار بزرگسال مبتلا به کولیت اولسروز	فعال/غیرفعال	<p>رژیم های غذایی موثر بر القای بهبودی</p> <p>- میانگین مدت مداخلات بین ۶ تا ۱۲ ماه</p> <p>- ویژگی مداخلات تغذیه ای</p> <p>- رژیم غذایی Carrageenan</p> <p>- رژیم ضد التهابی</p> <p>رژیم های غذایی موثر بر حفظ بهبودی/ پیشگیری از عود</p> <p>- میانگین مدت مداخلات بین ۶ هفته تا ۱۲ ماه</p> <p>- ویژگی مداخلات تغذیه ای:</p> <p>- حذف مواد غذایی محرک شامل غذاهای سرخ شده، قندهای تصفیه شده، افزودنی‌ها، چاشنی‌ها، ادویه‌ها، نوشیدنی‌ها به جز آب جوش</p> <p>- رژیم بدون شیر</p>	<p>حفظ بهبودی در کولیت اولسروز (UC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رژیم‌های غذایی مانند حذف کاراکینان، رژیم ضد التهابی یا حذف پروتئین شیر تأثیر معناداری در حفظ بهبودی نشان ندادند.</li> <li>• رژیم ضد التهابی باعث کاهش سطح بالای کالپروتکتین در برخی شرکت کنندگان شد، اما شواهد کلی بسیار کم بودند.</li> </ul>
۲	Cheenie Nieva ۲۰۲۴ (۴۷)	مرور نظام مند	۶ مطالعه کارازمایی بالینی	۱۱۵ بیمار بزرگسال مبتلا به کولیت اولسروز	فعال	<p>رژیم های غذایی موثر بر القای بهبودی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• میانگین مدت مداخلات بین ۷ روز تا ۱۲ هفته</li> <li>• ویژگی مداخلات تغذیه ای</li> <li>- رژیم غذایی کم FODMAP</li> <li>- رژیم غذایی کم چربی</li> <li>- رژیم مدیترانه‌ای</li> <li>- رژیم غذایی حذف مخصوص کولیت اولسروز</li> <li>- تغذیه کامل انتریکال (EEN)</li> </ul>	<p>شواهد موجود نشان می‌دهد که اگرچه رژیم غذایی می‌تواند میکروبیوم روده را تغییر دهد، تأثیر آن بر بهبود علائم بیماری یا تغییر ترکیب میکروبی مشخص نیست. بررسی رژیم‌های خاص مانند رژیم مدیترانه‌ای، رژیم‌های کم‌چربی، و رژیم‌های ضد التهابی شواهد حاکی از آن بود که این رژیم‌ها به طور کلی تغییرات چشمگیری در تنوع یا ترکیب میکروبی ایجاد نکرده و بهبود قابل توجهی در نتایج بیماری ارائه ندادند.</p>

جدول ۳- ادامه

<p>شواهد موجود نشان می‌دهد که رژیم‌های غذایی سرشار از فیبر، میوه‌ها و سبزیجات، مانند رژیم مدیترانه‌ای و رژیم‌های گیاه‌خواری، با کاهش التهاب، بهبود میکروبیوم روده و کاهش پیشرفت بیماری مرتبط‌اند. در مقابل، رژیم‌های پرچرب، حاوی گوشت‌های فرآوری‌شده و قندهای تصفیه‌شده، خطر ابتلا و شدت بیماری را افزایش می‌دهند. هرچند برخی رژیم‌های خاص مانند رژیم کم FODMAP یا رژیم‌های بدون لبنیات می‌توانند علائم بیماری را کاهش دهند، اما نگرانی‌هایی درباره تأثیرات طولانی‌مدت آن‌ها بر وضعیت تغذیه‌ای و سلامت کلی وجود دارد.</p>	<p>رژیم‌های غذایی موثر بر القای بهبودی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ویژگی مداخلات تغذیه‌ای</li> <li>- الگوهای غذایی غربی</li> </ul> <p>رژیم‌های غذایی موثر بر حفظ بهبودی/ پیشگیری از عود</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ویژگی مداخلات تغذیه‌ای</li> <li>- رژیم براساس علائم هدایت شده</li> <li>- رژیم غذایی ضد التهاب</li> <li>- رژیم بدون carrageenan</li> <li>- رژیم غذایی بدون گلوتن</li> <li>- رژیم حذف روزانه</li> <li>- رژیم غذایی با فیبر بالا</li> <li>- رژیم غذایی گوشت قرمز و فرآوری شده</li> <li>- مصرف زیاد قهوه،</li> <li>- غذاهای فوق فرآوری‌شده</li> <li>- رژیم غذایی با شکر</li> <li>- رژیم غذایی کربوهیدرات خاص (SCD)</li> </ul>	<p>فعال/غیرفعال</p>	<p>بیمار ۵۷۸۸۲۶</p>	<p>۱۰ مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز</p>	<p>umbrella review</p>	<p>۳. Camilla Christensen (۴۸) 2024</p>
<p>تأثیر مداخلات غذایی بر القای بهبودی در کولیت اولسروز فعال نامشخص است. یک مطالعه، رژیم غذایی هدایت‌شده توسط علائم را بررسی کرده که نشان داده است ۳۶٪ از شرکت‌کنندگان در گروه رژیم غذایی بهبود یافته‌اند در مقایسه با ۱۰٪ در گروه رژیم معمولی. با این حال، کیفیت شواهد بسیار پایین است و به نتیجه‌گیری قطعی نمی‌رسد. تأثیر رژیم‌های مختلف مانند رژیم ضدالتهابی (Alberta-based)، رژیم بدون کاراژینان و رژیم بدون شیر بر نرخ عود بیماری در حالت غیرفعال نیز نامشخص است. کیفیت شواهد در این مطالعات بسیار پایین است و اختلاف معناداری بین رژیم‌های مختلف و رژیم کنترل دیده نمی‌شود</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ویژگی‌های رژیم غذایی در شرایط فعال بیماری:</li> <li>• میانگین مدت مداخلات بین ۶ هفته تا ۱۲ ماه</li> <li>- رژیم‌های هدایت‌شده بر اساس علائم</li> <li>• ویژگی‌های رژیم غذایی در شرایط غیرفعال بیماری:</li> <li>- رژیم کم کربوهیدرات</li> <li>- رژیم کاهش گوشت قرمز و فرآوری شده</li> <li>- رژیم کاهش دی ساکارید، چربی‌های اشباع و گوشت قرمز</li> <li>- رژیم بدون شیر</li> </ul>	<p>فعال/غیرفعال</p>	<p>بیمار ۱۲۶۰ بزرگسال</p>	<p>۲۱ مطالعه کارازمایی بالینی</p>	<p>مرور سیستماتیک</p>	<p>۴. Limketkai BN (۴۹) 2019</p>

جدول ۳- ادامه

<p>شواهد موجود نشان می‌دهد که رژیم‌های غذایی سرشار از فیبر، میوه‌ها و سبزیجات، مانند رژیم مدیترانه‌ای و رژیم‌های گیاه‌خواری، با کاهش التهاب، بهبود میکروبیوم روده و کاهش پیشرفت بیماری مرتبط‌اند. در مقابل، رژیم‌های پرچرب، حاوی گوشت‌های فرآوری‌شده و قندهای تصفیه‌شده، خطر ابتلا و شدت بیماری را افزایش می‌دهند. هرچند برخی رژیم‌های خاص مانند رژیم کم FODMAP یا رژیم‌های بدون لبنیات می‌توانند علائم بیماری را کاهش دهند، اما نگرانی‌هایی درباره تأثیرات طولانی‌مدت آن‌ها بر وضعیت تغذیه‌ای و سلامت کلی وجود دارد.</p>	<p>رژیم های غذایی موثر بر القای بهبودی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ویژگی مداخلات تغذیه ای</li> <li>- الگوهای غذایی غربی</li> </ul> <p>رژیم های غذایی موثر بر حفظ بهبودی/ پیشگیری از عود</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ویژگی مداخلات تغذیه ای</li> <li>- رژیم براساس علائم هدایت شده</li> <li>- رژیم غذایی ضد التهاب</li> <li>- رژیم بدون carrageenan</li> <li>- رژیم غذایی بدون گلوتن</li> <li>- رژیم حذف روزانه</li> <li>- رژیم غذایی با فیبر بالا</li> <li>- رژیم غذایی گوشت قرمز و فرآوری شده</li> <li>- مصرف زیاد قهوه،</li> <li>- غذاهای فوق فرآوری‌شده</li> <li>- رژیم غذایی با شکر</li> <li>- رژیم غذایی کربوهیدرات خاص (SCD)</li> </ul>	<p>فعال/غیرفعال</p>	<p>بیمار ۵۷۸۸۲۶</p>	<p>۱۰ مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز</p>	<p>umbrella review</p>	<p>Camilla Christensen (۴۸) 2024</p>
<p>تأثیر مداخلات غذایی بر القای بهبودی در کولیت اولسروز فعال نامشخص است. یک مطالعه، رژیم غذایی هدایت‌شده توسط علائم را بررسی کرده که نشان داده است ۳۶٪ از شرکت‌کنندگان در گروه رژیم غذایی بهبود یافته‌اند در مقایسه با ۱۰٪ در گروه رژیم معمولی. با این حال، کیفیت شواهد بسیار پایین است و به نتیجه‌گیری قطعی نمی‌رسد. تأثیر رژیم‌های مختلف مانند رژیم ضدالتهابی (Alberta-based)، رژیم بدون کارازینان و رژیم بدون شیر بر نرخ عود بیماری در حالت غیرفعال نیز نامشخص است. کیفیت شواهد در این مطالعات بسیار پایین است و اختلاف معناداری بین رژیم‌های مختلف و رژیم کنترل دیده نمی‌شود</p>	<p>فعال/غیرفعال</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ویژگی های رژیم غذایی در شرایط فعال بیماری:</li> <li>• میانگین مدت مداخلات بین ۶ هفته تا ۱۲ ماه</li> <li>- رژیم‌های هدایت‌شده بر اساس علائم</li> <li>• ویژگی های رژیم غذایی در شرایط غیرفعال بیماری:</li> <li>- رژیم کم کربوهیدرات</li> <li>- رژیم کاهش گوشت قرمز و فرآوری شده</li> <li>- رژیم کاهش دی ساکارید، چربی‌های اشباع و گوشت قرمز</li> <li>- رژیم بدون شیر</li> </ul>	<p>فعال/غیرفعال</p>	<p>بیمار ۱۲۶۰ بزرگسال</p>	<p>۲۱ مطالعه کارازمایی بالینی</p>	<p>مرور سیستماتیک</p>	<p>Limketkai BN (۴۹) 2019</p>

جدول ۴- خلاصه ای از ویژگی‌های غذایی توصیه شده در بیماری التهابی روده به تفکیک نوع بیماری (کرون و کولیت اولسروز) و پیامد بیماری (عود و بهبودی)

مکانیسم اثر	محدودیت‌ها	مولفه های مورد تاکید	الگوهای غذایی
	عود بیماری		
توصیه به این رژیم بر پایه ارتباط میان مصرف زیاد گوشت قرمز و فرآوری شده با افزایش پاسخ‌های التهابی سیستم ایمنی و تغییر ترکیب میکروبیوتای روده و در نتیجه عود بیماری کرون است.	محدودیت مصرف گوشت قرمز پرچرب و فرآوری شده مانند گوشت گاو، گوسفند، خوک، و محصولات فرآوری شده آن‌ها و کاهش مصرف روغن‌های صنعتی، کره، خامه و غذاهای سرخ شده حاوی چربی‌های اشباع و ترانس و کاهش مصرف فست قودها و غذاهای آماده	کاهش مصرف گوشت قرمز و فرآوری شده به کمتر از یک سروینگ در ماه و تاکید بر مصرف گوشت سفید و پروتئین های گیاهی مانند حبوبات	رژمی غذایی محدود از گوشت قرمز (28)
بر اساس این فرضیه که بیماران IBD نمیتوانند دیساکاریدها و آمیلوپکتین را بهدرستی هضم و جذب کنند. این رژیم با حذف غذاهایی که علائم بیماری را تشدید می‌کنند، منجر به کاهش التهاب روده و کاهش تحریکات ناشی از مصرف مواد غذایی مضر می‌شود	محدودیت غذاهای حاوی دی‌ساکاریدها و پلی‌ساکاریدها؛ اجازه مصرف مونوساکاریدها حذف غذاهای محرک علائم مانند غذاهای فرآوری شده حذف قندهای تصفیه شده حذف مواد افزودنی و نگهدارنده‌ها محدود کردن مصرف کربوهیدرات به کمتر از ۸۴ گرم در روز. پرهیز از منابع کربوهیدرات فرآوری شده و تصفیه شده.	محدودیت خاص کربوهیدراتها و استفاده از غذاهای کامل تمرکز بر مصرف غذاهایی که علائم را تحریک نمی‌کنند انتخاب غذاهای طبیعی و بدون مواد افزودنی کاهش مصرف غذاهای پرچرب و فرآوری شده تمرکز بر مصرف پروتئین، چربی‌های سالم و سبزیجات کم کربوهیدرات.	رژیم غذایی کربوهیدرات خاص (50)(SCD) رژیم غذایی حذفی بر اساس علائم (SGED) (34) رژیم غذایی کم کربوهیدرات (<84) (LCD) (39) g/day
کاهش التهاب از طریق حذف محرک‌های غذایی و تمرکز بر مواد مغذی و ضدالتهابی کاهش جهش قند خون و پاسخ‌های التهابی ناشی از کربوهیدرات‌های تصفیه شده	حذف غذاهای فرآوری شده، کربوهیدرات‌های تصفیه شده و مواد حساسیت‌زا پرهیز از قندها، نان سفید و دیگر محصولات حاوی کربوهیدرات تصفیه شده حذف غذاهای محرک علائم مانند غذاهای فرآور شده، قندهای تصفیه شده، افزودنیها و نگهدارندهها	استفاده از غذاهای کامل، غیرفرآوری شده و غنی از مواد مغذی مانند میوه‌ها، سبزیجات و پروتئین‌های کم‌چرب. تمرکز بر مصرف غلات کامل، غذاهای غنی از فیبر و شیرین کننده‌های طبیعی استفاده از غذاهای ایمن و بدون تحریک علائم که مطابق با نیازهای فرد تنظیم شود.	رژیم غذایی ضد التهابی روده (anti-IBD diet) (40) پرهیز از کربوهیدرات‌های تصفیه شده (41) (AvoidRC) رژیم حذفی بر اساس علائم
کاهش التهاب از طریق حذف غذاهایی که علائم را تشدید می‌کنند یا ترکیب مزایای استراحت روده (با فرمول مایع) و حفظ تعادل تغذیه‌ای از طریق رژیم معمول	نیاز به رعایت تقسیم ساختاریافته ۵۰-۵۰ بین فرمول مایع و رژیم معمول	50 درصد از کالری روزانه (۹۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوکالری) از فرمول مایع تأمین می‌شود و ۵۰ درصد دیگر از رژیم غذایی معمولی	50 درصد کالری از فرمول مایع و ۵۰ درصد از رژیم معمول (42) (LF-UD)

جدول ۴- ادامه

مکانیسم اثر	محدودیت‌ها	مولفه های مورد تاکید	الگوهای غذایی
	بهبودی بیماری		
کاهش مواجهه با افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها و مواد فرآوری‌شده که می‌توانند التهاب را تشدید کنند	محدودیت گوشت قرمز، فیبر پایین، نان خاص، کره تازه. استفاده از جوش شیرین برای مراقبت از دندان و محدودیت استفاده از مایع ظرف‌شویی.	تأکید بر غذاهای ارگانیک و حداقل فرآوری‌شده مانند میوه‌ها، سبزیجات و غلات خاص ارگانیک.	رژیم غذایی بسیار محدود ارگانیک (HROD) (29)
رژیم انعطاف‌پذیر که با کاهش مصرف محصولات حیوانی می‌تواند التهاب را کاهش دهد.	محدودیت گوشت قرمز و غذاهای فرآورنده	تمرکز بر غذاهای گیاهی	رژیم غذایی نیمه گیاهخواری (51)
افزایش حرکات روده و سلامت میکروبی از طریق فیبر و پرهیز از قندهای تصفیه‌شده که باعث التهاب می‌شوند.	حذف کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده، قندها و غذاهای بسیار فرآوری‌شد	تمرکز بر سیوس گندم کامل	رژیم غذایی پر فیبر و کم کربوهیدرات تصفیه‌شده (HF-LRC) (31)
تنظیم انتخاب غذاها بر اساس محرک‌های علائم فردی برای کاهش التهاب و عود بیماری.	رژیم حذف تدریجی بر اساس غذاهایی که علائم را تشدید می‌کنند.	حذف و بازگردانی تدریجی غذاها بر اساس پاسخ بیمار.	رژیم غذایی حذفی بر اساس علائم (SGED) :
بر اساس رژیم غذایی سنتی منطقه مدیترانه.	محدودیت گوشت قرمز، غذاهای فرآورنده، و قندهای تصفیه شده.	تمرکز بر غذاهای گیاهی، غلات کامل، میوه‌ها، سبزیجات و ماهی.	رژیم غذایی مدیترانه‌ای (MD) (36)
کاهش مصرف کلسیم برای مدیریت شرایطی که با سطح بالای کلسیم تشدید می‌شوند.	محدودیت مصرف کلسیم به ۴۰۰ میلی‌گرم در روز.	کنترل مقدار مصرف لبنیات یا غذاهای غنی از کلسیم.	رژیم غذایی کم کلسیم (LowCa) ، شامل ۴۰۰ میلی گرم در روز (38)
حذف ذرات ریز غذایی که ممکن است التهاب روده را تشدید کنند.	حذف غذاهای حاوی TiO2 یا سیلیکات‌های ذرات ریز و پرهیز از ذرات موجود در خمیردندان و آب آشامیدنی.	غذاهای طبیعی و غیرفرآوری‌شده و آب تصفیه‌شده.	رژیم غذایی کم‌ذرات (LowMicro) (38)
حذف ذرات ریز غذایی که ممکن است التهاب روده را تشدید کنند.	حذف غذاهای حاوی TiO2 یا سیلیکات‌های ذرات ریز و پرهیز از ذرات موجود در خمیردندان و آب آشامیدنی.	غذاهای طبیعی و غیرفرآوری‌شده و آب تصفیه‌شده.	رژیم غذایی کم‌ذرات (LowMicro) (37)
ترکیب رژیم حذف و تغذیه انتریکال برای کاهش مواجهه آنتی‌ژنی و التهاب	مرحله ۱: ۶ هفته مصرف ۱۰۰۰ کیلوکالری در روز از فرمول مایع و رژیم حذف. مرحله ۲: ۶ هفته مصرف ۶۰۰ کیلوکالری در روز به همراه رژیم حذف و مکمل‌های کلسیم. مرحله ۳: ۱۲ هفته اختیاری ادامه رژیم حذف و فرمول	فرمول مایع ساختاریافته و غذاهای حذف‌شده.	رژیم غذایی حذف بیماری کرون (CDED) تغذیه انترال جزئی: ۶ هفته مصرف ۱۰۰۰ کیلوکالری در روز از فرمول مایع همراه با رژیم حذف، سپس ۶ هفته مصرف ۶۰۰ کیلوکالری در روز از فرمول مایع همراه با مکمل کلسیم و رژیم حذف، سپس ۱۲ هفته اختیاری مصرف ۶۰۰ کیلوکالری در روز از فرمول مایع، همراه با ادامه مکمل کلسیم و رژیم حذف
بر اساس فرضیه‌ای که این نوع کربوهیدرات‌ها در افراد حساس باعث علائم گوارشی می‌شوند.	پرهیز از کربوهیدرات‌های خاصی که تخمیر شده و باعث نفخ، گاز و درد شکمی می‌شوند.	بر اساس فرضیه‌ای که این نوع کربوهیدرات‌ها در افراد حساس باعث علائم گوارشی می‌شوند.	رژیم غذایی کم FODMAP ( $\leq 0.5$ g per meal) (17) (45)

## جدول ۴- ادامه

		Relapse	
حذف کاراگینان، افزودنی مرتبط با التهاب روده و تشدید علائم در بیماران IBD. بر اساس رژیم غذایی سنتی منطقه مدیترانه.	حذف غذاهای حاوی کاراگینان که معمولاً در غذاهای فرآوری شده یافت می‌شود. محدودیت گوشت قرمز، غذاهای فرآورنده، و قندهای تصفیه شده.	تمرکز بر غذاهای کامل و حداقل فرآوری شده.	رژیم غذایی دون کاراگینان(30)
تمرکز بر کاهش التهاب از طریق حذف غذاهای التهابی و مصرف مواد مغذی ضدالتهابی.	حذف غذاهای فرآوری شده، سرخ‌شده و افزودنی‌ها.	تمرکز بر غذاهای گیاهی، غلات کامل، میوه‌ها، سبزیجات و ماهی. تأکید بر ماهی‌های غنی از امگا ۳، میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل	رژیم غذایی مدیترانه‌ای(36) (MD)
کاهش التهاب و علائم از طریق حذف غذاهایی که به‌طور فردی علائم را تحریک می‌کنند	حذف غذاهای سرخ‌شده، قندهای تصفیه‌شده، افزودنی‌ها، نگهدارنده‌ها، چاشنی‌ها (به‌جز نمک)، ادویه‌ها و نوشیدنی‌ها (به‌جز آب جوشیده)	حذف تدریجی و بازگردانی غذاها بر اساس پاسخ علائم.	رژیم غذایی ضدالتهابی مبتنی بر آلبرتا- (AB) (35) AID
کاهش التهاب و علائم از طریق حذف غذاهایی که به‌طور فردی علائم را تحریک می‌کنند	حذف غذاهای سرخ‌شده، قندهای تصفیه‌شده، افزودنی‌ها، نگهدارنده‌ها، چاشنی‌ها (به‌جز نمک)، ادویه‌ها و نوشیدنی‌ها (به‌جز آب جوشیده)	حذف تدریجی و بازگردانی غذاها بر اساس پاسخ علائم.	رژیم غذایی حذفی بر اساس علائم: حذف غذاهایی که علائم را تحریک می‌کنند، غذاهای سرخ‌شده، قندهای تصفیه‌شده، افزودنی‌ها، نگهدارنده‌ها، چاشنی‌ها (به‌جز نمک)، ادویه‌ها و نوشیدنی‌ها (به‌جز آب جوشیده)(8) (SGED)
		Remission	
کاهش التهاب و علائم از طریق حذف غذاهایی که به‌طور فردی علائم را تحریک می‌کنند	حذف غذاهای سرخ‌شده، قندهای تصفیه‌شده، افزودنی‌ها، نگهدارنده‌ها، چاشنی‌ها (به‌جز نمک)، ادویه‌ها و نوشیدنی‌ها (به‌جز آب جوشیده)	حذف تدریجی و بازگردانی غذاها بر اساس پاسخ علائم.	رژیم غذایی حذفی بر اساس علائم: حذف غذاهایی که علائم را تحریک می‌کنند، غذاهای سرخ‌شده، قندهای تصفیه‌شده، افزودنی‌ها، نگهدارنده‌ها، چاشنی‌ها (به‌جز نمک)، ادویه‌ها و نوشیدنی‌ها (به‌جز آب جوشیده)(52) (SGED)
بر اساس فرضیه‌ای که این نوع کربوهیدرات‌ها در افراد حساس باعث علائم گوارشی می‌شوند.	پرهیز از کربوهیدرات‌های خاصی که تخمیر شده و باعث نفخ، گاز و درد شکمی می‌شوند.	بر اساس فرضیه‌ای که این نوع کربوهیدرات‌ها در افراد حساس باعث علائم گوارشی می‌شوند.	رژیم غذایی کم FODMAP( $\leq 0.5$ g per meal) (17)
کاهش التهاب از طریق حذف محرک‌های ایمنی مرتبط با پروتئین‌های شیر گاو.	حذف تمام لبنیات از جمله کره	حذف تمام لبنیات شامل شیر تازه، پنیر، و شیر بودری؛ اجازه مصرف کره.	رژیم غذایی حذف پروتئین شیر گاو (CMP) diet (43)
کاهش التهاب از طریق حساسیت‌زدایی به گلوتن و پروتئین‌های شیر	حذف تمام غذاهای حاوی گلوتن و محصولات لبنی. جایگزینی کره با مارگارین.	مصرف کره مجاز نبود و به بیماران توصیه شد به جای آن از مارگارین استفاده کنند. بعداً مشخص شد که رژیم بدون گلوتن دارای آلودگی به پودر شیر است و بنابراین فاقد لبنیات نبوده است.	رژیم غذایی بدون گلوتن همراه با رژیم بدون لبنیات (GFD). (43)

رژیم‌ها در مقایسه با رژیم استاندارد در کارآزمایی‌های بالینی اثربخش نبودند (۴۶).

تغذیه انترال نسبی (PEN)، که شامل دریافت ۵۰٪ کالری از فرمول‌های انترال و مابقی از غذاهای جامد است، به‌عنوان روشی امیدوارکننده برای مدیریت مراحل تحریک و نگهداری بهبودی در افراد مبتلا به بیماری کرون (CD) شناخته شده است. این روش نتایجی مشابه تغذیه انترال انحصاری (EEN) دارد، که اثربخشی آن پیش‌تر تأیید شده است. با این تفاوت که PEN به دلیل طعم بهتر و محدودیت کمتر، می‌تواند گزینه‌ای راحت‌تر برای بیماران باشد. با این حال، قطعیت این شواهد به دلیل حجم کوچک نمونه‌ها و طراحی محدود مطالعات همچنان پایین است.

از سوی دیگر برای کولیت اولسروز (UC)، نتایج مطالعات نسبت به مداخلات رژیمی کاملاً محدود است. در بسیاری از پژوهش‌ها که رژیم‌های ضد التهابی یا حذف محصولات خاص غذایی نظیر لبنیات را بررسی کردند، شواهد قطعی برای بهبودی بیماری وجود نداشت. البته مطالعات اخیر نشان داده‌اند که ممکن است حذف لبنیات در UC در برخی بیماران به کاهش التهاب کمک کند، اما نیاز به شواهد بیشتر در این زمینه احساس می‌شود.

بیشتر مطالعات نشان‌دهنده هم‌خوانی غذاهایی با محصولات حیوانی پرچرب و فست‌فودها با تشدید بیماری‌های التهابی روده هستند. این الگوهای غذایی اغلب به‌ویژه در جوامع غربی با بروز بالاتری از CD مرتبط بوده‌اند. برعکس، مصرف سبزیجات و میوه‌ها به‌ویژه در رژیم مدیترانه‌ای و برخی دیگر از رژیم‌های گیاه‌محور، به‌طور معناداری با کاهش ابتلا به IBD و تأثیرات مثبت بر التهاب روده مرتبط است. مکانیسم اثر مهم‌ترین الگوهای غذایی موثر بر القا یا حفظ بهبودی در بیماران مبتلا به IBD به شرح زیر است:

**مکانیسم اثر الگوی غذایی مدیترانه:** الگوی غذایی مدیترانه‌ای با تأکید بر مصرف میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات، غلات کامل، روغن زیتون، ماهی‌های چرب، و مغزها، به دلیل خواص ضدالتهابی و تنظیم‌کننده‌ی ایمنی، مکانیسم‌های متعددی برای بهبود یا پیشگیری از عود علائم در بیماران مبتلا به بیماری‌های التهابی روده (IBD) از جمله کرون و

رژیم‌های غذایی مانند رژیم کم‌کربوهیدرات تصفیه‌شده، تغذیه جزئی (PEN)، و رژیم‌های حذف مواد حساسیت‌زا می‌توانند به‌عنوان بخشی از یک برنامه درمانی جامع برای مدیریت IBD استفاده شوند. در بیماری کرون، رژیم‌های کم‌کربوهیدرات و تغذیه جزئی در کاهش التهاب و حفظ بهبودی، به‌ویژه در دوره‌های ۴ تا ۱۶ هفته برای القای بهبودی و ۶ ماه تا ۲ سال برای حفظ آن، نتایج مثبتی داشته‌اند. در کولیت اولسروز، رژیم‌های حذف carrageenan و ضدالتهابی اثرات محدودی در کاهش عود بیماری طی ۶ تا ۱۲ ماه نشان داده‌اند (۴۷، ۴۸، ۴۹).

### بحث

مدیریت رژیم غذایی برای افراد مبتلا به بیماری کرون و کولیت اولسراتیو، در دوره‌های فعال (Active) و غیرفعال (In active)، بسیار اهمیت دارد. در این مطالعه مرور دامنه مهم‌ترین توصیه‌های تغذیه‌ای بر اساس تحقیقات اخیر با توجه به شرایط و نوع بیماری ارائه شده است. در این زمینه، توجه به تغییرات رژیمی خاص می‌تواند در مدیریت علائم و بهبود وضعیت بیماران تأثیر قابل توجهی داشته باشد. بیماری کرون ممکن است به تغییراتی در رژیم غذایی پاسخ مثبت نشان دهد. رژیم‌های غذایی با کربوهیدرات تصفیه‌شده کم و همچنین رژیم‌هایی که مواد غذایی تحریک‌کننده علائم بیماری را حذف می‌کنند، در بهبود علائم بالینی نتایج امیدوارکننده‌ای داشته‌اند. با این حال، شواهد موجود غالباً از کیفیت پایینی برخوردارند و دارای میزان خطای بالایی هستند، که نتیجه‌گیری قطعی را دشوار می‌کند. این نوع رژیم‌ها ممکن است با حذف عوامل محرک التهابی، ملنند کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده، اثر مثبت داشته باشند، اما تأثیر واقعی آن‌ها بر مکانیسم‌های زمینه‌ساز بیماری همچنان در دست بررسی است.

بر اساس مطالعات تأثیر رژیم غذایی مدیترانه‌ای و رژیم کربوهیدرات‌های خاص (SCD) در تحریک به بهبودی بالینی در بیماران مبتلا به کرون مشابه بودند. در حالی که پیروی از رژیم غذایی SCD برای بیماران دشوار است، رژیم مدیترانه‌ای به‌عنوان جایگزینی قابل اجرا پیشنهاد می‌شود، اگرچه هیچکدام از این

می‌کنند. این رژیم‌ها معمولاً با کاهش مصرف غذاهای التهاب‌زا مانند گوشت‌های فرآوری‌شده، قندهای تصفیه‌شده، و چربی‌های اشباع، التهاب سیستمیک و موضعی در روده را کاهش می‌دهند. همزمان، افزایش مصرف غذاهای غنی از فیبر (مانند میوه‌ها، سبزیجات، و غلات کامل) به حفظ سلامت دیواره روده، تقویت یکپارچگی سد اپیتلیال، و تولید اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیره مانند بوتیرات توسط میکروبیوتای روده کمک می‌کند که خواص ضدالتهابی دارند. مصرف مواد آنتی‌اکسیدانی (مانند کورکومین) و چربی‌های امگا-۳ نیز با کاهش تولید سیتوکین‌های التهابی و تقویت پاسخ‌های ایمنی، اثرات محافظتی را ارائه می‌کنند. در کنار این موارد، رژیم‌هایی مثل رژیم مدیترانه‌ای و رژیم کم-FODMAP با بهبود تعادل میکروبیوتای روده و کاهش نفوذپذیری روده، اثرات مثبتی در کاهش شدت علائم و پیشگیری از عود بیماری نشان داده‌اند. این تغییرات جمعی موجب القای وضعیت ضدالتهابی و تقویت هموستاز در بیماران می‌شوند (۵۴).

**مکانیسم اثر رژیم غذایی کم FOMAPP** رژیم غذایی کم FODMAP، با کاهش مصرف کربوهیدرات‌های قابل تخمیر کوتاه‌زنجیر مانند فروکتوز، لاکتوز، گالاکتو-الیگوساکاریدها و پلی‌اول‌ها، به بهبود علائم بیماران مبتلا به بیماری‌های التهابی روده (IBD)، از جمله کرون و کولیت اولسروز کمک می‌کند. این رژیم از طریق کاهش تخمیر میکروبی در روده، تولید گازهای روده‌ای و جذب بیش از حد آب را محدود می‌کند که منجر به کاهش نفخ، درد شکمی، و اسهال می‌شود. همچنین، این رژیم اثرات مثبتی بر ترکیب میکروبیوتای روده دارد و موجب بهبود عملکرد سد روده می‌گردد. هرچند این رویکرد علائم گوارشی را کاهش می‌دهد، تأثیر آن بر کاهش التهاب سیستمیک یا جلوگیری از عود بیماری هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد (۵۵).

**مکانیسم اثر رژیم غذایی SGED** اثرات مفید SGED بر عود بیماری کرون ممکن است با مکانیسم‌های مختلفی توضیح داده شود. این میکروبیوتای روده را تعدیل می‌کند و باکتری‌های

کولیت اولسروز دارد. فیبرهای موجود در این رژیم از طریق تخمیر در روده و تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (مانند بوتیرات) به تقویت سد اپیتلیالی روده و کاهش التهاب کمک می‌کنند. همچنین، آنتی‌اکسیدان‌های موجود در میوه‌ها، سبزیجات و روغن زیتون، مانند پلی‌فنول‌ها و ویتامین E، رادیکال‌های آزاد را خنثی کرده و آسیب اکسیداتیو را کاهش می‌دهند. اسیدهای چرب امگا-۳ در ماهی‌های چرب با کاهش تولید سیتوکین‌های التهابی، نقش مهمی در تنظیم پاسخ ایمنی ایفا می‌کنند. علاوه بر این، رژیم مدیترانه‌ای تنوع میکروبیوتای روده را افزایش داده و گونه‌های باکتری مفید مرتبط با کاهش التهاب را تقویت می‌کند، که در مجموع منجر به کاهش شدت بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌شود (۵۳).

**مکانیسم اثر رژیم غذایی کربوهیدرات خاص (Specific Carbohydrate Diet- SCD):** رژیم غذایی کربوهیدرات خاص (SCD) با حذف غلات، لاکتوز، قندهای فرآوری‌شده و برخی کربوهیدرات‌های پیچیده، با هدف کاهش التهاب و بهبود وضعیت روده در بیماران مبتلا به بیماری کرون و کولیت اولسروز طراحی شده است. مکانیسم اثر این رژیم به تعامل آن با میکروبیوم روده مرتبط است؛ به طوری که حذف کربوهیدرات‌های قابل تخمیر می‌تواند رشد باکتری‌های مولد گاز و التهاب را محدود کند و تعادل مطلوب‌تری در جامعه میکروبی ایجاد نماید. علاوه بر این، کاهش تخمیر مواد غذایی در روده ممکن است به بازسازی و بهبود یکپارچگی دیواره روده کمک کرده و نفوذپذیری آن را کاهش دهد، که به عنوان یک عامل کلیدی در جلوگیری از عود علائم شناخته می‌شود. با وجود گزارش‌هایی از کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی بیماران، شواهد علمی در این زمینه هنوز محدود است و نیاز به مطالعات جامع‌تر و بلندمدت با طراحی‌های دقیق‌تری وجود دارد (۱۵، ۴۶).

**مکانیسم اثر رژیم غذایی ضد IBD** رژیم‌های غذایی ضد بیماری‌های التهابی روده (IBD) از طریق چندین مکانیسم به بهبود علائم یا پیشگیری از عود در بیماران مبتلا به کرون و کولیت اولسروز کمک

جایگزین قابل قبول تری نسبت به EEN برای حفظ بهبودی باشد.

با توجه به کمبود مطالعات بزرگ‌مقیاس و طولانی‌مدت، پیشنهاد می‌شود که در آینده، کارآزمایی‌های بالینی با طراحی‌های دقیق‌تر و نمونه‌های متنوع‌تر انجام شود تا بتوان اثربخشی رژیم‌های مختلف را با اطمینان بیشتری ارزیابی نمود. همچنین، پیشنهاد می‌گردد دستورالعمل‌های بالینی ملی با مشارکت متخصصین گوارش و تغذیه تدوین گردد تا کاربرد بالینی این یافته‌ها در سطح نظام سلامت تسهیل شود. آموزش بیماران، مشاوره تغذیه فردمحور، و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی جهت دسترسی آسان به رژیم‌های خاص (نظیر رژیم بدون گلوتن یا کم FODMAP) از دیگر پیشنهادها کاربردی جهت بهبود مدیریت IBD می‌باشد.

#### چالش‌های مرتبط با پیامدهای بالینی و بهداشت

##### عمومی

با وجود شواهد اولیه در مورد تأثیرات مثبت برخی رژیم‌های غذایی بر مدیریت IBD، چندین چالش عمده در این حوزه وجود دارد که بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت را محدود می‌کند.

نخستین چالش مربوط به قطعیت پایین شواهد علمی است. بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته کوچک‌مقیاس و کوتاه‌مدت بوده‌اند و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها هنوز به‌اندازه کافی محکم نیست که بتوان به‌عنوان پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های بالینی استفاده کرد. به‌عنوان مثال، در حالی که برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که رژیم‌هایی مانند تغذیه جزئی (PEN) یا رژیم محرومیت هدایت‌شده با علائم (SGED) می‌توانند در پیشگیری از عود بیماری کرون و کولیت اولسراتیو مؤثر باشند، سطح قطعیت شواهد پایین بوده و هنوز مطالعات بلندمدت کافی در این زمینه انجام نشده است.

علاوه بر این، یکی از مشکلات اساسی در استفاده از رژیم‌های غذایی به‌عنوان درمان، دشواری‌های عملی در اجرای این رژیم‌ها توسط بیماران است. برای نمونه،

مفید را تقویت می‌کند که به تولید متابولیت‌های ضد التهابی مانند اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه کمک می‌کند. این رژیم همچنین التهاب روده و قرار گرفتن در معرض آنتی ژن را با حذف غذاهای محرک کاهش می‌دهد، از بهبود مخاط حمایت می‌کند، عملکرد سد را بهبود می‌بخشد و نفوذپذیری روده را با تامین مواد مغذی ضروری و تقویت پروتئین‌های اتصال محکم کاهش می‌دهد. علاوه بر این، SGED کمبودهای تغذیه ای را تصحیح می‌کند و عملکرد سیستم ایمنی را با مصرف کافی ریزمغذی‌ها تقویت می‌کند. همچنین به طور مؤثر علائم را مدیریت می‌کند، استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد و منجر به پیروی بهتر از رژیم غذایی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. این عوامل ترکیبی ممکن است به بهبودی پایدار و کاهش میزان عود در بیماران مبتلا به بیماری کرون به دنبال SGED کمک کنند (۵۶).

#### کاربردهای بالینی یافته‌ها، توصیه‌های عملی، و چشم‌انداز آینده پژوهش

یافته‌های این مرور دامنه‌ای، مجموعه‌ای از شواهد روزآمد درخصوص تأثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر مدیریت بالینی بیماری‌های التهابی روده ارائه می‌دهند. این اطلاعات می‌توانند به‌عنوان مبنایی علمی برای تدوین برنامه‌های تغذیه‌ای شخصی‌سازی‌شده در کلینیک‌های گوارش و مراکز مشاوره تغذیه مورد استفاده قرار گیرند. همچنین پزشکان و متخصصان تغذیه می‌توانند از این اطلاعات جهت انتخاب الگوهای رژیمی مناسب برای بیماران در مراحل مختلف بیماری بهره‌مند شوند.

تأکید بر این است که اگرچه مداخلات تغذیه‌ای به تنهایی جایگزین درمان دارویی نیستند، اما در کنار درمان‌های دارویی نقش مکمل مهمی ایفا می‌کنند. به‌ویژه رژیم‌های مدیترانه‌ای، کم FODMAP و رژیم‌های مبتنی بر اجتناب از مواد التهابی، می‌توانند منجر به کاهش علائم، بهبود کیفیت زندگی، و حتی کاهش دفعات عود بیماری شوند. علاوه بر آن، تغذیه لنترال جزئی (PEN) نیز در موارد خاص می‌تواند

معتبرتر با طراحی‌های بهتر و پیگیری طولانی‌مدت مورد نیاز است. این تحقیقات باید بر تعامل رژیم‌های غذایی با میکروبیوم روده و اثرات بلندمدت مداخلات تغذیه‌ای متمرکز باشند تا دستورالعمل‌های بالینی جامع‌تری ارائه شود. همکاری بین پزشکان، متخصصین تغذیه، و بیماران با در نظر گرفتن شرایط فردی و محیطی، در مدیریت و بهبود نتایج درمانی IBD موثر خواهد بود.

### ملاحظات اخلاقی

مطالعه مروری بوده و ملاحظات اخلاقی ندارد.

### مشارکت نویسندگان

اعظم دوست‌محمدیان، ایده و چارچوب اولیه مطالعه را ارائه و مفهوم‌سازی نمود. کلیه نویسندگان در مراحل جستجوی منابع، غربالگری مطالعات، انتخاب نهایی مقالات، استخراج داده‌ها و تدوین محتوای مقاله مشارکت فعال داشتند. همچنین همگی نویسندگان نسخه نهایی مقاله را مورد بازبینی و تأیید قرار دادند.

### References

1. Kaplan GG, Windsor JW. The four epidemiological stages in the global evolution of inflammatory bowel disease. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2021;18(1):56-66.
2. Ng SC, Shi HY, Hamidi N, Underwood FE, Tang W, Benchimol EI, et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies. *Lancet*. 2017;390(10114):2769-78.
3. Wang R, Li Z, Liu S, Zhang D. Global, regional and national burden of inflammatory bowel disease in 204 countries and territories from 1990 to 2019: a systematic analysis based on the Global Burden of Disease Study 2019. *BMJ Open*. 2023;13(3):e065186.
4. Lee SH, eun Kwon J, Cho M-L. Immunological pathogenesis of inflammatory bowel disease. *Intest Res*. 2018;16(1):26.
5. Jamieson PE, Carbonero F, Stevens JF. Dietary (poly) phenols mitigate inflammatory bowel disease: Therapeutic targets, mechanisms of action, and clinical observations. *Curr Res Food Sci*.

تغذیه انحصاری (EEN)، اگرچه به لحاظ علمی در کاهش علائم مؤثر بوده است، به دلیل محدودیت شدید انتخاب مواد غذایی، اغلب با عدم پذیرش بیماران مواجه می‌شود. همچنین، پاسخ‌های متفاوت بیماران به رژیم‌های غذایی، ناشی از تنوع در ساختار بیولوژیکی و ویژگی‌های میکروبیوم روده، این حوزه را پیچیده‌تر کرده و لزوم شخصی‌سازی در رویکردهای تغذیه‌ای را برجسته می‌سازد.

مشکل دیگری که به چشم می‌خورد، کمبود دستورالعمل‌های تغذیه‌ای استاندارد در بسیاری از نظام‌های سلامت است. پزشکان اغلب اطلاعات جامعی درباره کاربرد رژیم‌های غذایی به‌عنوان بخشی از درمان ندارند و بیماران نیز از راهکارهای مناسب برای تغییر رژیم غذایی خود آگاه نیستند. در کنار این موارد، حمایت اقتصادی و مالی از بیمارانی که باید از رژیم‌های خاص و گاه پرهزینه مانند رژیم‌های فاقد گلوتن یا بدون لاکتوز پیروی کنند، در بسیاری از کشورها به‌طور مطلوب انجام نمی‌گیرد. این مسائل نه تنها روند درمان را کند می‌کند، بلکه موجب تشدید مشکلات اقتصادی روانی در بیماران می‌شود.

### نتیجه‌گیری

در مجموع، مداخلات رژیمی نقش مهمی در مدیریت و درمان بیماری‌های التهابی روده (IBD)، از جمله کرون و کولیت اولسروز، دارند و می‌توانند به‌عنوان مکملی مؤثر در کنار درمان‌های دارویی مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای غذایی سالم مانند رژیم مدیترانه‌ای، رژیم گیاه‌محور، و رژیم کم FODMAP تأثیرات قابل‌توجهی در کاهش التهاب، کنترل علائم بیماری، و بهبود کیفیت زندگی بیماران نشان داده‌اند، در حالی که مصرف غذاهای مضر مانند گوشت‌های فرآوری‌شده و غذاهای حاوی قندهای ساده و فست‌فودها با تشدید علائم همراه است. همچنین، تغذیه انترال (PEN) و مواد مغذی خاص مانند آنتی‌اکسیدان‌ها و امگا-۳ می‌توانند به حفظ بهبودی و ترمیم بافت روده کمک کنند. برای ارائه راهکارهای درمانی مؤثرتر، مطالعات

2023;100521.

6. Cai Z, Wang S, Li J. Treatment of inflammatory bowel disease: a comprehensive review. *Front Med*. 2021;8:765474.

7. Yan J, Wang L, Gu Y, Hou H, Liu T, Ding Y, et al. Dietary Patterns and Gut Microbiota Changes in Inflammatory Bowel Disease: Current Insights and Future Challenges. *Nutrients*. 2022;14(19):4003.

8. Nitescu M, Istratescu D, Preda CM, Manuc TE, Louis E, Manuc M, et al. Role of an Exclusion Diet (Reduced Disaccharides, Saturated Fats, Emulsifiers, Red and Ultraprocessed Meats) in Maintaining the Remission of Chronic Inflammatory Bowel Diseases in Adults. *Medicina*. 2023;59(2):329.

9. Jones VA, Workman E, Freeman A, Dickinson R, Wilson A, Hunter J. Crohn's disease: maintenance of remission by diet. *The Lancet*. 1985;326(8448):177-80.

10. Bollen J, Trick L, Llewellyn D, Dickens C. The effects of acute inflammation on cognitive functioning and emotional processing in humans: A systematic review of experimental studies. *J Psychosom Res*. 2017;94:47-55.

11. Candy S, Borok G, Wright J, Boniface V, Goodman R. The value of an elimination diet in the management of patients with ulcerative colitis. *S Afr Med J*. 1995;85(11).

12. Wright R, Truelove SC. Circulating and tissue eosinophils in ulcerative colitis. *The American journal of digestive diseases*. 1966;11:831-46.

13. Wright R, Truelove S. A controlled therapeutic trial of various diets in ulcerative colitis. *Br Med J*. 1965;2(5454):138.

14. Haskey N, Estaki M, Ye J, Shim RK, Singh S, Dieleman LA, et al. A mediterranean diet pattern improves intestinal inflammation concomitant with reshaping of the bacteriome in ulcerative colitis: a randomised controlled trial. *J Crohns Colitis*. 2023;17(10):1569-78.

15. Lewis JD, Sandler RS, Brotherton C, Brensinger C, Li H, Kappelman MD, et al. A randomized trial comparing the specific carbohydrate diet to a Mediterranean diet in adults with Crohn's disease. *Gastroenterology*. 2021;161(3):837-52. e9.

16. Bartel G, Weiss I, Turetschek K, Schima W, Püspök A, Waldhoer T, et al. Ingested matter affects intestinal lesions in Crohn's disease. *Inflammatory bowel diseases*. 2008;14(3):374-82.

17. Bordini G, Zanella C, Crespi M, Pumo SL, Demarzo MG, Savarino E, et al. A randomized, 6-wk trial of a low FODMAP diet in patients with inflammatory bowel disease. *Nutrition*. 2019;67:110542.

18. Lorenz-Meyer H, Bauer P, Nicolay C, Schulz B, Purmann J, Fleig W, et al. Omega-3 fatty acids and low carbohydrate diet for maintenance of remission in Crohn's disease: a randomized controlled multicenter trial. *Scand J Gastroenterol*.

1996;31(8):778-85.

19. Albenberg L, Brensinger CM, Wu Q, Gilroy E, Kappelman MD, Sandler RS, et al. A diet low in red and processed meat does not reduce rate of Crohn's disease flares. *Gastroenterology*. 2019;157(1):128-36. e5.

20. Lomer MC, Grainger SL, Ede R, Catterall AP, Greenfield SM, Cowan RE, et al. Lack of efficacy of a reduced microparticle diet in a multi-centred trial of patients with active Crohn's disease. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2005;17(3):377-84.

21. Lomer MC, Harvey RS, Evans SM, Thompson RP, Powell JJ. Efficacy and tolerability of a low microparticle diet in a double blind, randomized, pilot study in Crohn's disease. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2001;13(2):101-6.

22. Mutlu E, Mikolaitis S, Sedghi S, Chakradeo PS, Engen P, Chlipala G, et al. Mo1795 dietary treatment of Crohn's disease: a randomized, placebo-controlled, double-blinded clinical trial. *Gastroenterology*. 2016;150(4):S778.

23. Ritchie JK, Wadsworth J, Lennard-Jones J, Rogers E. Controlled multicentre therapeutic trial of an unrefined carbohydrate, fibre rich diet in Crohn's disease. *Br Med J (Clin Res Ed)*. 1987;295(6597):517-20.

24. Takagi S, Utsunomiya K, Kuriyama S, Yokoyama H, Takahashi S, Iwabuchi M, et al. Effectiveness of an 'half elemental diet' as maintenance therapy for Crohn's disease: a randomized-controlled trial. *Aliment Pharmacol Ther*. 2006;24(9):1333-40.

25. Yanai H, Levine A, Hirsch A, Boneh RS, Kopylov U, Eran HB, et al. The Crohn's disease exclusion diet for induction and maintenance of remission in adults with mild-to-moderate Crohn's disease (CDED-AD): an open-label, pilot, randomised trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2022;7(1):49-59.

26. Bhattacharyya S, Shumard T, Xie H, Dodda A, Varady KA, Feferman L, et al. A randomized trial of the effects of the no-carrageenan diet on ulcerative colitis disease activity. *Nutr Healthy Aging*. 2017;4(2):181-92.

27. Keshteli AH, Valcheva R, Nickurak C, Park H, Mandal R, van Diepen K, et al. Anti-inflammatory diet prevents subclinical colonic inflammation and alters metabolomic profile of ulcerative colitis patients in clinical remission. *Nutrients*. 2022;14(16):3294.

28. Albenberg L, Brensinger CM, Wu QF, Gilroy E, Kappelman MD, Sandler RS, et al. A Diet Low in Red and Processed Meat Does Not Reduce Rate of Crohn's Disease Flares. *Gastroenterology*. 2019;157(1):128-+.

29. Bartel G, Weiss I, Turetschek K, Schima W, Püspök A, Waldhoer T, et al. Ingested matter affects intestinal lesions in Crohn's disease. *Inflammatory*

bowel diseases. 2008;14(3):374-82.

30. Bhattacharyya S, Shumard T, Xie H, Dodda A, Varady KA, Feferman L, et al. A randomized trial of the effects of the no-carrageenan diet on ulcerative colitis disease activity. *Nutr Healthy Aging*. 2017;4(2):181-92.

31. Brotherton CS, Taylor AG, Bourguignon C, Anderson JG. A high-fiber diet may improve bowel function and health-related quality of life in patients with Crohn disease. *Gastroenterol Nurs: the official journal of the Society of Gastroenterology Nurses and Associates*. 2014;37(3):206-16.

32. Candy S, Wright J, Gerber M, Adams G, Gerig M, Goodman R. A controlled double blind study of azathioprine in the management of Crohn's disease. *Gut*. 1995;37(5):674-8.

33. Dariel I, Levi Z, Fraser A, et al. Elimination diets in the treatment of mildly active Crohn's disease - results of a randomized controlled trial. *Gastroenterology* 2007;132:A506-A507.

34. Jones VA, Dickinson RJ, Workman E, Wilson AJ, Freeman AH, Hunter JO. Crohn's disease: maintenance of remission by diet. *Lancet (London, England)*. 1985;2(8448):177-80.

35. Keshтели AH, Valcheva R, Nickurak C, Park H, Mandal R, van Diepen K, et al. Anti-Inflammatory Diet Prevents Subclinical Colonic Inflammation and Alters Metabolomic Profile of Ulcerative Colitis Patients in Clinical Remission. *Nutrients*. 2022;14(16).

36. Lewis JD, Sandler RS, Brotherton C, Brensinger C, Li HZ, Kappelman MD, et al. A Randomized Trial Comparing the Specific Carbohydrate Diet to a Mediterranean Diet in Adults With Crohn's Disease. *Gastroenterology*. 2021;161(3):837.

37. Lomer MCE, Harvey RSJ, Evans SM, Thompson RPH, Powell JJ. Efficacy and tolerability of a low microparticle diet in a double blind, randomized, pilot study in Crohn's disease. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2001;13(2):101-6.

38. Lomer MCE, Grainger SL, Ede R, Catterall AP, Greenfield SM, Cowan RE, et al. Lack of efficacy of a reduced microparticle diet in a multi-centred trial of patients with active Crohn's disease. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2005;17(3):377-84.

39. Lorenz-Meyer H, Bauer P, Nicolay C, Schulz B, Purrmann J, Fleig WE, et al. Omega-3 fatty acids and low carbohydrate diet for maintenance of remission in Crohn's disease. A randomized controlled multicenter trial. Study Group Members (German Crohn's Disease Study Group). *Scand J Gastroenterol*. 1996;31(8):778-85.

40. Mutflu E, Mikolaitis S, Sedghi S, Chakradeo PS, Engen P, Chlipala G, et al. Dietary Treatment of

Crohn's Disease: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blinded Clinical Trial. *Gastroenterology*. 2016;150(4):S778-S.

41. Ritchie JK, Wadsworth J, Lennard-Jones JE, Rogers E. Controlled multicentre therapeutic trial of an unrefined carbohydrate, fibre rich diet in Crohn's disease. *British medical journal (Clinical research ed)*. 1987;295(6597):517-20.

42. Takagi S, Utsunomiya K, Kuriyama S, Yokoyama H, Takahashi S, Iwabuchi M, et al. Effectiveness of an 'half elemental diet' as maintenance therapy for Crohn's disease: A randomized-controlled trial. *Aliment Pharmacol Ther*. 2006;24(9):1333-40.

43. Wright R, Truelove SC. A controlled therapeutic trial of various diets in ulcerative colitis. *Br Med J*. 1965;2(5454):138-41.

44. Wright R, Truelove SR. Serial rectal biopsy in ulcerative colitis during the course of a controlled therapeutic trial of various diets. *Am J Dig Dis*. 1966;11(11):847-57.

45. Yanai H, Levine A, Hirsch A, Boneh RS, Kopylov U, Eran HB, et al. The Crohn's disease exclusion diet for induction and maintenance of remission in adults with mild-to-moderate Crohn's disease (CDED-AD): an open-label, pilot, randomised trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2022;7(1):49-59.

46. Limketkai BN, Godoy-Brewer G, Parian AM, Noorian S, Krishna M, Shah ND, et al. Dietary interventions for the treatment of inflammatory bowel diseases: an updated systematic review and meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2022.

47. Nieva C, Pryor J, Williams GM, Hoedt EC, Burns GL, Eslick GD, et al. The impact of dietary interventions on the microbiota in inflammatory bowel disease: A systematic review. *Journal of Crohn's and Colitis*. 2024;18(6):920-42.

48. Christensen C, Knudsen A, Arnesen EK, Hatlebakk JG, Sletten IS, Fadnes LT. Diet, food, and nutritional exposures and inflammatory bowel disease or progression of disease: an umbrella review. *Adv Nutr*. 2024;100219.

49. Limketkai BN, Iheozor-Ejiofor Z, Gjuladin-Hellon T, Parian A, Matarese LE, Bracewell K, et al. Dietary interventions for induction and maintenance of remission in inflammatory bowel disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019(2).

50. Limketkai BN, Godoy-Brewer G, Parian AM, Noorian S, Krishna M, Shah ND, et al. Dietary interventions for the treatment of inflammatory bowel diseases: an updated systematic review and meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2023;21(10):2508-25. e10.

51. Charlebois A, Rosenfeld G, Bressler B. The

impact of dietary interventions on the symptoms of inflammatory bowel disease: a systematic review. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2016;56(8):1370-8.

52. Candy S, Borok G, Wright JP, Boniface V, Goodman R. The value of an elimination diet in the management of patients with ulcerative colitis. *South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde.* 1995;85(11):1176-9.

53. Deleu S, Becherucci G, Godny L, Mentella MC, Petito V, Scaldaferri F. The Key Nutrients in the Mediterranean Diet and Their Effects in Inflammatory Bowel Disease: A Narrative Review. *Nutrients.* 2024;16(23):4201.

54. Gkikas K, Gerasimidis K, Milling S, Ijaz UZ, Hansen R, Russell RK. Dietary strategies for maintenance of clinical remission in inflammatory bowel diseases: are we there yet? *Nutrients.* 2020;12(7):2018.

55. Zhan YA, Dai SX. Is a low FODMAP diet beneficial for patients with inflammatory bowel disease? A meta-analysis and systematic review. *Clinical Nutrition.* 2018;37(1):123-9.

56. Limketkai BN, Rau S, Fasulo C. Preventative and therapeutic potential of nutrition for inflammatory bowel diseases: A narrative review. *J Parenter Enteral Nutr.* 2024;48(3):258-66.