

مقایسه سرعت جریان خون شریان مغزی میانی در زنان حامله پره اکلامپتیک و زنان حامله نرمال با استفاده از داپلرترانس کرانیال

چکیده

زمینه و هدف: پره اکلامپسی، با مرگ و میر(Mortality) قابل توجه مادر و جنین همراه است. داپلرترانس کرانیال(TCD)، به عنوان یک روش غیر تهاجمی در پره اکلامپسی برای ارزیابی همودینامیک شریان مغزی میانی(MCA) به کار رفته است. دانستن تأثیر حاملگی نرمال و پره اکلامپسی بر همودینامیک مغز برای درمان مناسب این افراد در بیهوشی، زایمان و بویژه مصرف داروهای وازو اکتیو ضروری است. هدف از انجام این پژوهش اندازه‌گیری سرعت جریان خون شریان مغزی میانی در زنان حامله پره اکلامپتیک و مقایسه با زنان حامله نرمال با استفاده از داپلرترانس کرانیال میباشد.

روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی با استفاده از TCD سرعت جریان خون در شریان مغزی میانی و اندکس‌های مربوط به آن شامل حداکثر سرعت سیستولی(Peak Systolic Velocity(PSV) و سرعت انتهای دیاستولی(Mean Velocity(MV) و سرعت میانگین(End Diastolic Velocity(EDV) مورد بررسی آماری قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از آنالیز Fisher Exact test و Independent t-test و قرار گرفت و از روش Pulsatility Index(PI) در زن حامله نرمال و ۳۰ زن حامله پره اکلامپتیک که از نظر سن، سن حاملگی و رتبه حاملگی با هم همسان بودند، بررسی شدند. داده‌ها از طریق برنامه نرم‌افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از روش Fisher Exact test و Independent t-test و قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه دیده شد که در افراد حامله پره اکلامپتیک در مقایسه با ۱۱۲/۲ cm/s)PSV (P<0.001)، ۵۹/۱ cm/s)EDV (P<0.001)، ۳۸/۴ cm/s)MV (P<0.001) و ۷۳/۸ cm/s در مقایسه با ۴۶/۱ cm/s (P<0.001) به طور معنی‌داری از گروه حامله نرمال بیشتر است.

نتیجه‌گیری: این یافته‌ها، مطرح کننده حالت انقباض عروقی(Vasoconstriction) در زنان پره اکلامپتیک می‌باشد که این مسئله می‌تواند در اثر مواد وازو اکتیو در گردش خون(Circulatory Vasoactive Substances) یا تحریک سمپاتیک باشد. این تغییرات، ممکن است مدت‌ها قبل از شروع پره اکلامپسی اتفاق افتاده باشد، لذا TCD ممکن است در پیشگویی پره اکلامپسی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها: ۱ - داپلرترانس کرانیال ۲ - پره اکلامپسی ۳ - سرعت جریان خون شریان مغزی میانی ۴ - حاملگی نرمال

دکتر محمد روحانی I

دکتر فرزاد سینا II

دکتر بابک زمانی III

دکتر سید محمدعلی اکبریان نیا III

تاریخ دریافت: ۱۱/۱۱/۸۵، تاریخ پذیرش: ۰۶/۰۶/۸۶

مقدمه

داپلرترانس کرانیال(TCD)، از سال ۱۹۸۲ مورد استفاده کلینیکی قرار گرفت. داپلر ترانس کرانیال یک تکنیک ساده

(I) استادیار و متخصص نوروولوژی، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران(مؤلف مسئول).

(II) دستیار نوروولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران.

(III) استادیار و متخصص نوروولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران.

روش بررسی

در این مطالعه، که از نوع مورد - شاهدی میباشد ۳۰ زن حامله پرهاکلامپتیک از بخش زنان بیمارستان حضرت رسول اکرم بررسی شدند. پرهاکلامپسی، به صورت فشار خون بالاتر یا مساوی $140/90 \text{ mmHg}$ و پروتئینوری بیشتر یا مساوی $+1$ با dipstick یا بیشتر از 300 mg در جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت، تعریف شد. بیماران با بیماری عروقی یا سایر بیماریهای مزمن که ممکن بود بر جریان خون مغز تاثیر گذارند، حذف شدند. هیچ بیماری در زایمان (labor) فعال نبود و تحت درمان دارویی بویژه سولفات منیزیم یا داروهای ضد فشار خون، قبل از این مطالعه قرار نگرفته بود.

زنان حامله نرمال ($n=30$)، از درمانگاه مراقبت‌های قبل از زایمان بیمارستان حضرت رسول انتخاب شدند. این افراد در سه ماهه سوم بارداری بوده و از نظر سن حاملگی، سن، رتبه حاملگی با گروه پرهاکلامپتیک همسان (match) بودند. همچنین، افراد با بیماری‌های عروقی و دیابت حاملگی از مطالعه حذف شدند.

دالپلترانس کرaniال، با استفاده از یک پروب 2-MHZ برای اندازه‌گیری سرعت شریان مغزی میانی استفاده شد. سگمان M1 شریان MCA دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و حداقل سرعت به دست آمده، محاسبه شد. حداقل گرفت و حداقل سرعت به دست آمده، محاسبه شد. حداقل گرفت و حداقل سرعت به دست آمده، محاسبه شد. حداقل گرفت و حداقل سرعت به دست آمده، محاسبه شد. داده‌ها از طریق برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از روش Fisher Exact test و Independent t-test بررسی آماری قرار گرفته‌اند.

یافته‌ها

در این مطالعه، ۶۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که ۳۰ نفر پرهاکلامپتیک و ۳۰ نفر حامله نرمال بودند. میانگین سنی گروه پرهاکلامپسی و $29/25 \pm 6/01$ سال و گروه شاهد $30/07 \pm 4/35$ سال میباشد که تفاوت سنی بین دو گروه معنی‌دار نبود ($P=0.77$). کمترین سن ۱۹ سال و بیشترین سن ۳۹ سال بود.

و غیر تهاجمی است که برای ارزیابی همودینامیک و خود تنظیمی مغز به طور وسیع به کار می‌رود. با استفاده از این تکنیک، نشان داده شده است که فشار شریانی دی‌اکسیدکربن (CO₂) یک تنظیم کننده (modulator) بالقوه جریان خون مغز است.^(۲۹)

هایپرکاپنه باعث گشادی عروق مغزی (vaso dilation) و افزایش جریان خون مغز (Cerebral blood flow=CBF) می‌شود. استنشاق کنترل شده CO₂ ۵٪ به شکل یک تست تحریکی CO₂، به صورت وسیع برای ارزیابی واژوموتور عروق مغزی (cerebral vasomotor reserve) به ویژه در بیماران با تنگی یک طرفه کاروتید به کار می‌رود.^(۳۰)

وازواسپاسم محیطی، فشار خون سیستمیک و افزایش حساسیت به مواد وازوакتیو مشخصه پرهاکلامپسی می‌باشد. ادم مغزی، خونریزی، ایسکمی و تشنج از عوارضی هستند که در پرهاکلامپسی یا اکلامپسی دیده می‌شود. اتیولوژی دقیق این عوارض مشخص نمی‌باشد، اما عقیده بر این است که از Vascular Perturbation ناشی می‌شوند. تحت شرایط نرمال خود تنظیمی (Autoregulation) جریان خون مغز را ثابت نگه می‌دارد. در پرهاکلامپسی، به نظر می‌رسد Autoregulation عروق مختل شده است. پاسخ Cerebral CPP (Perfusion Pressure)، به علت افزایش غیرعادی عروق مغزی، ممکن است در پاتوفیزیولوژی اختلال عملکرد مغز در پرهاکلامپسی - اکلامپسی نقش داشته باشد.^(۲۹)

انجام TCD ساده و نتایج Reproducible آن، باعث شده است که به عنوان یک روش غیرتهاجمی برای بررسی همودینامیک مغز به کار رود. دانستن اثرات حاملگی نرمال و پرهاکلامپسی روی همودینامیک مغز برای درمان (Management) مناسب این افراد در بیهوشی، زایمان و بویژه مصرف داروهای Vasoactive هدف این مطالعه، ارزیابی مقایسه‌ای همودینامیک مغز با استفاده از TCD در زنان حمله نرمال و پرهاکلامپتیک می‌باشد.

جدول شماره ۲- شاخص‌های سرعت شریان مغزی میانی زنان با حاملگی نرمال و پرهاکلامپتیک

Pvalue	زنان حامله پرهاکلامپتیک	زنان حامله نرمال	شاخص‌های MCA
<0.001	۱۱۳/۳۱	۷۶/۱۳	حداکثر سرعت سیستولیک (PSV) (cm/s)
<0.001	۵۹/۱۳	۲۸/۴	سرعت انتهای دیاستولیک (سانتی‌متر/ثانیه) (EDV)
<0.001	۷۳/۸۸	۴۶/۱۲	سرعت میانگین (MV) (سانتی‌متر/ثانیه)
0.075	۰/۷۶۳	۰/۹۲۴	اندکس پالسالیتی (PI)

بحث

در این مطالعه نشان داده شد که سرعت جریان خون در شریان مغزی میانی در زنان حامله پرهاکلامپتیک به طور معنی داری از زنان حامله نرمال که از نظر سن، سن حاملگی و رتبه حاملگی با هم یکسان بودند بیشتر است. هر سه اندکس مربوط به سرعت یعنی حداکثر سرعت سیستولی (PSV)، سرعت انتهایی دیاستولی (EDV) و سرعت میانگین (MV) به طور معنی داری افزایش یافته بود.

Pulsatility Index در دو گروه تفاوت داشت یعنی در گروه پرهاکلامپتیک کمتر از گروه نرمال بود؛ ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.

یافته‌های فوق، در درجه اول مطرح کننده این مسئله است که حاملگی‌های پرهاکلامپتیک با یک اختلال گردش خون مغزی مادر همراه است که عمدتاً نتیجه وازواسپاسم ژنرالیزه و ادم مغزی است. اکثر مطالعات مشابهی که انجام شده است از نظر نتایج کم و بیش با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.

در یک مطالعه دیده شد که ۷۰٪ حاملگی‌های غیر نرمال، یافته‌های غیر طبیعی TCD دارند که بیشتر آن افزایش سرعت جریان خون مغزی (CBFV) است که بین شدت توکسمی با سرعت جریان خون مغزی غیرطبیعی به طور قابل توجهی ارتباط وجود داشت.^۹ زن باردار با افزایش CBFV در بررسی اول، در هفته‌های ۳۶-۳۴ حاملگی دچار وازواسپاسم شدند که این یافته‌ها بر ارزش TCD، به

از نظر سن حاملگی، گروه پرهاکلامپتیک $۳۵/۵۶ \pm ۴/۵۳$ هفت‌ه (کمترین ۲۸ هفته و بیشترین ۴۰ هفته) و گروه شاهد $۳۵ \pm ۳/۹۱$ هفت‌ه (کمترین ۲۵ هفته و بیشترین ۴۰ هفته) می‌باشد. از این نظر نیز، اختلاف بین دو گروه معنی دار نیست ($P=0.715$).

تعداد حاملگی در گروه پرهاکلامپتیک $۲ \pm ۱/۱۵$ (کمترین ۱ و بیشترین ۵) و در گروه شاهد $۲/۲ \pm ۰/۹۴$ (کمترین ۱ و بیشترین ۴) می‌باشد که اختلاف معنی داری وجود ندارد ($P=0.62$). حداکثر سرعت سیستولی (PSV) در شریان MCA در گروه پرهاکلامپتیک $s/113/31 \pm 17/88$ cm/s (حداکثر 81 cm/s و حداقل 28 cm/s) (حداکثر $13 \pm 14/59$ cm/s) (حداکثر 100 cm/s) می‌باشد که تفاوت معنی داری مشاهده شد ($P<0.001$).

سرعت انتهایی دیاستولی (EDV) در گروه پرهاکلامپتیک $۵۹/۱۳ \pm ۱۵/۲۳$ cm/s و حداکثر ۳۹ cm/s و در گروه شاهد $۰/۹۰$ cm/s و حداکثر ۱۸ cm/s (حداکثر $۳۸/۴ \pm ۹/۰$ cm/s) می‌باشد که اختلاف معنی داری وجود دارد ($P=0.56$). میانگین سرعت (Mean) در گروه پرهاکلامپتیک $73/88 + 15/76$ cm/s (حداکثر 47 cm/s و حداقل 20 cm/s) (حداکثر $46/13 \pm 10/96$ cm/s) (حداکثر 20 cm/s و حداقل 17 cm/s) می‌باشد که اختلاف معنی داری نشان داد ($P<0.001$).

Pulsatility Index (PI)، در گروه پرهاکلامپتیک $0/3176 \pm 0/2232$ cm/s (حداکثر 47 cm/s و حداقل $0/31$ cm/s) و در گروه نرمال $0/924 \pm 0/2615$ cm/s (حداکثر $0/65$ cm/s و حداقل $0/17$ cm/s) می‌باشد که اختلاف معنی داری وجود ندارد ($P=0.075$) (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱- مشخصات زنان با حاملگی نرمال و پرهاکلامپتیک

Pvalue	زنان حامله پرهاکلامپتیک	زنان حامله نرمال	متغیر
NS	۲۹/۲۵	۳۰/۰۷	سن (سال)
NS	۲	۲/۲	رتبه حاملگی
NS	۳۵/۵۶	۳۵	سن حاملگی (هفت)
بدون اهمیت:			NS

در یک فرضیه دیگر چنین مطرح شده است که آستانه پایین برای Cerebral Perfusion Pressure(CPP) و Pulsatility Index(PI) Resistance Index(RI) در زنان پرہ اکلامپتیک تنظیم می‌شود(۲۹). PI کمتر و CPP بیشتر دارند.^(۲۹) تفاوت در یافته‌های مطالعات متفاوت، در رابطه با تغییرات Middle cerebral artery flow velocity(MCAFV) در پرہ اکلامپسی، ممکن است به علت تفاوت در شدت پرہ اکلامپسی بین مطالعات باشد.

در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که حاملگی، تغییرات وسیعی در سیستم قلبی عروقی ایجاد می‌کند که مهمترین این یافته‌ها افزایش سرعت جریان خون در شرائین مغز می‌باشد که این تغییرات ثانویه به وازواسپاسم و ادم مغزی است. ارزیابی غیر تهاجمی همودینامیک مغز با TCD، که جریان خون و سرعت عروق مغزی را ارزیابی می‌کند، باعث شده است که به عنوان یک روش ارزان و ساده برای دانستن اثرات همودینامیک مغز در پرہ اکلامپسی و افزایش فشار خون درآید. دانستن اثرات حاملگی نرمال و پرہ اکلامپسی برای درمان(Management) مناسب این بیماران در بیهوشی، زایمان و بویژه مصرف داروهای تنگ کننده عروق(Vasoactive) ضروری است.

همچنین، به نظر می‌رسد که از این روش به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌بینی کننده پرہ اکلامپسی در حاملگی استفاده کرد که البته در این زمینه نیاز به مطالعات وسیع تر می‌باشد.

لازم به ذکر می‌باشد که در این مطالعه، زنان با پرہ اکلامپسی خفیف مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لذا نمی‌توان با این مطالعه در مورد همودینامیک مغز در پرہ اکلامپسی شدید نظر داد.

لذا، توصیه می‌شود که مطالعاتی با TCD پرتاپل روی حاملگی‌های با پرہ اکلامپسی شدید و اکلامپسی انجام شود. همچنین، بررسی اثرات داروهای ضد فشار خون و سولفات منیزیم بر روی همودینامیک مغز نیز، انجام مطالعه جداگانه‌ای را طلب می‌کند.

عنوان یک وسیله پیش گویی کننده حاملگی‌های غیر نرمال، تاکید می‌کنند.^(۳۰)

در یک بررسی روی ۲۰ زن حامله پرہ اکلامپتیک و ۴ زن حامله نرمال، دیده شد که سرعت جریان خون شریان‌های مغز در سه ماهه دوم در دو گروه تفاوتی نداشت ولی در سه ماهه سوم افزایش قابل توجهی در سرعت جریان خون در گروهی که دچار پرہ اکلامپسی شدند، دیده شد.^(۴)

در یک مطالعه دیگر روی ۳۸ زن حامله پرہ اکلامپتیک با ۴ زن حامله نرمال، دیده شد که سرعت میانگین در شریان‌های مغزی در پایان حاملگی در گروه پرہ اکلامپسی به طور معنی‌داری بالاتر بود و PI پایین‌تر، که این احتمالاً به علت نقص مغز در تنظیم خودش می‌باشد. همچنین، دیده شد که این تغییرات در چند روز اول بعد از زایمان نیز علی‌رغم پایین آمدن فشار خون دیده می‌شود، که می‌تواند علت علائم نورولوژیک عمدتی باشد که در اشکال دیرتر سندروم دیده می‌شود.^(۵)

مطالعه دیگر با TCD روی ۲۱ زن مبتلا به پرہ اکلامپسی، در چهار زمان انجام شد. زمان اول: قبل از زایمان، زمان دوم: قبل از زایمان و بعد از تجویز منیزیم، زمان سوم: بعد از زایمان با منیزیم و زمان چهارم: بعد از قطع منیزیم. دیده شد در زنان مبتلا به پرہ اکلامپسی، جریان خون شریان مغزی میانی افزایش یافته بود که هم قبل و هم بعد از زایمان وجود داشت(قبل از زایمان: Versus ۵۵/۱cm/s و بعد از زایمان Mean velocity ۷۸/۲cm/s و $P < 0.005$)^(۶) و بعد از زایمان $69/8\text{cm/s}$ Versus $101/12\text{cm/s}$ ($P < 0.001$). این یافته‌ها به نفع این تئوری است که وازواسپاسم عروق مغزی با قطر کوچکتر، جز اصلی پرہ اکلامپسی است.^(۶)

یافته‌های TCD در عروق مغزی بزرگ، وازواسپاسم را تایید می‌کند. ضایعات هیپودانس برگشت ناپذیر در ماده سفید در CT اسکن مغز یا MRI، دلالت بر ادم موضعی دارند.^(۸) تصویر بالینی با اختلال عملکرد آندوتلیوم با افزایش حساسیت عروق به Circulatory Pressor Agents و با ضایعات ساختمانی آندوتلیوم توجیه می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه نشان داده شد که MV و EDV در حالت پایه در افراد پرهاکلامپتیک بیشتر از افراد حامله نرمال است در حالیکه PI کمتر است؛ که مطرح کننده افزایش CPP در زنان پرهاکلامپتیک است.

فهرست منابع

- 1- Sherman RW, Bowie RA, Henfrey MME, Mahajan RP, Bogod D. Cerebral hemodynamics in pregnancy and Preeclampsia as assessed by transcranial Doppler Ultrasonography. *British journal of anesthesia* 2002; 89(5): 687-92.
- 2- Williams K, Galerneau F. Maternal transcranial doppler in Preeclampsia and eclampsia. *Ultrasound Obst Gynecol* 2003; 21(5): 507-13.
- 3- Williams KP, Moutquin JM. Do maternal cerebral vascular changes assessed by transcranial doppler antedate pre-eclampsia? *Ultrasound Obstet Gynecol* 2004 Mar; 23(3): 254-6.
- 4- Demarin V, Rundek T, Hodek B. Maternal cerebral circulation in normal and abnormal pregnancies. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1997 Aug; 76(7): 619-24.
- 5- Bernal sanchez-Arjona M, Franco Macias E, Cassado Chacon JL, Diaz Espejo C, Gilperalta A, Cayuela Domingues A. Transcranial doppler velocimetry in normotensive puerperal women. *Rev Neurol* 2003 Jan; 36(2): 101-4.
- 6- Franco Macis E, Quesaclar CM, Cayuela Dominguez A, Miranda Guisado ML, Stieffel Garcia Junco P, Gil Peralta A, Anomalies in brain haemodynamics in pre-eclamptic expectant mothers. *Rev Neurol* 2003 oct; 37(7): 615-8.
- 7- Franco Macis E, Quesaclar CM, Miranda Guisado ML, Cayuela Dominguez A, Peralta A. Transcranial doppler velocimeter in pregnant and later normotensive puerperal women. *Rev Neurol* 2004 Jun; 38(11): 1006-3.
- 8- Hansen WF, Burnham SJ, Svendson TO, Katz VL, Throp JM, Hansen AR. Transcranial doppler findings of cerebral vasospasm in preeclampsia. *J Matern Fetal Med* 1996 Jul-Aug; 5(4): 194-200.

Comparison of MCA flow Velocity in Preeclampsia and Normal Pregnancy with Transcranial Doppler

^I
***M. Rohani, MD** ^{II}
F. Sina, MD ^{III}
B. Zamani, MD ^{III}
M.A. Akbariannia, MD

Abstract

Background & Aim: Preeclampsia is the major cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. Transcranial Doppler(TCD) as a noninvasive procedure is used to assess hemodynamic changes in middle cerebral artery(MCA). Knowing the influence of normal pregnancy and preeclampsia on brain hemodynamics is essential for proper management of anesthesia, labor and vasoactive drug usage in these patients. The aim of the present study is to measure and compare MCA flow velocity in preeclamptic and normal pregnant women using transcranial doppler.

Patients and Method: In this case-control study, transcranial Doppler ultrasound was used to measure peak systolic velocity(PSV), end-diastolic velocity(EDV), mean flow velocity(MV), and pulsatility index(PI) in the middle cerebral artery(MCA) of 30 preeclamptic and 30 normotensive pregnant women in the third trimester. Preeclamptic subjects matched the normotensive ones for maternal age, gestational age and gravidity. Statistical analysis was done using independent t-test and Fisher Exact test.

Results: Preeclamptic women had significantly higher baseline peak(113.3 compared with 76.31cm/s, $P<0.001$), end-diastolic(59.1 compared with 38.4cm/s, $p<0.001$) and mean velocity(73.8 compared with 46.1cm/s, $P<0.001$) in the middle cerebral artery.

Conclusion: Preeclamptic patients had elevated baseline peak, end-diastolic and mean velocity in the MCAs. These findings are consistent with a state of vasoconstriction in preeclamptic women which is unresponsive to stimuli that under normal circumstances result in vasodilation.

Key Words: 1) TCD(Transcranial Doppler) 2) Preeclampsia

3) MCA(Middle Cerebral Artery) Flow Velocity 4) Normal Pregnancy

I) Assistant Professor of Neurology. Hazrat Rasoul-e-Akram Hospital. Niayesh St., Sattarkhan Ave., Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran. (*Corresponding Author)

II) Resident of Neurology. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.

III) Assistant Professor of Neurology. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.